

Nome:	MARCOS AURELIO DE FREITAS SILVA		
Sexo:	Masculino	Idade:	44 anos
Exame:	34630898	Data:	21/03/2025
Médico Solic.:	ALCIONI BOLDRINI VICENTI		
		Atendimento:	18408333
		ID:	3511569

Conclusão

A polissonografia basal mostrou:

- Aumento acentuado do índice de apneia/hipopneia devido a eventos obstrutivos (IAH:85,3 eventos/h);
- Presença de ronco durante o exame;
- Dessaturação da oxi-hemoglobina durante o sono;
- Ausência do sono de ondas lentas;
- Eficiência do sono preservada.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Mariana Delgado", is centered above the printed name.

MARIANA DELGADO FERNANDES
CRM 179521

Nome: MARCOS AURELIO DE FREITAS SILVA

Sexo: M

Idade: 44 anos

Atendimento: 18408333

Peso: 93.0 Kg

Altura: 175.0 cm

IMC: 30.4 Kg/m²

Data: 21/03/2025

Exame: 34630898

ID: 3511569

Médico solicitante: Dr(a). ALCIONE BOLDRINI VICENTI

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 21:47:13 horas e finalizado às 05:33:13 horas. A **latência para o início do sono** foi de 10.8 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 87.0 minutos. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 434.5 minutos, com **eficiência do sono** de 93.2%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 10.9% de **estágio N1**, 67.0% de **estágio N2**, 0.0% de **estágio N3** e 22.1% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi de 20.7 minutos. Ocorreram 611 **despertares**, uma média de 84.4 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS – *periodic limb movements in sleep*) foi de 0.0 por hora, sendo 0.0 PLMS por hora **associados a despertares**.

A quantidade total de eventos respiratórios registrados foi de 618, sendo 481 apneias obstrutivas, 2 apneias centrais, 134 apneias mistas, 1 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 0 despertares associados a esforço respiratório (RERA – *respiratory effort-related arousal*). O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 85.3 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de 85.3 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 85.00 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC), de 0.30 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 97%; a **média**, 88% e a **mínima**, 63%. O **índice de dessaturação** foi de 94.7 por hora durante o sono REM e 107.6 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 55.6% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA

Procedimento

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema Alice 6 LDxS. Foram utilizados parâmetros fornecidos por eletroencefalograma (F4-M1, F3-M2, C4-M1, C3-M2, O2-M1, O1-M2); eletro-oculograma bilateral; eletromiograma (mentoniano/submentoniano e tibial bilateral); eletrocardiograma (montagem D2 modificada); cânula de pressão (fluxo aéreo) e termistor (fluxo oronasal); pletismografia por indutância (esforço respiratório torácico e abdominal); oximetria de pulso (saturação percutânea da oxi-hemoglobina – SpO₂); capnometria (P_{ET}CO₂); sensor de ronco (microfone) e posição corporal no leito.

Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Análise do sono

Data e horário de início	21/03/2025 21:47:13
Data e horário de término	22/03/2025 05:33:13
Tempo total de registro (TTR)	466.0 min
Tempo total de sono (TTS)	434.5 min
Latência para o início do sono	10.8 min
Latência para o sono REM	87.0 min
Tempo em vigília após adormecer	20.7 min
Eficiência do sono (TTS/TTR x 100)	93.2%

Estágios do sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Duração (min)	47.5	291.0	0.0	96.0	20.0
Distribuição no TTS (%)	10.9	67.0	0.0	22.1	*

Despertares

	Eventos	Índice (por hora)
Total de despertares	611	84.4

Frequência cardíaca

	Média (bpm)	Máxima (bpm)
Total	72.2	91.0
REM	74.1	
NREM	71.7	
Vigília	85.8	

Movimentos periódicos de membros durante o sono (PLMS - *periodic limb movements in sleep*)

EMG tibial bilateral	Eventos	Índice (por hora)
PLMS	0	0.0
PLMS associados a despertares	0	0.0

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Eventos respiratórios

	Total de eventos	Índices (por hora)					Duração (seg)	
		REM	NREM	TTS	Supino	Não supino	Máxima	Média
Apneia obstrutiva (AO)	481	59.4	68.1	66.4	58.5	76.58	60.5	25.5
Apneia mista (AM)	134	16.3	19.1	18.5	28.3	5.99	58.5	26.0
Hipopneia obstrutiva (HO)	1	0.0	0.2	0.1	*	*	14.5	14.5
RERA	0	0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
AO+AM+HO	616.00	121.00	492.20	85.00	*	*	133.50	66.00
AO+AM+HO+RERA	616.00	121.00	492.20	85.00	*	*	133.50	66.00
Apneia central (AC)	2	1	1	0.3	0.5	0.00	14.0	13.8
Hipopneia central (HC)	0	0.0	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0
AC+HC	2.00	1.00	1.00	0.30	*	*	14.00	13.80

Índice de apneia + hipopneia obstrutiva (IAHO): 85.00 (por hora)

IAH(O+C): 85.3 (por hora)

Índice de apneia + hipopneia central (IAHC): 0.30 (por hora)

Índice de hipopneia central e obstrutiva: 0.2 (por hora) em supino e 0.00 (por hora) em não supino

Índice de distúrbio respiratório (IDR): 85.3 (por hora)

Tempo de respiração de Cheyne-Stokes: 0.00 (min)

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

- **Apneia:** queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, por 10 segundos ou mais.
- **Hipopneia obstrutiva:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; presença de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal ou ronco durante o evento.
- **Hipopneia central:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; ausência de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal e ronco durante o evento.
- **RERA:** achatamento da curva de fluxo aéreo pela cânula de pressão por 10 segundos ou mais associado a despertar do EEG.
- **Respiração de Cheyne-Stokes:** presença de respiração periódica com padrão crescendo-decrescendo alternado por apneias ou hipopneias centrais, por 40 segundos ou mais.

Saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂)

Saturação média	88%	Saturação TTR < 90%	55.6% (259.2 min)
Saturação mínima	63%	Saturação REM < 90%	16.3% (76.0 min)
		Saturação NREM < 90%	38.9% (181.2 min)
Saturação média na vigília	93%		
Saturação média no sono REM	84%	Saturação < 80%	5.8% TTR (26.9 min)
Saturação média no sono NREM	89%	Saturação < 70%	0.3% TTR (1.6min)
Total de dessaturações	761		
Índice de dessaturação no sono		105.7 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono REM		94.7 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono NREM		107.6 (por hora)	

Hipnograma

