

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: NEIDE SILVA FERREIRA

Sexo: Feminino

Data do Exame: 22-09-2025

Idade: 75 anos

Peso: 60 kg

Altura: 1,56 m

Médico Solicitante: DR. AUGUSTO RICARDO BARBA
URENA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 22/09/2025 22:18 e finalizado às 23/09/2025 05:42.

A latência para início do sono foi de 1,6 min e a latência para o sono REM de 20,5 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 390,0 min, com eficiência do sono de 88,0 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 1,7 % de estágio N1, 75,9 % de estágio N2, 3,5 % de estágio N3 e 19,0 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 51,5 min. Ocorreram 238 despertares, sendo o índice de 32,2 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0 (nº/h), 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 209, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 209 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 32,2 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 56,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 26,4. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 32,2 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 32,2 hipopneia/h.

A saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal foi 92%, a média de 91% e a mínima de 70%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (IDO) foi de 28,6 (nº/h), sendo que em REM foi de 56,8 (nº/h) e em NREM foi de 26,6 (nº/h). Permaneceu 11,6 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (04), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (32,2 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (70%);
3. Latência para o início do sono (1,6 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (20,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (88,0 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares 32,2 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (1,7 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (75,9 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (3,5 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (19,0 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apnéia do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: NEIDE SILVA FERREIRA
ID: 0
Altura: 1,56 m
Peso: 60 kg
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 27-5-1950
IMC: 24,65

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:18:21
Data do Exame: 22-09-2025
Médico Solicitante: DR. AUGUSTO RICARDO BARBA URENA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	22/09/2025 22:18
Data/Horário de Término:	23/09/2025 05:42
Tempo Total de Registro (TTR):	443,1
Tempo Total de Sono (TTS):	390,0
Latência para o início do sono:	1,6
Latência para o sono REM:	20,5
Tempo acordado após o adormecer:	51,5
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	88,0 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	6,5	296,0	13,5	74,0	53,0
% de TTS	1,7	75,9	3,5	19,0	12,0