

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: EVERTON WILLIAM DE MORAES

Sexo: Masculino

Data do Exame: 16-10-2025

Idade: 42 anos

Peso: 91 kg

Altura: 1,74 m

Médico Solicitante: DR. MARIO SERGIO LEONE
CARREGOSA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 16/10/2025 22:01 e finalizado às 17/10/2025 05:41.

A latência para início do sono foi de **5,5** min e a latência para o sono REM de **45,0** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 424,5 min, com eficiência do sono de **92,2 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **3,3 %** de estágio N1, **41,1 %** de estágio N2, **24,9 %** de estágio N3 e **30,7 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 30,6 min. Ocorreram 43 despertares, sendo o índice de **5,6 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 380, sendo 245 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 135 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **53,7 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 47,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 56,3. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 53,7 (nº/h), sendo 34,6 apneia/h e 19,1 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂) basal** foi 93%, a **média** de 93% e a **mínima** de 87%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 39,2 (nº/h), sendo que em REM foi de 36,3 (nº/h) e em NREM foi de 44,5 (nº/h). Permaneceu 1,7 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório **(53,7 n°/h)** (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina **(87%)**;
3. Latência para o início do sono **(5,5 min)** (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM **(45,0 min)** (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono **(92,2 %)** (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares **5,6 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 **(3,3 %)** (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 **(41,1 %)** (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta **(24,9 %)** (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM **(30,7 %)** (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA


Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando índice de distúrbio respiratório de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.



Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome:	EVERTON WILLIAM DE MORAES
ID:	0
Altura:	1,74 m
Peso:	91 kg
Sexo:	Masculino
Data de Nascimento:	6-12-1982
IMC:	30,06

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame:	22:01:11
Data do Exame:	16-10-2025
Médico Solicitante:	DR. MARIO SERGIO LEONE CARREGOSA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	16/10/2025 22:01
Data/Horário de Término:	17/10/2025 05:41
Tempo Total de Registro (TTR):	460,6
Tempo Total de Sono (TTS):	424,5
Latência para o início do sono:	5,5
Latência para o sono REM:	45,0
Tempo acordado após o adormecer:	30,6
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	92,2 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	14,0	174,5	105,5	130,5	36,5
% de TTS	3,3	41,1	24,9	30,7	7,9

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	43	5,6

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	56,3	86
NREM	58,9	85
Vigília	65,8	103

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	245	0	245	135	380	0	380
Índice	0,0	34,6	0,0	34,6	19,1	53,7	0,0	53,7
Índice em REM	0,0	22,1	0,0	22,1	25,7	47,8	0,0	47,8
Índice em NREM	0,0	40,2	0,0	40,2	16,1	56,3	0,0	56,3
Duração máx (seg)	0	44,2	0	44,2	65,7	65,7	0	65,7
Duração média (seg)	0	18,3	0	18,3	21,4	19,8	0	19,8
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 53,7 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 53,7 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	93%	87%
NREM:	92%	87%
REM:	93%	88%
Vigília:	93%	89%


Valor de oximetria predominante durante o sono: 93%

Total de dessaturações: 301

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	92,2 %	≥85%
Latência para o início do sono	5,5 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	45,0 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	3,3 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	41,1 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	24,9 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	30,7 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	7,9 %	5%
Índice de despertares	5,6 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	53,7 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h