

Exame

Nome	Gerson Aparecido Cascarde	Nascimento	12/11/1982 (43 anos)	Sexo	Masculino
Início	28/01/2026 – 23:24:57	Tempo total	08:01:10 (481,2 min)		
Fim	29/01/2026 – 07:26:07	Tempo válido	07:40:49 (460,8 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 27/01/2026

Peso 101 kg
Altura 1,82 m
IMC 30,5

Medicamentos

Respondido em 27/01/2026

- ☐ Nenhum
- ☒ ablock
- ☒ espirolactona
- ☒ forxiga
- ☒ losartana
- ☒ sivistatina


Sintomas Respondido em 27/01/2026

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☒ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☒ Cefaleia matinal
- ☒ Dificuldade de concentração
- ☒ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 27/01/2026

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)


IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 28/01/2026, iniciado às 23:24 e terminado às 07:26. O tempo total de registro foi de 8h01min (481 minutos) e o tempo válido foi de 7h40min (460 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 18 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 2,3/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 96% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Não foram detectados eventos de ronco durante o registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame normal (IDO 2,3/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Exame

Nome	Gerson Aparecido Cascarde	Nascimento	12/11/1982 (43 anos)	Sexo	Masculino
Início	28/01/2026 – 23:24:57	Tempo total	08:01:10 (481,2 min)		

Oximetria (SpO₂)



Frequência cardíaca




Sono estimado

Tempo total de sono	394,0 min
Tempo para dormir	30,0 min
Tempo acordado pós-sono	45,0 min
Eficiência do sono	82%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 20,2 %.min /hora



Análise de ronco

Tempo de gravação	481,0 min
Tempo com ronco	0,0 min (0%)



Polissonogramas

