

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22222362 957 | 719

LUCIANA FATIMA DE OLIVEIRA CEPINHO

IDADE: 52 PESO: 65 ALTURA: 1.60 PROFISSÃO: Do lar (Camil)
SINTOMAS: Crise de ansiedade e depressão/esqueciola
QUEIXAS: Dor de cabeça / mmj e dor "pesada" / enjoos
MEDICAMENTOS: Lisartina / Propametal / Piraruv
Fumante passiva.
MÉDICO: Dr. Nômeo Martin / Dr. Pedro Macido / Dr.
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N (muso.)
EXERCÍCIO FÍSICO: não está fazendo no momento (Hidro)
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: — JANTAR:
HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 5h:30
COCHILHO ☒ SIM () NÃO ^{as vezes} DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM () X NA SEMANA () NÃO ^{as vezes} ^{esposo é nonce}
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 4x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: ^{levemente} CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 47.1 SPO2: 81%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: IDO = 29%
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA Retirou ovários e
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: — IMC: 25.4 / ^{ultra}
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA
() ORTOPÉDICA ☒ NEUROLÓGICA () OUTROS Cervical / lombar

09/09 Avaliação

24 Fica no celular antes de dormir.

17/09/24 P = 4-9 cmH₂O / fixo: P = 8.6 cmH₂O

IAH = 22.1h

m. de uso: 6h46'

Bem adaptada

patência

03/10

P = 9.4 cmH₂O

IAH = 1.9 e 1ev

m. de uso: 4.9 e 1ev

melhora da dor
de cabeça, melhora
da dor das pernas
boa

24/10

P = 9.4 cmH₂O

IAH = 1.7 e 1ev

m. de uso: 2h40'

usage = 22.3 e 1pm.

boa.

27/01/25

em retorno ao auto 4 a 10 cmH₂O

boa

28/01/25 Retirado do equipamento

patência

04/02/25 P=med: 8,7 an H₂O
IAH=1,3 e/h
med. uso: 7h41
fuga: 8,7 l/m

Bem adaptada
Relata dor de
cabeça e aerofagia

Natasha

05/03/25 P=8,8 an H₂O
IAH: 0,7 e/h
med. uso: 6h55
fuga: 24 l/m

Bem adaptada

Natasha

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: LUCIANA FATIMA DE OLIVEIRA CEPINHO			
Sexo: F	Idade: 52 anos	Peso: 65 Kg	Altura: 1.60 m
IMC: 25.4	Data do Exame: 31/07/2024	Exame: 13639_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:38:16 PM horas e encerrado às 5:43:59 AM horas, com latência para o sono de 12 minutos e latência para o sono REM de 335 minutos. O tempo total de sono foi de 368.0 minutos, com eficiência do sono de 86.4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.7%	Até 5%
Estágio 2	75.8%	45 - 55%
Estágio 3	15.2%	> 15%
Sono REM	8.3%	20 - 25%
Eficiência do sono	86.4%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 45.5 minutos ocorreram **314 despertares (índice de 51.2 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 84 bpm, a maior de 97 bpm e a menor de 77 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares**.

Ocorreram 289 eventos respiratórios, sendo 0 central e 289 obstrutivos. Sendo 260 apnéias, 29 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 47.1/hora**, sendo 42.4 apnéia/hora e 4.7 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 24.4 e a duração máxima de 36.1.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 86.6/hora, sendo 86.6 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina** foi de **97%**, sendo a saturação média de **93%**, a maior de **99%** e a mínima de **81%**, permanecendo 40.3 minutos (9.5%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 289 dessaturações. Índice de dessaturações: 46.8/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 45.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 47.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Rosemeiry Tereza Marçal
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 71200

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Odontomarten - Odontomarten

Telefone

12 3922-9594

Paciente

Nome luciana fatima de oliveira cepinho
Data de nasc. 12/11/1971 (52 anos)
Sexo Feminino

Exame

Início 06/05/2024 - 22:12:22
Fim 07/05/2024 - 05:28:38
Tempo total 07:16:16 (436,3 min)
Tempo válido 07:10:04 (430,1 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço
☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 06/05/2024

Peso 66 kg
Altura 1,60 m
IMC 25,8

Sintomas

Respondido em 06/05/2024



- ☐ Ronco alto e frequente
☐ Dificuldade para manter o sono
☐ Sono agitado
☐ Sono não reparador
☐ Sonolência ou cansaço diurno
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☒ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 06/05/2024

- ☐ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Diabetes
☐ Depressão
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Doença respiratória
☒ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

- IDO < 5 Normal
5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 06/05/2024, iniciado às 22:12 e terminado às 05:28. O tempo total de registro foi de 7h16min (436 minutos) e o tempo válido foi de 7h10min (430 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 207 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 28,9/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 94% e permaneceu abaixo de 90% durante 6% do tempo de registro (26 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 84% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 28,9/hora), nas condições descritas.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂).
2. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%.
3. Os índices das notas 1 e 2 correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
4. A correlação entre o índice de carga hipóxica e risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Ali Azarbarzin et al, 2020).