**Instituto do Sono**
Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino
São Paulo – SP – CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

Nome: MAURICIO PIMENTEL DE LIMA
Sexo: M Idade: 57 anos Atendimento: 18459139
Peso: 90.0 Kg Altura: 180.0 cm IMC: 27.8 Kg/m$^2$ Data: 25/07/2025
Exame: 34837286
ID: 3298015
Médico solicitante: Dr(a). CARLOS HENRIQUE LABINAS DE OLIVEIRA

**Laudo de polissonografia: resultado**

O exame foi iniciado às 23:25:52 horas e finalizado às 06:08:46 horas. A **latência para o início do sono** foi de 2.0 minutos e **a latência para o início sono REM**, de 74.0 minutos. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 321.0 minutos, com **eficiência do sono** de 79.7%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 6.7% de **estágio N1**, 50.6% de **estágio N2**, 18.8% de **estágio N3** e 23.8% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi 79.9 minutos. Ocorreram 81 **despertares**, uma média de 12.7 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS – *periodic limb movements in sleep*) foi de 20.8 por hora, sendo 0.6 PLMS por hora **associados a despertares**.

O número total de eventos respiratórios foi de 24, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 21 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 3 despertares associados a esforço respiratório (RERA – *respiratory effort-related arousal*). O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 4.5 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de 3.9 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 3.90 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC), de 0.00 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina ($SpO_2$) **basal** foi de 96%; a **média**, 96% e a **mínima**, 87%. O **índice de dessaturação** foi de 20.4 por hora durante o sono REM e 10.6 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 0.3% do tempo total de registro.

**Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA**

**Instituto do Sono**
Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino
São Paulo – SP – CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

## Procedimento

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema Alice 6 LDxS. Foram utilizados parâmetros fornecidos por eletroencefalograma (F4-M1, F3-M2, C4-M1, C3-M2, O2-M1, O1-M2); eletro-oculograma bilateral; eletromiograma (mentoniano/submentoniano e tibial bilateral); eletrocardiograma (montagem D2 modificada); equipamento de PAP (fluxo aéreo); pletismografia por indutância (esforço respiratório torácico e abdominal); oximetria de pulso (saturação percutânea da oxi-hemoglobina – $SpO_2$); capnometria ($P_{ET}CO_2$); sensor de ronco (microfone) e posição corporal no leito.

**Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)**

## Análise do sono

| | |
|---|---|
| Data e horário de início | 25/07/2025 23:25:52 |
| Data e horário de término | 26/07/2025 06:08:46 |
| Tempo total de registro (TTR) | 402.9 min |
| Tempo total de sono (TTS) | 321.0 min |
| Latência para o início do sono | 2.0 min |
| Latência para o sono REM | 74.0 min |
| Tempo em vigília após adormecer | 79.9 min |
| Eficiência do sono (TTS/TTR x 100) | 79.7% |

## Estágios do sono

| | N1 | N2 | N3 | REM | Vigília |
|---|---|---|---|---|---|
| Duração (min) | 21.5 | 162.5 | 60.5 | 76.5 | 63.0 |
| Distribuição no TTS (%) | 6.7 | 50.6 | 18.8 | 23.8 | * |

## Despertares

| | Eventos | Índice (por hora) |
|---|---|---|
| Total de despertares | 81 | 12.7 |

## Frequência cardíaca

| | Média [bpm] | Máx [bpm] |
|---|---|---|
| Total | 65.0 | 97.0 |
| REM | 67.2 | |
| NREM | 64.3 | |
| Vigília | 71.9 | |

## Movimentos periódicos de membros durante o sono (PLMS - *periodic limb movements in sleep*)

| EMG tibial bilateral | Eventos | Índice (por hora) |
|---|---|---|
| PLMS | 133 | 20.8 |
| PLMS associados a despertares | 4 | 0.6 |

**Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)**

**Instituto do Sono**
Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino
São Paulo – SP – CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

## Eventos respiratórios

| | Total de eventos | Índices (por hora) | | | | | Duração (seg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REM | NREM | TTS | Supino | Não supino | Máxima | Média |
| Apneia obstrutiva (AO) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Apneia mista (AM) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Hipopneia obstrutiva (HO) | 21 | 12.5 | 1.2 | 3.9 | * | * | 69.5 | 32.8 |
| RERA | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 1.0 | 0.28 | 18.0 | 17.5 |
| AO+AM+HO | 21.00 | 12.50 | 1.20 | 3.90 | * | * | 69.50 | 32.80 |
| AO+AM+HO+RERA | 24.00 | 14.50 | 2.20 | 4.50 | * | * | 87.50 | 50.30 |
| Apneia central (AC) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Hipopneia central (HC) | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | * | * | 0.0 | 0.0 |
| AC+HC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | * | * | 0.00 | 0.00 |

Índice de apneia + hipopneia obstrutiva (IAHO): 3.90 (por hora)
IAH(O+C): 3.9 (por hora)
Índice de apneia + hipopneia central (IAHC): 0.00 (por hora)
Índice de hipopneia central e obstrutiva: 9.1 (por hora) em supino e 0.55 (por hora) em não supino
Índice de distúrbio respiratório (IDR): 4.5 (por hora)
Tempo de respiração de Cheyne-Stokes: 0.00 (min)

**Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)**
- **Apneia**: queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, por 10 segundos ou mais.
- **Hipopneia obstrutiva**: queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; presença de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal ou ronco durante o evento.
- **Hipopneia central**: queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; ausência de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal e ronco durante o evento.
- **RERA**: achatamento da curva de fluxo aéreo pela cânula de pressão por 10 segundos ou mais associado a despertar do EEG.
- **Respiração de Cheyne-Stokes**: presença de respiração periódica com padrão crescendo-decrescendo alternado por apneias ou hipopneias centrais, por 40 segundos ou mais.

## Saturação da oxi-hemoglobina

| | | | |
|---|---|---|---|
| Saturação média | 96% | Saturação TTR < 90% | 0.3% (1.2 min) |
| Saturação mínima | 87% | Saturação REM < 90% | 0.1% (0.4 min) |
| | | Saturação NREM < 90% | 0.1% (0.3 min) |
| Saturação média na vigília | 96% | | |
| Saturação média no sono REM | 95% | Saturação < 80% | 0.0% TTR (0.0 min) |
| Saturação média no sono NREM | 96% | Saturação < 70% | 0.0% TTR (0.0min) |
| Total de dessaturações | 73 | | |

Índice de dessaturação no sono 11.1 (por hora)
Índice de dessaturação no sono REM 20.4 (por hora)
Índice de dessaturação no sono NREM 10.6 (por hora)

**Instituto do Sono**
Rua Marselhesa, 500 – Vl. Clementino
São Paulo – SP – CEP 04020-060
Tel.: (11) 2108-7777

## Pressão positiva contínua em vias aéreas – CPAP

| CPAP | TTR | TTS | Apneias | | | | Hipopneias | | RERAs | | | | SpO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (min) | (min) | AC | AO | AM | Índice | H | Índice | RERAs | Índice | IAH | IDR | mín |
| **4** | 88.1 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 10.9 | 1 | 0.7 | 10.9 | 11.6 | 87 |
| **5** | 9.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 12.6 | 0 | 0.0 | 12.6 | 12.6 | 88 |
| **6** | 83.0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 92 |
| **7** | 159.5 | 147. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 92 |
| **8** | 35.9 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94 |




MAURICIO PIMENTEL DE LIMA, 3298015, 18459139

MAURICIO PIMENTEL DE LIMA, 3298015, 18459139

MAURICIO PIMENTEL DE LIMA, 3298015, 18459139