

Polissonografia Multimodal

Exame do Sono Biologix®

Exame

Nome	Teles Eduardo Pivetta	Nascimento	17/11/1978 (47 anos)	Sexo	Masculino
Início	18/01/2026 - 00:52:15	Tempo total	06:16:16 (376,3 min)		
Fim	18/01/2026 - 07:08:31	Tempo válido	06:05:38 (365,6 min)		

Condições na noite do exame

- ☒ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☒ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 15/01/2026

Peso 112 kg
Altura 1,82 m
IMC 33,8

Medicamentos

Respondido em 27/08/2024

- ☐ Nenhum
- ☒ Valsartana 80mg
- ☒ Rosuvastatina 10mg


Sintomas Respondido em 15/01/2026

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☐ Engasgos noturnos
- ☐ Refluxo gastroesofágico
- ☒ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 27/08/2024

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☒ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 18/01/2026, iniciado às 00:52 e terminado às 07:08. O tempo total de registro foi de 6h16min (376 minutos) e o tempo válido foi de 6h05min (365 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 181 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 29,7/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e permaneceu abaixo de 90% durante 5% do tempo de registro (21 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 50% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 29,7/hora), nas condições descritas.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:

- Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
- O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
- Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
- A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Polissonografia Multimodal

Exame do Sono Biologix®


Exame

Nome	Teles Eduardo Pivetta	Nascimento	17/11/1978 (47 anos)	Sexo	Masculino
Início	18/01/2026 - 00:52:15	Tempo total	06:16:16 (376,3 min)		

Oximetria (SpO₂)



Frequência cardíaca



Sono estimado

Tempo total de sono	335,5 min
Tempo para dormir	23,5 min
Tempo acordado pós-sono	15,0 min
Eficiência do sono	89%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 110,3 %.min /hora



Análise de ronco

Tempo de gravação	377,0 min
Tempo com ronco	188,5 min (50%)



Polissonogramas

