

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: RAFAELA GARCEZ BERNARDES NOVAES LEITE **Sexo:** Feminino
Data do Exame: 11-09-2025 **Idade:** 53 anos
Peso: 81 kg **Altura:** 1,73 m
Médico Solicitante: DR. MARCELO TEIXEIRA DA SILVA
NOVAES LEITE

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 11/09/2025 19:10 e finalizado às 12/09/2025 06:30.

A latência para início do sono foi de **10,5** min e a latência para o sono REM de **144,0** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 438,5 min, com eficiência do sono de **91,0** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **1,5** % de estágio N1, **62,1** % de estágio N2, **19,0** % de estágio N3 e **17,3** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 33,0 min. Ocorreram 144 despertares, sendo o índice de **17,9 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **1,9 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 177, sendo 22 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 155 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **24,2 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 28,4 e o IDR durante o sono NREM foi de 23,3. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 24,2 (nº/h), sendo 3,0 apneia/h e 21,2 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina** (SAO₂) **basal** foi 96%, a **média** de 95% e a **mínima** de 87%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 22,0 (nº/h), sendo que em REM foi de 28,4 (nº/h) e em NREM foi de 23,3 (nº/h). Permaneceu 0,2 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório moderado **(24,2 n°/h)** (VN= até 5 n°/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina **(87%)**;
3. Latência para o início do sono normal **(10,5 min)** (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM **(144,0 min)** (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono preservada **(91,0 %)** (VN= $\geq 85\%$);
6. Aumento do índice de despertares **(17,9 n°/h)** (VN= até 15 n°/h);
7. Diminuição do percentual do estágio N1 **(1,5 %)** (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 **(62,1 %)** (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal **(19,0 %)** (VN= 13% a 23%);
10. Diminuição do percentual do estágio REM **(17,3 %)** (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;
12. Presença de movimento periódico de membros inferiores com índice normal (1,9 (n°/h) (VN= até 15 n°/h);

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

DADOS DO PACIENTE:

Nome: RAFAELA GARCEZ BERNARDES NOVAES LEITE
ID: 0
Altura: 1,73 m
Peso: 81 kg
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 25-11-1971
IMC: 27,06

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 19:10:18
Data do Exame: 11-09-2025
Médico Solicitante: DR. MARCELO TEIXEIRA DA SILVA NOVAES LEITE

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	11/09/2025 19:10
Data/Horário de Término:	12/09/2025 06:30
Tempo Total de Registro (TTR):	482,0
Tempo Total de Sono (TTS):	438,5
Latência para o início do sono:	10,5
Latência para o sono REM:	144,0
Tempo acordado após o adormecer:	33,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	91,0 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	6,5	272,5	83,5	76,0	43,5
% de TTS	1,5	62,1	19,0	17,3	9,0

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total despertares de	144	17,9

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	72,6	85
NREM	74,7	89
Vigília	79,9	190

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	22	0	22	155	177	0	177
Índice	0,0	3,0	0,0	3,0	21,2	24,2	0,0	24,2
Índice em REM	0,0	2,4	0,0	2,4	26,1	28,4	0,0	28,4
Índice em NREM	0,0	3,1	0,0	3,1	20,2	23,3	0,0	23,3
Duração máx (seg)	0	31,4	0	31,4	32,5	32,5	0	32,5
Duração média (seg)	0	15,2	0	15,2	20,0	17,6	0	17,6
Índice em Supino	0	1,0	0	1,0	18,6	19,6	0	19,6
Índice em Não Supino	0,0	7,4	0,0	7,4	26,8	34,2	0,0	34,2

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;

- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;

- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 24,2 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 24,2 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	95%	87%
NREM:	95%	91%
REM:	96%	87%
Vigília:	96%	80%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 95%


Total de dessaturações: 177


"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	1	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	3	0	32	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	17	0	61	0
DIREITO	0	0	0	0	0
ESQUERDO	0	0	0	0	0
SUPINO	0	2	0	61	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	91,0 %	≥85%
Latência para o início do sono	10,5 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	144,0 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	1,5 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	62,1 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	19,0 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	17,3 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	9,0 %	5%
Índice de despertares	17,9 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	24,2 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h