

H 369068784761
CD7320189 1F4D

NS J37162068F478

ANA ROSA DE OLIVEIRA BELLINI			
IDADE: 46	PESO: 92	ALTURA: 1,66	PROFISSÃO: Biomédica
SINTOMAS: cansada; diário / afalada (acordava no peito)			
QUEIXAS: Fibromialgia (veligia / diminuir).			
MEDICAMENTOS: HAS, Anxiolíticos.			
MÉDICO: Dr. William Nunes			
EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates (2x)			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S			
HORA QUE DORME: 00h	HORA QUE ACORDA: 8h.		
COCHILLO (X)SIM ()NÃO	DORME ACOMPANHADO (X)SIM ()NÃO ()EVENTUAL		
BEBIDA ALCOÓLICA ()SIM ()X NA SEMANA (X)NÃO			
FUMO ()SIM ()MAÇO/DIA (X)NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 1x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI:	IAH: 19.1h	SPO2: 99%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (X)NASAL ()AMIGDALECTOMIA 2021.			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (X)RESPIRATÓRIA (N)ENDÓCRINA (S)CARDÍACA			
()ORTOPÉDICA ()NEUROLÓGICA ()OUTROS			
22/09/23 Adaptado tubo 540 - máx Swift (M).			
P: 4 a 10 cmH ₂ O			
FRR a rampa 5min			
29/09/23 P= 8.5 e 1h			
m. de uso: 8h53'			
IAH= 1.2 e 1h			
Bem adaptada, s/ queixas, conseguiu ir ao			
na cama. sua.			
16/10/23 P= 8.6 cmH ₂ O			
IAH= 1.4 e 1h			
m. de uso: 7h3'			
Fuga= 3.7 e 1h			
- Relata que houve escape de ar no			
por mato. melhora da dispênia			
17/11/23 P= 8.6 cmH ₂ O			
IAH= 2.4 e 1h			
Fuga= 9.			
08/01/24 P= 8.6 cmH ₂ O			
IAH= 1.4 e 1h			
Fuga= 5.4 l/min			
m. de uso: 5h55			
Devolveu aparelho			
Comprou BNC			
Ana			
14/02/24 Bem adaptado s/ queixas.			
Troca a traqueia			
sua			

17/04 P = 8,5 cmH₂O

24 IAH = 1,3 e/h

m. de uso: 6h38m

fuga: 1,7 l/m

Bem adaptada
s/ queixa

Natacha

19/06/24 P = 8,5 cmH₂O

IAH = 1,1 e/h

m de uso: 6h05m

Bem adaptada
s/ queixas

Natacha

24/09/24 P = 8,5 cmH₂O

IAH = 1,2 e/h

m de uso: 6h51'

fuga: 0,1 l/m

Relata estar dormindo
mal por problemas
cardíacos (prolapso
e fístula)

Natacha

26/11/24 Trocamos o CPAP por estava na garantia. - J.

10/02/25 - Passa p/ pressão fixa.

17/02 P = 8,0 cmH₂O

25 IAH = 0,5 e/h

m. de uso: 7hr.

Ana.

18/03 Troco aparelho p/ DreamStation - Philips

02/04 P = 8,0 cmH₂O

25 + a pressão inicial p/ 5,0 cmH₂O

IAH = 4,4 e/h

m. de uso: 7hr

Ana

07/05/25 P = 8,0 cmH₂O

IAH = 3,8 e/h

m de uso: 7h6'

fuga: 0

Bem adaptada
Trocou filtro

Natacha

23/07
25

P = 8,5 cmH₂O

IAH = 1,4 e/h

m. de uso: 5hr.

fuga = 4".

Ana Cláudia

Nome: ANA ROSA DE OLIVEIRA BELLINI

Data de Nascimento: 16-9-1977

IMC: 29,03

Sexo: Feminino

Data do exame: 31-05-2019

Peso: 80 kg

Altura: 1,66 m

Médico: WILLIAM NUNES DE OLIVEIRA

Medicamentos: 0

Histórico: G47.3

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 31-05-2019, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 536,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 56,5 e 184,0 minutos. O tempo total de sono foi de 418,0, eficiência de 78,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 54,4%; estágio N3: 21,2%; sono REM: 22,0%. O índice de despertares foi de 11,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopnéia total foi de 19,1, sendo elas 14 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 119 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e mínima de 79%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 64 - 108 bpm e NREM de 62 - 110 bpm.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 19,1/hora; ✓
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=79%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (27,7/hora); ✓
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.