MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2000

D

Série : D

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **03 Heures 15 Minutes**
Coefficients : **4**

****

Exercice 1 — 5 points

$\mathcal{P}$ est un plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct (O ; $\vec{u}$, $\vec{v}$). On prendra 1 cm pour unité graphique.

1. a. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - (6 - i)z + 11 - 3i = 0$. ***(0,5 pt)***
   b. Déterminer les nombres complexes z et z' tels que :
   $$\begin{cases} 2z - z' = 6 - 5i \\ -z + z' = 3i. \end{cases}$$ ***(0,5 pt)***

Dans tout ce qui suit, on note par A, B, C et D les points d'affixes respectives a = 3 + i, b = 3 – 2i, c = 6 – 2i et d = 6 + i.

2. a. Placer dans $\mathcal{P}$ les quatre points A, B, C et D. ***(0,5 pt)***
   b. Démontrer que le triangle (BAD) est isocèle et rectangle en A, et le triangle (BCD) est isocèle et rectangle en C. ***(0,75 pt)***
   c. En déduire que les quatre points A, B, C et D se trouvent sur un même cercle (Γ) dont on précisera le centre Ω et le rayon. Tracer (Γ) sur la figure précédente. ***(0,75 pt)***
3. Soit S la similitude plane directe de centre A et qui transforme B en C.
   a. Préciser les éléments caractéristiques de S. ***(1 pt)***
   b. Construire sur la figure précédente le transformé de ABCD par S. ***(1 pt)***

Exercice 2 — 5 points

N.B. : On exprimera les résultats sous forme décimale à 10^{-2} près.
Le tableau suivant indique les variations du chiffre d'affaires y_i d'une entreprise selon les frais de publicité x_i (x_i et y_i sont exprimés en millions de francs malagasy) de 1992 à 1999.

Années	***1992***	***1993***	***1994***	***1995***	***1996***	***1997***	***1998***	***1999***
x_i	2	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1
y_i	52	59	60	65	70	72	73	75

On donne :

$$\sum_{i=1}^{8} x_i = 24{,}40 \ ; \ \sum_{i=1}^{8} y_i = 526 \ ; \ \sum_{i=1}^{8} x_i^2 = 78{,}20 \ ; \ \sum_{i=1}^{8} y_i^2 = 35048 \ ; \ \sum_{i=1}^{8} x_i y_i = 1645{,}10.$$

1. a. Représenter le nuage de points $M_i(x_i , y_i)$.
   (Unité graphiques :
   - 2 cm représente 1 million de francs malagasy sur l'axe des abscisses.
   - 1 cm représente 10 millions de francs malagasy sur l'axe des ordonnées). ***(1 pt)***
   b. Calculer les coordonnées du point moyen G et placer ce point. ***(0,75 pt)***
2. a. Montrer que le coefficient de corrélation linéaire associé à cette série statistique est : $r \otimes 0{,}98$. ***(1,5 pt)***
   b. Interpréter ce résultat. ***(0,25 pt)***
   c. Par la méthode des moindres carrés, donner l'équation de la droite de régression de y en x et tracer cette droite. ***(0,75 pt)***
3. a. Montrer que $x_1, x_2, \ldots, x_8$ constituent les 8 premiers termes d'une suite arithmétique (x_n) dont on précisera la raison. ***(0,25 pt)***
   b. Donner une estimation du chiffre d'affaires de cette entreprise en 2002. ***(0,5 pt)***

Exercice 3 — 5 points

N.B. : – Les questions 1. et 2. sont indépendantes.
- On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

Une urne contient des boules indiscernables au toucher : rouges, vertes et noires.

1. On suppose qu'il y ait 12 boules dans l'urne dont : 3 rouges, 4 noires et 5 vertes. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne.
   a. Déterminer le nombre de tirages possibles. ***(0,5 pt)***
   b. Déterminer les probabilités des événements suivants :
      A : « Avoir 3 boules noires ». ***(0,5 pt)***
      B : « Avoir 3 boules de même couleur ». ***(0,5 pt)***
      C : « Avoir au moins deux boules noires ». ***(0,5 pt)***
      D : « Avoir au plus deux boules rouges ». ***(0,5 pt)***
2. On suppose qu'il y ait 25% de boules rouges dans l'urne. On appelle « gain » l'obtention d'une boule rouge lors d'un tirage d'une boule de l'urne. L'expérience consiste à tirer au hasard et successivement 4 boules de l'urne en remettant dans l'urne chaque boule tirée avant de tirer une autre. Soit X la variable aléatoire qui à chaque expérience associe le nombre de gains.
   a. Vérifier que l'univers image de X est {0, 1, 2, 3, 4}. ***(0,25 pt)***
   b. Montrer que la probabilité d'avoir 3 gains est égale à $\frac{3}{64}$. ***(0,5 pt)***
   c. Déterminer la loi de probabilité de X. ***(1 pt)***
   d. Définir la fonction de répartition F de X. ***(0,5 pt)***
   e. Si n est le nombre de boules rouges, 3n – 7 le nombre de boules vertes et 2n – 1 le nombre de boules noires dans l'urne, calculer n. ***(0,25 pt)***

Exercice 4 — 5 points

On considère la fonction f définie sur $[\,0\,;+\infty\,[$ par : $f(x) = \dfrac{e^x - 1}{e^x - x}$.

On note par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{i}\,,\vec{j}\,)$, d'unité 2 cm.

1. Soit h la fonction définie sur $[\,0\,;+\infty\,[$ par : $h(x) = (-x+2)\,e^x - 1$.
   a. Etudier les variations de h et dresser son tableau de variation. (On ne demande pas de tracer la courbe représentative de h). ***(0,5 pt)***
   b. Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique α dans $[\,0\,;+\infty\,[$. Vérifier que α est compris entre $\frac{3}{2}$ et 2. ***(0,5 pt)***
   c. En déduire, suivant les valeurs de x, le signe de h (x). ***(0,5 pt)***
2. a. Déterminer la limite de f en $+\infty$. Interpréter graphiquement ce résultat. ***(0,5 pt)***
   b. Etudier, suivant les valeurs de x, la position relative de $(\mathcal{C})$ par rapport à la droite (D) d'équation y = 1. (On admet que $e^x - x > 0$ sur $[\,0\,;+\infty\,[$). ***(0,5 pt)***
3. a. Montrer que pour tout x de $[0\,;+\infty[$, $f'(x) = \dfrac{h(x)}{\left(e^x - x\right)^2}$. ***(0,5 pt)***
   b. Montrer que $f(\alpha) = \dfrac{1}{\alpha - 1}$ et donner le tableau de variation de f. ***(0,5 pt)***
   c. Tracer (D) et $(\mathcal{C})$ dans un même repère. (On prendra $\alpha \approx 1{,}84$ et $f(\alpha) \approx 1{,}20$). ***(0,5 pt)***
4. Soit F la fonction définie sur $[\,0\,;+\infty\,[$ par : $F(x) = \ln(e^x - x)$.
   a. Calculer $F'(x)$. ***(0,5 pt)***
   b. On note par $\mathcal{A}(\alpha)$ l'aire du domaine plan limité par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe (x 'Ox), les droites d'équations $x = 0$ et $x = \alpha$. Utiliser l'égalité $h(\alpha) = 0$ pour montrer que $\mathcal{A}(\alpha) = 4 \ln\left[\dfrac{(1-\alpha)^2}{2-\alpha}\right]$ cm². ***(0,5 pt)***

==========