

Contents

Información de la consulta	3
Médico	
Paciente	
Pruebas Realizadas	
Inspección visual general	
Otoscopia	
Timpanometria	
Toma de temperatura	
•	
Diagnóstico	
Resultados de las pruebas	
Otitis	
Tratamiento	
Medicación	
Ibuprofeno	
Amoxicilina	
Recomendaciones	
Pagamendagiones para la Otitis	

Información de la consulta

Médico

Nombre: Dr. Javier López

Especialidad: Medicina General **Número de colegiado:** 123456

Centro de salud: Centro Médico San Rafael

Años de experiencia: 15 años

Horario de atención: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00

Idiomas: Español, Inglés

Paciente

Nombre: Javier

Apellidos: López Martínez

Edad: 23

Alergias: Alergia al polen

Motivo de consulta: El paciente llega con síntomas de dolor de oídos y fiebre

Pruebas Realizadas

Inspección visual general

Observación del aspecto general del paciente. El médico observa la coloración de la piel, signos de fatiga, inflamación visible, lesiones cutáneas o cualquier otro indicio externo que pueda ayudar a identificar enfermedades comunes.

Otoscopia

Exploración visual del oído mediante otoscopio. La prueba trata de un examen médico que permite visualizar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica, utilizando un instrumento llamado otoscopio. Es una prueba diagnóstica importante para evaluar la salud auditiva y detectar posibles enfermedades del oído.

Timpanometria

Prueba auditiva que evalúa el estado del oído medio. Se introduce un dispositivo en el oído para cambiar la presión del aire y hacer que el tímpano se mueva para detectar posibles problemas en el oído medio, como perforación timpánica, otitis infecciosa, tumores, etc.

Toma de temperatura

Medición de la temperatura corporal para detectar fiebre. Se realiza con un termómetro digital, en la axila, la boca o el oído. La fiebre puede ser indicativa de infección o inflamación y orienta el diagnóstico inicial.

Diagnóstico

Resultados de las pruebas

Tras las pruebas realizadas en la misma consulta, se ha llegado a la conclusión que el paciente padece una otitis aguda con cuadros de fiebre moderada. A continuación se le mostrará más información sobre la patología detectada y su correcto tratamiento.

Otitis

Se denomina otitis a la inflamación del oído. Existe diferentes tipos, pero la más común se denomina otitis media. La otitis media es la presencia de líquido (con o sin pus), llamado exudado y que es producto de una inflamación, en la cavidad del oído medio, que se localiza justo detrás del tímpano.



Se produce cuando la trompa de Eustaquio -el canal que conecta la parte media del oído con la garganta- se obstruye por diferentes motivos. La función de esta trompa es drenar el líquido que se produce en el oído medio, por lo que, si se obstruye, se puede acumular este líquido y producirse una infección. Se trata de una de las enfermedades más frecuentes en la infancia y uno de los principales motivos de consulta al pediatra. De origen viral o bacteriano, la persistencia de este proceso durante varios meses puede dar lugar a la pérdida de audición en los niños.

Tratamiento

Medicación

Ibuprofeno

Nombre comercial: Ibuprofeno

Tipo: Antiinflamatorio

Dosis recomendada: 400 mg cada 8 horas si hay dolor o fiebre.

Observaciones: Tomar con comida para evitar molestias estomacales. No se recomienda en personas con problemas

gástricos.

Amoxicilina

Nombre comercial: Amoxicilina

Tipo: Antibiótico

Dosis recomendada: 500 mg cada 8 horas durante 7 días.

Observaciones: Es importante completar el tratamiento antibiótico aunque desaparezcan los síntomas. Puede causar

molestias digestivas.

Recomendaciones

Recomendaciones para la Otitis

• Evitar el uso de bastoncillos de algodón, ya que pueden dañar el oído.

- Secarse bien los oídos después de nadar, bañarse o ducharse.
- Dormir con la cabeza elevada para reducir la inflamación.
- Aplicar un paño húmedo y tibio sobre la oreja para disminuir el dolor.