

Contents

Información de la consulta	
Médico	3
Dr. Javier López	3
Datos del paciente	3
Resumen de la consulta	3
Pruebas Realizadas	3
Exploración faríngea	
Toma de temperatura	3
Diagnóstico	3
Resultados de las pruebas	
Laringitis	
Tratamiento	5
Medicación	
Ibuprofeno	
Paracetamol	
Recomendaciones	5
Recomendaciones para la Laringitis	5

Información de la consulta

Médico

Dr. Javier López

Nombre: Dr. Javier López

Especialidad: Medicina General **Número de colegiado:** 123456

Centro de salud: Centro Médico San Rafael

Años de experiencia: 15 años

Horario de atención: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00

Idiomas: Español, Inglés

Datos del paciente

Resumen de la consulta

Nombre: Tono

Apellidos: Abad Ballbe

Edad: 22

Síntomas: El paciente llega con dolor de huevos

Pruebas Realizadas

Exploración faríngea

Inspección de la garganta con ayuda de un depresor lingual. Permite visualizar la faringe, las amígdalas y el paladar blando. Es fundamental para diagnosticar infecciones como faringitis, amigdalitis o mononucleosis.

Toma de temperatura

Medición de la temperatura corporal para detectar fiebre. Se realiza con un termómetro digital, en la axila, la boca o el oído. La fiebre puede ser indicativa de infección o inflamación y orienta el diagnóstico inicial.


Diagnóstico

Resultados de las pruebas

Padece de puterismo

Laringitis

La laringitis es una afección caracterizada por la inflamación de la laringe, que es la estructura anatómica situada en la parte superior de la tráquea y donde se alojan las cuerdas vocales. Esta inflamación puede tener múltiples causas, aunque la más habitual es de origen viral. También puede producirse por uso excesivo de la voz, exposición a agentes irritantes como el humo del tabaco o el polvo, o debido al reflujo gástrico.



El síntoma más distintivo de la laringitis es la ronquera, que puede llegar a una pérdida total de la voz en casos más agudos. También pueden presentarse dolor o molestias en la garganta, tos seca persistente y una sensación de cosquilleo o cuerpo extraño al tragar. El habla suele requerir esfuerzo, y en los niños pequeños, si la inflamación es muy intensa, puede producirse una obstrucción parcial de las vías respiratorias. Aunque en la mayoría de los casos es una enfermedad leve y pasajera, la laringitis puede volverse crónica si se mantiene la exposición a los factores desencadenantes.

Tratamiento

Medicación

Ibuprofeno

Nombre comercial: Ibuprofeno

Tipo: Antiinflamatorio

Dosis recomendada: 400 mg cada 8 horas si hay dolor o fiebre.

Observaciones: Tomar con comida para evitar molestias estomacales. No se recomienda en personas con problemas

gástricos.

Paracetamol

Nombre comercial: Paracetamol Tipo: Analgésico y antipirético

Dosis recomendada: 500-1000 mg cada 6-8 horas si hay fiebre o dolor.

Observaciones: No superar los 4 gramos diarios. Usar con precaución en personas con problemas hepáticos.

Recomendaciones

Recomendaciones para la Laringitis

- Evitar hablar mucho o forzar la voz; guardar reposo vocal.
- · Hidratarse bien, preferentemente con líquidos calientes.
- Usar humidificadores para mantener el aire húmedo.
- · Evitar ambientes con humo o contaminantes.