

Contents

Información de la consulta	3
Dr Juan Pérez	
Resumen de la consulta	
Pruebas Realizadas	
Inspección visual general	
Exploración faríngea	
Diagnóstico	
Amigdalitis	
Tratamiento	5
Medicación	
Ibuprofeno	
Amoxicilina	
Recomendaciones	5
Recomendaciones para la Amigdalitis	

Información de la consulta

Dr Juan Pérez

Nombre: Dr. Juan Pérez

Especialidad: Medicina General Número de colegiado: 424245

Centro de salud: Centro Médico San Rafael

Años de experiencia: 32 años

Horario de atención: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00

Idiomas: Español, Inglés

Resumen de la consulta

Nombre: Pepe

Apellidos: Botella Lopez

Edad: 44

Síntomas: El paciente llega con muchos signos de dolor de garganta, prácticamente muriéndose. Espero que no sea

nada.

Pruebas Realizadas

Inspección visual general

Observación del aspecto general del paciente. El médico observa la coloración de la piel, signos de fatiga, inflamación visible, lesiones cutáneas o cualquier otro indicio externo que pueda ayudar a identificar enfermedades comunes.


Exploración faríngea

Inspección de la garganta con ayuda de un depresor lingual. Permite visualizar la faringe, las amígdalas y el paladar blando. Es fundamental para diagnosticar infecciones como faringitis, amigdalitis o mononucleosis.

Diagnóstico

Amigdalitis

La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas, generalmente causada por infecciones virales o bacterianas.



Manchas blanq

Amigadalitis

(Viral y bacteriana)

Suele provocar dolor de garganta, fiebre, ganglios inflamados en el cuello y dificultad para tragar. En algunos casos, las amígdalas pueden tener una capa blanca o amarilla.

Tratamiento

Medicación

Ibuprofeno

Nombre comercial: Ibuprofeno

Tipo: Antiinflamatorio

Dosis recomendada: 400 mg cada 8 horas si hay dolor o fiebre.

Observaciones: Tomar con comida para evitar molestias estomacales. No se recomienda en personas con problemas

gástricos.

Amoxicilina

Nombre comercial: Amoxicilina

Tipo: Antibiótico

Dosis recomendada: 500 mg cada 8 horas durante 7 días.

Observaciones: Es importante completar el tratamiento antibiótico aunque desaparezcan los síntomas. Puede causar

molestias digestivas.

Recomendaciones

Recomendaciones para la Amigdalitis

- Consumir alimentos blandos y fríos que no irriten la garganta.
- Hidratarse bien, preferiblemente con agua o bebidas no azucaradas.
- Evitar cambios bruscos de temperatura ambiental.
- Guardar reposo en casa para prevenir el empeoramiento.