

Contents

Infor	mación de la consulta	. 3
	Médico	
	Dr. Javier López	
	Datos del paciente	
	Resumen de la consulta.	3
Prue	bas Realizadas	. 3
	Exploración faríngea.	
	Auscultación pulmonar	3
	nóstico	
	Resultados de las pruebas	4
	Amigdalitis	. 4
Trata	amiento	.5
	Medicación	4
	Ibuprofeno	
	Salbutamol	
	Recomendaciones	5
	Recomendaciones nara la Laringitis	4

Información de la consulta

Médico

Dr. Javier López

Nombre: Dr. Javier López

Especialidad: Medicina General **Número de colegiado:** 123456

Centro de salud: Centro Médico San Rafael

Años de experiencia: 15 años

Horario de atención: Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00

Idiomas: Español, Inglés

Datos del paciente

Resumen de la consulta

Nombre: Alejandro

Apellidos: Casado Figueredo

Edad: 23

Síntomas: No se

Pruebas Realizadas

Exploración faríngea

Inspección de la garganta con ayuda de un depresor lingual. Permite visualizar la faringe, las amígdalas y el paladar blando. Es fundamental para diagnosticar infecciones como faringitis, amigdalitis o mononucleosis.

Auscultación pulmonar

Escucha de los sonidos pulmonares mediante estetoscopio. Esta prueba permite detectar ruidos anómalos en los pulmones como sibilancias, estertores o disminución del murmullo vesicular, que pueden indicar infecciones respiratorias, asma o neumonía.


Diagnóstico

Resultados de las pruebas

cewdcwedew

Amigdalitis

La amigdalitis es una inflamación de las amígdalas, que son masas de tejido linfático situadas a ambos lados de la garganta y que forman parte del sistema inmunitario. Esta inflamación puede ser provocada por agentes virales, como los adenovirus o el virus de Epstein-Barr, o por bacterias, siendo el estreptococo del grupo A la causa bacteriana más común. La enfermedad se transmite a través del contacto con secreciones respiratorias de personas infectadas.



Los síntomas típicos de la amigdalitis incluyen dolor de garganta intenso, que se agrava al tragar, fiebre, inflamación visible de las amígdalas —que pueden presentar una coloración rojiza o incluso manchas de pus—, y mal aliento. En algunos casos, se acompañan de ganglios linfáticos inflamados en el cuello y sensación general de malestar. Aunque puede afectar a personas de todas las edades, es más frecuente en niños y adolescentes. Cuando la amigdalitis es recurrente o causa complicaciones, como infecciones alrededor de las amígdalas o problemas respiratorios, puede llegar a requerirse intervención médica más profunda.

Tratamiento

Medicación

Ibuprofeno

Nombre comercial: Ibuprofeno

Tipo: Antiinflamatorio

Dosis recomendada: 400 mg cada 8 horas si hay dolor o fiebre.

Observaciones: Tomar con comida para evitar molestias estomacales. No se recomienda en personas con problemas

gástricos.

Salbutamol

Nombre comercial: Ventolin (Salbutamol)

Tipo: Broncodilatador

Dosis recomendada: 1-2 inhalaciones cada 4-6 horas si hay dificultad respiratoria.

Observaciones: Usar únicamente en caso de necesidad. Puede causar temblores o palpitaciones.

Recomendaciones

Recomendaciones para la Laringitis

- Evitar hablar mucho o forzar la voz; guardar reposo vocal.
- · Hidratarse bien, preferentemente con líquidos calientes.
- Usar humidificadores para mantener el aire húmedo.
- · Evitar ambientes con humo o contaminantes.