Luces nocturnas (Night Light Density) por distrito, panel anual 1995-2013

Nombre de base de datos: Luces nocturnas (Night Light Density) por distrito, panel anual 1995-2013

Resumen

La intensidad de luz nocturna medida por satélite es una medida alternativa y confiable de actividad económica, útil cuando no existe PBI a nivel local. La base contiene el promedio de los píxeles de intensidad de luz nocturna detectados en cada distrito del Perú, por año.

Al ser un panel de datos a nivel distrito, permite evaluar shocks (por ejemplo, desastres naturales, proyectos de infraestructura o políticas) y verificar si hubo un cambio en la actividad económica del distrito.

Ficha rápida

Tema: Actividad económica; crecimiento económico local; teledetección (remote sensing)

Unidad de observación: Distrito por año

Cobertura geográfica: Perú, 1,832 distritos

Periodo: 1995-2013 (anual, 19 años) según los datos del archivo

Tipo de datos: Panel balanceado distrito-año

Formato: Stata (.dta)

Tamaño: 34,808 observaciones (1,832 distritos x 19 años)

Identificador para unir: ubigeo y year

Palabras clave y sinónimos

luces nocturnas, luz nocturna, night lights, nighttime lights, night light density, NLD, imágenes satelitales, teledetección, remote sensing, actividad económica, proxy del PBI, PBI distrital, crecimiento económico local, desarrollo regional, evaluación de impacto, shocks, panel distrital, diferencias en diferencias.

Preguntas que esta base de datos ayuda a responder

- ¿Cómo medir la actividad económica a nivel distrito si no hay PBI distrital?
- ¿Hay datos de luces nocturnas (night lights) para los distritos del Perú?
- ¿Cómo cambió la actividad económica de un distrito después de un shock como el Fenómeno El Niño de 1998?
- Necesito un panel distrital anual para un análisis de diferencias en diferencias.
- ¿Qué distritos crecieron más económicamente entre 1995 y 2013?

Archivos incluidos

- data/District_NLD_1992_2013.dta: panel de luces nocturnas por distrito y año.

Variables principales

- ubigeo: código del distrito
- year: año (1995-2013)
- light_mean: promedio de la intensidad de luz nocturna de los píxeles del distrito

Notas y advertencias de uso

- Aunque el nombre del archivo dice 1992-2013, los datos disponibles van de 1995 a 2013.
- Se sugiere usar la transformación seno hiperbólico inverso (inverse hyperbolic sine, IHS) o Box-Cox, porque la distribución tiene un sesgo (skew) muy alto: la mayoría de valores de intensidad de luz se concentran cerca de cero.
- En el archivo, ubigeo está guardado como número (se pierde el cero inicial, por ejemplo 10101 en lugar de 010101) y light_mean como texto; convertir ubigeo a texto de 6 dígitos y light_mean a número antes de usar.

Fuente y acceso

Fuente: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/NOAA_DMSP-OLS_NIGHTTIME_LIGHTS?hl=es-419

Link de Dropbox:
https://www.dropbox.com/scl/fo/270fqc677z3y9bbb4gu93/AOoZhvI2tLninyvXJHsAklo?rlkey=x6tq3395hzxjsvocrfmy4rscs&st=o2kqwjjh&dl=0