



IDENTIFICATION DE LA VICTIME

CIRCONSTANCIEL si case rouge = potentiellement critique

BILAN PRIMAIRE si case rouge = critique

BILAN SECONDAIRE si case rouge = potentiellement critique

A AIRWAYS **VOIES AERIENNES** Libres et sécurisées ☐ A risques ☐ Obstruées ☐

CIRCULATION	OUI	NON	Normale		si ≥ 2 éléments =	
C CIRCULATION					Irrégulier	
					Pouls filant	
					Radial absent	
					Anomalie	
					TRC >2s	
					Marbrures	
					Pealeur	
					Peau froide moite	

EXPOSITION

E

EXPOSURE

PARAMETRES VITAUX si > normes = Glycémie

Fréquence respiratoire			/ min	
Fréquence circulatoire			/ min	
Pression artérielle	BG			CO expiré ppm
	BD			Température °C

INTERROGATOIRE MHTAF PQRST

Hospitalisation : _____ Echelle douleur : _____
 Traitement : _____ (EN / EVA de 0 à 10)

Allergie :	
Facteurs de risques :	EN/EVA > 6

Depuis quand : _____ Qualité de la douleur : _____

Episode n°		Douleur thoracique non traumatique	
Intoxication			

Produit : Troubles neuro initiaux

EXAMEN COMPLET

Normal	☐	Crachats sanglants	☐	Morsure langue	☐
TROUBLES		Vomissements sanguinolents	☐	Perte d'urines	☐
		Vomissements	☐	Diarrhées	☐
Vue	☐	Nausées	☐	Atteinte dentaire	☐
Équilibre	☐	Saignement nez	☐	Urticaire	☐
Audition	☐	Saignement oreille	☐	Oedème de la face	☐
				Perte des eaux	☐

Gestation
Durée du travail

FACTEURS AGGRAVANTS (à transmettre au SAMU)

Age < 5 ou > 65 ☐ Grossesse ☐

Troubles de la coagulation ☐ ATCD cardio/respi ☐

VICTIME CRITIQUE

NON CRITIQUE ☐

POTENTIELLEMENT CRITIQUE

BILAN EVOLUTIF

MEDICAL (<i>champ obligatoire à remplir par le médecin ou l'infirmier</i>)	N° INTERV :	DATE :
---	--------------------	---------------

Score de Glasgow	Y :	V :	M :	SEXE		AGE	
------------------	-----	-----	-----	------	--	-----	--

NOM : Fonction : Signature :

thérapeutique / dose	Qté administrée	Horaire	Protocole N°/Prescripteur	voie adm.

OBSERVATIONS

TRANSPORT ET RELAIS

☐ Service d'urgence	☐ VSAV	ISP ☐	
☐ Cabinet médical	☐ Transport sanitaire privé	Médicalisé ☐	SPDT ☐
☐ UMH	☐ Transport hélicopté	Laissé sur place ☐	SPDRE ☐
☐ Autres	☐ Forces de l'ordre	Refus de transport ☐	

Naissance			DCD	Carte vitale			Carte d'identité	Nom :
				Ordonnance			Carte Mutuelle	Signature :
Lieu :				Effets personnels			Autre :	

REDACTEUR	MATERIEL SDIS
-----------	---------------

Nom : _____

Signature : _____

A	Alert	La victime interagit spontanément « elle est consciente, alerte »
V	Verbal	La victime réagit à la stimulation vocale « elle est somnolente, réactive à la voix »
P	Pain	La victime réagit uniquement à la douleur «elle est inconsciente et réactive à la douleur»
U	Unresponsive	La victime ne réagit pas « elle est aréactive »

AIDE A LA REDACTION

Cochez et remplissez les réponses suivant votre bilan

☐

Bilan primaire : victime à priori dans un état critique


☐

Bilan secondaire et/ou circonstanciel : victime à priori dans un état potentiellement critique

☐

Zone réservée au paramédicaux / médicaux

SCORE DE MALINAS			
Conduite à tenir face à un accouchement			
Nombre d'accouchements	1	2	3 ou plus
Durée du travail	< 2 H	2 À 5 H	> 5H
Durée des contractions	< 1 mn	1 mn	> 1 mn
Intervalle entre les contractions	> 5 mn	3 à 5 mn	< 3 mn
Perte des eaux	non	récente	> 1H
Cotation	0	1	2
Score = somme des cotations des 5 questions			
>5 = risque d'accouchement imminent			



NORMES	FREQUENCE CARDIAQUE B/min	FREQUENCE RESPIRATOIRE MVT/min	PRESSON ARTERIELLE SYSTOLIQUE mmHg
Adulte	60 à 100	12 à 20	adulte 100 - 140
Enfant	70 à 140	20 à 30	
Nourrisson	100 à 160	30 à 40	
Nouveau né	120 à 160	40 à 60	

GLYCEMIE NORMALE		PARAMETRES DE DETRESSE	
mg/dl	mmol	FR < 6 ou >30	SpO2 < 94
60 -110	3,3 - 6,5	FC < 40 ou >120	PAS < 90

URGENCE FONCTIONNELLE

PLAIE GRAVE

- Si hémorragie associée

- Par mécanisme pénétrant (objet tranchant ou perforant, morsures, projectiles)

- Localisation : cou, thorax, abdomen, œil, orifices naturels

- Aspect déchiqueté, écrasé

- Plaies multiples

BRULURE GRAVE

- Une ou plusieurs cloques dont la surface totale > 1/2 paume de la main de la victime


- Destruction profonde

- Aspect circulaire (qui fait le tour du cou ou d'un membre)

- Localisation sur le visage ou le cou, les mains, les articulations ou au voisinage des orifices naturels

- Chez l'enfant, rougeur étendue de la peau

- Brûlure d'origine électrique, radiologique ou chimique



MONOXYDE DE CARBONE Mesures dans l'air expiré (estimations)	
< 30 PPM	Pas de symptôme
< 100 PPM	Céphalées, asthénie
200 PPM	Vomissement, trouble visuel, asthénie musculaire
500 PPM	Perte de connaissance, accélération cardiaque polypnée
>1000 PPM	Coma, convulsions
2000 PPM	Mortel en 4 à 5 heures
5000 PPM	Mortel en 20 minutes



Fiche de bilan

des premiers secours