

Aperçu de l'étude des nombres premiers

Bodart Corentin Jonathan Dauwe Azalais Davin Thomas
Lemaire Robin Petit Alex Ternes

Université Libre de Bruxelles

4 mai 2016

Plan de la présentation

- 1 Existence d'une infinité de nombres premiers
- 2 Nombres de Wilson
- 3 Théorèmes de Fermat et Euler
- 4 Nombres de Carmichael
- 5 Les racines primitives
- 6 Test de Lucas-Lehmer

Euclide

les nbres de Wilson

Objectif

Prouver le théorème suivant grâce à la théorie des groupes :

Théorème (Petit théorème de Fermat (1640))

Soient $a, p \in \mathbb{Z}$ tels que p est premier et a n'est pas divisible par p . Alors $a^{p-1} - 1$ est un multiple de p , c'est-à-dire :

$$a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

Préliminaires à la preuve

Définition

Soient G un groupe et $a \in G$. L'**ordre** de a est :

- le plus petit $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^m = e$, où e est le neutre de G ;
- le cardinal du sous-groupe engendré par a , c-à-d :
 $\langle a \rangle := \{e = a^0, a^1, \dots, a^{m-1}\}.$

L'ordre de a est noté $\text{ord}(a)$.

Théorème (Thorème de Lagrange)

Si G est un groupe fini et $H \subseteq G$ un sous-groupe, alors $|H|$ divise $|G|$.

Rappel (Petit théorème de Fermat)

$$\forall a, p \in \mathbb{Z} : (p \text{ premier} \wedge p \nmid a) \Rightarrow (a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p})$$

Preuve du petit théorème de Fermat - partie 1/2

On considère le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*, \cdot, 1)$. En effet,

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^* = \{[1], [2], \dots, [p-1]\}$ car p est premier.

Soit maintenant $[a] \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$. a n'est pas divisible par p car

$[0] = [p] = [kp] \notin \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Prenons $m := \text{ord}([a])$. Alors on sait :

- $[a]^m = [1]$;
- $|\langle a \rangle| = m$.

Puisque $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$, on sait par Lagrange que $m = |\langle a \rangle|$ divise $|\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*| = p - 1$.

Rappel (Petit théorème de Fermat)

$$\forall a, p \in \mathbb{Z} : (p \text{ premier} \wedge p \nmid a) \Rightarrow (a^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p})$$

Preuve du petit théorème de fermat - partie 2/2.

On sait $m|p-1$, que l'on peut réécrire comme suit :

$$\exists k \in \mathbb{N} \text{ t.q. } m \cdot k = p - 1.$$

Finalement, on a :

$$\left[a^{p-1} \right] = [a]^{p-1} = [a]^{mk} = ([a]^m)^k = [1]^k = [1].$$

On a effectivement $[a^{p-1}] = [1]$, ce qui signifie :

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$



Généralisation du petit théorème de Fermat

Théorème (Théorème d'Euler (1761))

Soient $n \in \mathbb{N}^$ et $a \in \mathbb{N}$ tels que a, n soient premiers entre eux. Alors :*

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Preuve.

La démonstration est assez similaire à celle du théorème de Fermat : on prend le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*, \cdot, 1)$ qui correspond aux classes d'entiers inversibles mod n et dont le cardinal vaut $\phi(n)$. □

Carmichael

racines primitives.

Nombres de Mersenne

Définition

Un nombre de Mersenne (nommé selon Marin Mersenne, 16-17e siècle) est nombre sous la forme $M_n = 2^n - 1$.

Lemme

Soit $p \in \mathbb{N}^$. Si p est divisible par $m \in \mathbb{N}$, alors le nombre de Mersenne M_m divise M_p .*

Remarque

Ce lemme veut dire qu'il n'est pas nécessaire de tester la primalité de M_n pour n non premier car si n n'est pas premier, alors M_n ne l'est pas non plus. La réciproque n'est pas vraie. Exemple : $p = 11$ est premier, or $M_p = 2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$.

Preuve.

La preuve est uniquement calculatoire. Supposons qu'il existe $m, t \in \mathbb{N} \setminus \{1, p\}$ tels que $p = mt$. On a alors :

$$\begin{aligned}M_n &= 2^n - 1 = 2^{mt} - 1 = (2^m)^t - 1 = \sum_{i=0}^{t-1} (2^m)^i = \sum_{i=1}^t \left(2^{mi} - 2^{m(i-1)}\right) \\&= 2^m \sum_{i=1}^t 2^{m(i-1)} - \sum_{i=1}^t 2^{m(i-1)} \\&= (2^m - 1) \sum_{i=1}^t 2^{m(i-1)} = M_m \sum_{i=1}^t 2^{m(i-1)}.\end{aligned}$$



Teste Lucas-Lehmer

Le test de Lucas-Lehmer permet de déterminer si un nombre de Mersenne est premier ou non. Il est basé sur la suite naturelle :

$$\begin{cases} L_0 &= 4 \\ L_n &= (L_{n-1})^2 - 2 \text{ si } n \geq 1 \end{cases}$$

dont les premiers termes sont les suivants :

4, 14, 194, 37 634, 1 416 317 954, ...

Théorème (Test de Lucas-Lehmer)

Soit $p \in \mathbb{N}^$. M_p est premier si et seulement si M_p divise L_{p-2} .*

Remarque

Le théorème est une double implication. Il faut donc montrer les deux pour démontrer le théorème. Nous ne montrerons ici pas le fait que si M_p est premier, alors M_p divise L_{p-2} .

Lemme (Lemme préliminaire)

Soit G un groupe. Soit $a \in G$ un élément. Alors $\text{ord}(a) \leq |G|$.

Preuve - partie 1/X

Montrons que $L_{p-2} = kM_p \Rightarrow M_p$ premier. Une manière d'exprimer la divisibilité de L_{p-2} par M_p est de dire que $L_{p-2} \equiv 0 \pmod{M_p}$.

Premièrement, on remarque que l'on peut exprimer la suite (L_n) définie récursivement comme une suite directe. Posons

$\omega = 2 + \sqrt{3}, \bar{\omega} = 2 - \sqrt{3}$. On trouve dès lors $L_n = \omega^{2^n} + \bar{\omega}^{2^n}$.

On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que :

$$L_{p-2} = \omega^{2^{p-2}} + \bar{\omega}^{2^{p-2}} = kM_p.$$

En multipliant par $\omega^{2^{p-2}}$ des deux côtés et en réarrangeant les termes, on obtient :

$$\left(\omega^{2^{p-2}}\right)^2 \omega^{2^{p-1}} = kM_p \omega^{2^{p-2}} - \bar{\omega}^{2^{p-2}} \omega^{2^{p-2}} = 1.$$

Preuve - partie 2/X

Supposons par l'absurde que M_p est composite (n'est pas premier). On prend donc $2 < q < M_p$ le plus petit diviseur premier de M_p . On prend alors $\mathbb{Z}_q := \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers modulo q , et on pose :

$$X := \{a + b\sqrt{3} \text{ t.q. } a, b \in \mathbb{Z}_q\},$$

où

$$\forall x = (a + b\sqrt{3}), y = (c + d\sqrt{3}) \in X : x \cdot y = (ac + 3bd) + (ad + bc)\sqrt{3}.$$

On pose $X^* = \{x \in X \text{ t.q. } \exists x^{-1} \in X\}$ le groupe des éléments de X admettant un inverse (preuve que X^* est un groupe est omise). On sait que $0 \notin X^*$, donc $|X^*| \leq |X| - 1 = q^2 - 1$.

De plus, on sait $q > 2$, donc $\omega, \bar{\omega} \in X^*$. Également, $M_p \equiv 0 \pmod{q}$, donc, dans X , on a :

$$kM_p\omega^{2^{p-2}} = 0.$$

Preuve - partie 3/X

On a vu que $\omega^{2^{p-1}} = kM_p\omega^{2^{p-2}} - 1 = 0 - 1 = -1$ dans X . En mettant au carré l'équation, on obtient :

$$\left(\omega^{2^{p-1}}\right)^2 = \omega^{2^p} = 1.$$

Dès lors, on sait que $\omega \in X^*$ et est d'un ordre qui divise 2^p . Or, $\text{ord}(\omega)$ ne divise pas $\omega^{2^{p-1}}$. Donc $\text{ord}(\omega) = 2^p$. Par le lemme préliminaire, on a :

$$2^p \leq |X^*| \leq q^2 - 1.$$

Et comme q est un diviseur de M_p , on a $q^2 \leq M_p = 2^p - 1$. On a alors $2^p \leq 2^p - 1$, ce qui est une contradiction. Notre hypothèse disant que M_p est composite est donc fausse. M_p est bien premier.