

Løsningsforslag øving 5

Oppgave 1

a) Se tabell 4.2 i lærboka side 149. Denne tabellen sammen med generell elimineringssteknikk gir løsningen:

O1: D O2: B O3: A O4: C O5: E O6: F

b) I tabellen fra øving 4 finner vi sprangresponsen for et 2. ordens system med $\zeta < 1$. Vi vet at vi har lokale ekstrema hvilket vil si at $\sin(\beta t_1) = 1$ og $\sin(\beta t_2) = -1$. Dette bruker vi når vi setter inn de oppgitte verdiene og får følgende to likninger:

$$h(t_1) = K \frac{\omega_0^2}{\beta} e^{-\alpha t_1} = 0.8 \quad (1)$$

$$h(t_2) = -K \frac{\omega_0^2}{\beta} e^{-\alpha t_2} = -0.25 \quad (2)$$

I tillegg har vi at:

$$t_2 - t_1 = \frac{\pi}{\beta} \quad (3)$$

Vi kan kombinere likning (1) og (2):

$$\frac{h(t_1)}{h(t_2)} = \frac{K \frac{\omega_0^2}{\beta} e^{-\alpha t_1}}{K \frac{\omega_0^2}{\beta} e^{-\alpha t_2}} = \frac{e^{-\alpha t_1}}{e^{-\alpha t_2}} = \frac{0,8}{-(-0,25)} = \frac{0.8}{0.25} \quad (4)$$

Dette kan vi kombinere med likning (3)

$$\frac{e^{-\alpha t_1}}{e^{-\alpha t_2}} = e^{\alpha(t_2 - t_1)} = e^{\frac{\pi}{\beta}} = \frac{0.8}{0.25} \quad (5)$$

Som skrives om til:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\ln\left(\frac{0.8}{0.25}\right)}{\pi} \quad (6)$$

$\frac{\alpha}{\beta} = \tan(\varphi)$, noe som medfører at φ vi kan skrive om til formen:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\ln\left(\frac{0.8}{0.25}\right)}{\pi}\right) \quad (7)$$

Tatt i betraktning at $\zeta = \sin(\varphi)$ får vi følgende uttrykk for ζ :

$$\zeta = \sin\left(\arctan\left(\frac{\ln\left(\frac{0.8}{0.25}\right)}{\pi}\right)\right) \approx \underline{0.35} \quad (8)$$

Svaralternativ B, 0.35 er korrekt.

Merk at vi ikke trenger verdiene til tidspunktene t_1 og t_2 . Dette er et vesentlig poeng ved oppgaven: Når det er *relativ* dempingsfaktor vi er ute etter, trenger vi bare å vite hvor mye oscillasjonene avtar per (halv) periode, men (halv)periodens virkelige lengde (og posisjon langs t-aksen) er uinteressant. Med andre ord gjelder oppgaven, og resultatet, uansett hvor hurtig eller langsomt systemet er.

Oppgave 2

Likning (2.1) i boka gir

$$m_1 c_1 \dot{x}_1 = u_1 - g_1 (x_1 - x_2) \quad (9)$$

Vi ser bort i fra dynamikken i varmeelementet, noe som er ekvivalent med å sette $c_1 m_1 = 0$. Da har vi ingen akkumulering av energi i varmeelementet. Likning (9) gir da:

$$u_1 = g_1 (x_1 - x_2) = u \quad (10)$$

Likning (2.2) i boka, sammen med (10), gir:

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{m_2 c_2} (u + q \rho c_2 v_1 - q \rho c_2 x_2 - g_2 (x_2 - v_2(s))) \quad (11)$$

Vi ønsker likningen på formen:

$$y(s) = x_2(s) = \frac{K}{1 + T s} (u(s) + v(s)) \quad (12)$$

Laplacetransformasjon av (11) gir:

$$s x_2(s) = \frac{1}{m_2 c_2} (u(s) + q \rho c_2 v_1(s) - q \rho c_2 x_2(s) - g_2 (x_2(s) - v_2(s))) \quad (13)$$

$$\left(s + \frac{q \rho c_2 + g_2}{m_2 c_2} \right) x_2(s) = \frac{1}{m_2 c_2} (u(s) + q \rho c_2 v_1(s) + g_2 v_2(s)) \quad (14)$$

$$x_2(s) = \frac{\frac{1}{m_2 c_2}}{s + \frac{q \rho c_2 + g_2}{m_2 c_2}} (u(s) + (q \rho c_2 v_1(s) + g_2 v_2(s))) \quad (15)$$

$$x_2(s) = \frac{\left(\frac{1}{q \rho c_2 + g_2} \right)}{1 + \left(\frac{m_2 c_2}{q \rho c_2 + g_2} \right) s} (u(s) + (q \rho c_2 v_1(s) + g_2 v_2(s))) \quad (16)$$

Dermed:

a)

$$T = \frac{m_2 c_2}{\underline{\underline{q \rho c_2 + g_2}}} \quad (17)$$

b)

$$K = \frac{1}{\underline{\underline{q \rho c_2 + g_2}}} \quad (18)$$

c)

$$v = \underline{\underline{q \rho c_2 v_1 + g_2 v_2}} \quad (19)$$

Oppgave 3

Sprangresponsen $k_1(t)$:

$$k_1(t) = \underline{\underline{\mu_1(t-1)}}$$

Sprangresponsen $k_2(t)$:

Vi multipliserer først med 8 over og under brøkstreken, og utfører så divisjon:

$$\frac{(s^2 - 4s + 8)}{-(s^2 + 4s + 8)} : (s^2 + 4s + 8) = 1$$

↓

$$h_2(s) = 1 - \frac{8s}{s^2 + 4s + 8}$$

$$k_2(s) = h_2(s) \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{8}{s^2 + 4s + 8}$$

↓

$$k_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right) - \underbrace{\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{8}{s^2 + 4s + 8}\right)}_{\text{fra tabell i appendiks B eller øving 4}} = \underline{\underline{1 - 4e^{-2t} \sin 2t}}$$

fra tabell i appendiks B eller øving 4

Sprangresponsene er skissert i figur 1.




Figure 1: Sprangresponsene $k_1(t)$ (stiplet) og $k_2(t)$ (heltrukket)