

概率论与数理统计

习题课1

第一章 习题课

1、甲、乙、丙三人各向目标射击一发子弹，以A、B、C分别表示甲、乙、丙命中目标，试用A、B、C的运算关系表示下列事件：

A_1 ：“至少有一人命中目标”： $A \cup B \cup C$

A_2 ：“恰有一人命中目标”： $\overline{A}\overline{B}C \cup \overline{A}B\overline{C} \cup A\overline{B}\overline{C}$

A_3 ：“恰有两人命中目标”： $AB\overline{C} \cup \overline{A}BC \cup A\overline{B}C$

A_4 ：“最多有一人命中目标”： $\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}\overline{C} \cup \overline{A}\overline{B}$

A_5 ：“三人均命中目标”： ABC

A_6 ：“三人均未命中目标”： $\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$

2、 将3个球随机的放入3个盒子中去，问：
（1）每盒恰有一球的概率是多少？（2）空一盒的概率是多少？

解 设 A:每盒恰有一球,B:空一盒

$$N(S) = 3^3 \quad N(A) = 3! \quad P(A) = \frac{2}{9}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= 1 - P\{\text{空两盒}\} - P\{\text{全有球}\} \\ &= 1 - \frac{3}{3^3} - \frac{2}{9} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

3、 某市有甲,乙,丙三种报纸,订每种报纸的人数分别占全体市民人数的30%,其中有10%的人同时定甲,乙两种报纸.没有人同时订甲丙或乙丙报纸.求从该市任选一人,他至少订有一种报纸的概率.

解 设A, B, C分别表示选到的人订了甲, 乙, 丙报

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= 30\% \times 3 - 10\% - 0 - 0 + 0 = 80\% \end{aligned}$$

4、市场上有甲、乙、丙三家工厂生产的同一品牌产品，已知三家工厂的市场占有率分别为 $1/4$ 、 $1/4$ 、 $1/2$ ，且三家工厂的次品率分别为 2% 、 1% 、 3% ，试求市场上该品牌产品的次品率。

设： B ：买到一件次品

A_1 ：买到一件甲厂的产品

A_2 ：买到一件乙厂的产品

A_3 ：买到一件丙厂的产品

$$P(B) = P(BA_1) + P(BA_2) + P(BA_3)$$

$$= P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) + P(B | A_3)P(A_3)$$

$$= 0.02 \times \frac{1}{4} + 0.01 \times \frac{1}{4} + 0.03 \times \frac{1}{2} \approx 0.0225$$

习题课1

5、商店论箱出售玻璃杯,每箱20只,其中每箱含0, 1, 2只次品的概率分别为0.8, 0.1, 0.1, 某顾客选中一箱, 从中任选4只检查, 结果都是好的, 便买下了这一箱.问这一箱含有一个次品的概率是多少?

解 设A:从一箱中任取4只检查,结果都是好的.

B_0, B_1, B_2 分别表示事件每箱含0, 1, 2只次品


已知: $P(B_0)=0.8, P(B_1)=0.1, P(B_2)=0.1$

$$P(A | B_0) = 1 \quad P(A | B_1) = \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} = \frac{4}{5} \quad P(A | B_2) = \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} = \frac{12}{19}$$

由 *Bayes* 公式:

$$\begin{aligned} P(B_1 | A) &= \frac{P(B_1)P(A | B_1)}{\sum_{i=0}^2 P(B_i)P(A | B_i)} \\ &= \frac{0.1 \times \frac{4}{5}}{0.8 \times 1 + 0.1 \times \frac{4}{5} + 0.1 \times \frac{12}{19}} \approx 0.0848 \end{aligned}$$


6、如图，1、2、3、4、5表示继电器触点,假设每个触点闭合的概率为 p , 且各继电器触点闭合与否相互独立, 求 L 至 R 是通路的概率.



解：设 A 表示 “ L 至 R 为通路”，

A_i 表示 “第 i 个继电器通”， $i=1,2,\dots,5$.

$$P(A | \bar{A}_3) = P(A_1 A_4 \cup A_2 A_5) = 2p^2 - p^4$$




$$P(A | A_3) = P\{(A_1 \cup A_2)(A_4 \cup A_5)\}$$

$$P(A | A_3) = P(A_1 \cup A_2)P(A_4 \cup A_5) = (2p - p^2)^2$$

由全概率公式

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A | \bar{A}_3)P(\bar{A}_3) + P(A | A_3)P(A_3) \\ &= 2p^2 + 2p^3 - 5p^4 + 2p^5 \end{aligned}$$



第二章 习题课

1、设离散型随机变量 X 分布律为

$$P\{X = k\} = 5A(1/2)^k \quad (k = 1, 2, \dots)$$

则 $A =$ _____

解：由 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ 即 $\sum_{k=1}^{\infty} [5A(1/2)^k] = 1$

得 $A = \frac{1}{5}$

2、已知随机变量 X 的密度为

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \text{ 且 } P\{X > 0.5\} = 5/8, \text{ 则}$$

$$a = \underline{\hspace{2cm}} \quad b = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{解: 由 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1, \text{ 得 } \int_0^1 (ax + b)dx = \frac{a}{2} + b = 1$$

$$\text{又 } P\{X > 0.5\} = \int_{0.5}^1 (ax + b)dx = \frac{3a}{8} + \frac{b}{2} = \frac{5}{8}, \text{ 解得: } a = 1, \quad b = \frac{1}{2}$$

3、设 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则

$$P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{解: 由对称性得 } P\{X < 2\} = 0.5, \quad P\{0 < X < 2\} = 0.3,$$

$$\text{所以 } P\{X < 0\} = P\{X < 2\} - P\{0 < X < 2\} = 0.2$$

4、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 那么当 σ 增大时,

$$P\{|X - \mu| < \sigma\} = \underline{\hspace{2cm}}$$

A) 增大; B) 减少;

C) 不变; D) 增减不定。

$$\begin{aligned} \text{解: 由 } P\{|X - \mu| < \sigma\} &= P\left\{\frac{|X - \mu|}{\sigma} < 1\right\} \\ &= \Phi(1) - \Phi(-1) \\ &= 2\Phi(1) - 1 \end{aligned}$$

5、设 X 的密度函数为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 且 $f(x) = f(-x)$, 那么对任意给定的 a 都有__

A) $f(-a) = 1 - \int_0^a f(x)dx$;

B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx$;

C) $F(a) = F(-a)$; **D)** $F(-a) = 2F(a) - 1$

解： 由对称性得 $F(0) = P\{X \leq 0\} = 0.5$,

$$\begin{aligned}\therefore F(-a) &= P\{X \leq -a\} = \int_{-\infty}^{-a} f(x)dx \\ &= \int_a^{+\infty} f(x)dx = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx\end{aligned}$$

6、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = Ae^{-|x|}$ ($-\infty < x < +\infty$), 求 (1) 系数 A ; (2) $P\{0 \leq X \leq 1\}$; (3) 分布函数 $F(x)$.

解: (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-|x|} dx = 2 \int_0^{+\infty} Ae^{-x} dx$

$$= 2A = 1 \quad \text{得: } A = \frac{1}{2}$$

$$(2) P\{0 \leq X \leq 1\} = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x} dx = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right)$$

$$(3) F(x) = P\{X \leq x\}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^t dt, & x < 0 \\ \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^t dt + \frac{1}{2} \int_0^x e^{-t} dt, & x \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

7、对球的直径作测量，设其值均匀地分布在 $[a, b]$ 内。求体积的概率密度。

解：直径 X 的密度函数为
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\text{体积 } Y = \frac{\pi}{6} X^3$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\left\{\frac{\pi}{6} X^3 \leq y\right\} = P\left\{X \leq \sqrt[3]{\frac{6y}{\pi}}\right\} \\ &= \int_{-\infty}^{\sqrt[3]{6y/\pi}} f(x) dx \end{aligned}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < \frac{\pi}{6}a^3 \\ \int_a^{\sqrt[3]{6y/\pi}} \frac{1}{b-a} dx, & \frac{\pi}{6}a^3 \leq y < \frac{\pi}{6}b^3 \\ 1, & y \geq \frac{\pi}{6}b^3 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \left(\sqrt[3]{6y/\pi} \right)' \frac{1}{b-a}, & \frac{\pi}{6}a^3 < y < \frac{\pi}{6}b^3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{\pi(b-a)} \left(\frac{6y}{\pi} \right)^{-\frac{2}{3}}, & \frac{\pi}{6}a^3 < y < \frac{\pi}{6}b^3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

8、设在独立重复实验中，每次实验成功概率为0.5，问需要进行多少次实验，才能使至少成功一次的概率不小于0.9

解： 设需要 N 次，由 $X \sim b(N, 0.5)$

至少成功一次概率：

$$\begin{aligned} P\{X \geq 1\} &= 1 - P\{X < 1\} = 1 - P\{X = 0\} \\ &= 1 - 0.5^N \geq 0.9 \end{aligned}$$

得 $N \geq 4$