

Etude IRC - bases

Nathanael Lapidus, Rodolphe JANTZEN

28 novembre 2016

1 Incidence maladie de Berger

On a de 2010 à 2014 1720 patients qui ont eu une première suppléance. L'incidence était de 3.4 cas pour 100 000 habitants.

1.1 Incidence spatiale

Tableau d'incidence selon la région par standardisation directe pour 100 000 habitants de 2010 à 2014 (selon l'effectif français de 2013) :

	Ratio.brut	Ratio.ajuste	IC.inf	IC.sup
Reunion	5.7	5.8	3.9	8.8
Alsace	5.4	5.5	4.3	6.8
Auvergne	4.6	4.5	3.3	5.9
Nord.Pas.de.Calais	4.1	4.2	3.5	5.0
Bretagne	4.0	3.9	3.2	4.7
Midi.Pyrénées	3.8	3.8	3.0	4.6
Centre	3.7	3.6	2.9	4.5
Champagne.Ardenne	3.6	3.6	2.6	5.0
Pays.de.la.Loire	3.7	3.6	3.0	4.4
Franche.Comté	3.6	3.5	2.4	5.0
Rhône.Alpes	3.5	3.5	3.0	4.1
Bourgogne	3.6	3.4	2.5	4.5
Basse.Normandie	3.3	3.2	2.3	4.4
Languedoc.Roussillon	3.2	3.2	2.5	4.1
Picardie	3.0	2.9	2.1	3.9
Haute.Normandie	2.8	2.8	2.0	3.8
Ile.de.France	2.8	2.8	2.5	3.2
Aquitaine	2.7	2.7	2.1	3.4
Lorraine	2.7	2.7	2.0	3.6
Limousin	2.6	2.6	1.5	4.4
Poitou.Charentes	2.5	2.4	1.7	3.4
Provence.Alpes.Côte.d.Azur	2.4	2.3	1.9	2.8
Corse	1.5	1.5	0.4	4.0
Guadeloupe	1.0	1.0	0.2	3.4
Martinique	0.7	0.7	0.1	3.0

1.2 Incidence temporelle

2010	2011	2012	2013	2014	<NA>
322	347	358	360	333	0

2010	2011	2012	2013	2014
18.7	20.2	20.8	20.9	19.4