CARACTERÍSTICAS DENDROLÓGICAS DAS PRINCIPAIS FAMÍLIAS COM REPRESENTANTES ARBÓREOS NATIVOS NO SUL DO BRASIL

Modificado de Blum, CT. 2023

PLANTAS COM EIXO DE CRESCIMENTO MONOPODIAL

- Folhas pecioladas, pinadas ou em leque compostas copa sem ramificação (palmeiras);
  Arecaceae → folhas compostas pinadas ou simples em leque, apicais, paralelinérveas, sem ramificação



- Folhas sésseis e longas, lanceoladas
  Asparagaceae (*Cordyline*) → folhas em forma de espada, cicatrizes foliares ao longo de todo o caule

- Folhas aciculadas, copa ramificada;
  Araucariaceae → folhas rígidas, muito duradouras, galhos formando ramos espinhosos

---

FOLHAS SIMPLES E OPOSTAS



- CURVINÉRVEAS
  Melastomataceae (*Tibouchina, Miconia*) → curvinérvea, margem variável, fruto cápsula ou baga



- PENINÉRVEAS DE MARGEM RECORTADA
  Monimiaceae (*Mollinedia*) → peninérvea, margem recortada, fruto composto, arvoretas de subosque

- PENINÉRVEAS DE MARGEM INTEIRA:
  Rubiaceae (*Psychotria, Rudgea, Palicourea, Manettia*) → peninévias, estípula interpeciolar (ou sua cicatriz), margem inteira

  Myrtaceae (*Myrcia, Eugenia, Campomanesia, Psidium*) → peninérvia, nervura coletora, folhas aromáticas e c/ pontuações translúcidas (principalmente às jovens), margem inteira, madeira dura

  Lythraceae (*Lafoensia*) → peninérvia, margem inteira, perfuração e/ou coloração diferenciada no ápice da folha, fruto cápsula

  Calophyllaceae (*Calophyllum*) → peninérvea, lactescente, margem inteira, nervuras secundárias muito abundantes (> de 70 pares) e quase perpendiculares à nervura principal

  Clusiaceae (*Clusia, Garcinia*) → peninérvea, lactescente, margem inteira, nervuras secundárias menos abundantes (< de 40 pares)

- PENINÉRVEAS DE MARGEM VARIÁVEL (recortada a inteira até mesmo na mesma espécie] indivíduo);
  Elaeocarpaceae (*Sloanea*) → opostas/alternas, margem inteira/recortada, geniculo (espessamento tipo "cotovelo") no pecíolo, estípulas laterais, raízes escora tabulares, fruto cápsula espinescente



FOLHAS SIMPLES E ALTERNAS

- COM GLÂNDULAS (margem inteira ou recortada);



Euphorbiaceae (*Alchornea, Sapium, Croton, Gymnanthes*) → margem variável, muitas vezes lactescente, qlândulas no pecíolo, base ou margem, estípulas laterais efêmeras nos ramos jovens

Rosaceae (*Prunus*) → margem inteira, folhas com par de glândulas na base, casca viva com discreto odor de amêndoas

- SEM GLÂNDULAS E COM MARGEM SEMPRE RECORTADA



Aquifoliaceae (*Ilex*) → folha geralmente coriácea, casca viva arenosa amarelada

Proteaceae (*Roupala*) → folha coriácea, casca viva arenosa com fibras trancadas e odor forte, fruto folículo, folhas polimórficas (pinadas nos indivíduos jovens)

Celastraceae (*Maytenus*) → casca viva fibrosa geralmente rosada, ramos jovens geralmente achatados ou angulosos, fruto cápsula, semente com arilo

Symplocaceae (*Symplocos*) → casca viva geralmente macia e clara, madeira mole . fruto drupa, geralmente pioneiras, comumente com furos nas folhas resultado de insetos herbívoros

Salicaceae (*Casearia, Banara, Xylosma*) → folhas dísticas, em geral com pontuações translúcidas, estípulas laterais (ramos jovens), espinhos ramificados em Xylosma

Malvaceae (*Luehea*) → base da folha trinervada, espiralada ou dística, pilosa, estípulas laterais nos ramos jovens, casca viva com fibras trancadas, rosada, fruto cápsula

Lecythidaceae (*Cariniana*) → casca fibrosa e resistente

- SEM GLÂNDULAS E COM MARGEM SEMPRE INTEIRA

Podocarpaceae (*Podocarpus*) → folhas sésseis, linear-lanceoladas, apenas com a nervura central visível

Apocynaceae (*Aspidosperma*) → ramos jovens e folhas com pouco látex esbranquiçado, ramos novos com muitas lenticelas brancas

Sapotaceae (*Chrysophyllum, Manilkara, Pouteria*) → lactescente

Annonaceae (*Annona, Guatteria*) → folhas dísticas, casca fibrosa e resistente

Erythroxylaceae (*Erythroxylum*) → nervação formando aureolas, estípulas persistentes nos ramos

Canellaceae (*Cinnamodendron*) → folhas brilhantes, formando aureolas, ritidoma reticulado, casca viva rosada e muito aromática

Winteraceae (*Drimys*) → nervuras secundárias inexpressivas, face abaxial esbranquiçada, casca viva com aroma característico

Primulaceae (*Myrsine*) → nervuras secundárias inexpressivas, pontuações translúcidas (geralmente visíveis só com lupa), casca viva com bolsas de resina

Lauraceae (*Ocotea, Nectandra*) → folhas e casca viva aromáticas, nervação reticulada, geralmente árvores grandes de dossel

Solanaceae (*Solanum*) → folhas com odor forte e desagradável, casca viva macia e clara, fruto lembrando um tomate, geralmente pioneiras

Styracaceae (*Styrax*) → margem inteira, discolores, ramos e folhas com escamas esbranquiçadas ou ferrugíneas, casca viva rosada, fruto drupa com cúpula

Urticaceae (*Cecropia*) → folhas palmatilobadas, estípulas apicais, caule oco

- SEM GLÂNDULAS E COM MARGEM VARIANDO DE RECORTADA A INTEIRA NA MESMA ESPÉCIE/INDIVÍDUO

Moraceae → margem inteira (*Ficus*), recortada (*Maclura*) ou aculeada (*Sorocea*), lactescente, estípulas terminais

Euphorbiaceae (*Gymnanthes, Alchomea, Sebastiania*) → muitas vezes lactescente e com glândulas, estípulas laterais efêmeras nos ramos jovens

Cardiopteridaceae (*Citronela*) → margem inteira ou esparsamente recortada/aculeada, folhas coriáceas a muito coriáceas, com domácias, casca viva formando anéis alaranjados, fruto drupa

Elaeocarpaceae (*Sloanea*) → opostas/alternas, margem inteira/recortada, qenículo (espessamento tipo "cotovelo") no pecíolo, estípulas laterais, raízes escora tabulares, fruto cápsula espinescente

Asteraceae (*Moquiniastrum, Vernonanthura, Piptocarpha*) → margem recortada ou inteira, geralmente pilosas e discolores, casca viva preta, fruto aquênio, pioneiras

Clethraceae (*Clethra*) → margem recortada ou inteira, folhas pilosas e geralmente discolores, casca viva róseo-avermelhada, fruto cápsula

---

FOLHAS TRIFOLIOLADAS

Rutaceae (*Balfourodendron, Helietta*) → fls opostas, marqem inteira, pontuações translúcidas, lenticelas no tronco e ramos, fruto sâmara

Fabaceae Faboideae (*Erythrina*) → fls alternas, margem inteira, qlândula na raque, pulvino bem desenvolvido, acúleos, fruto legume 3.3 Sapindaceae (Allophylus) fls alternas de margem recortada, fruto baga

---

FOLHAS DIGITADAS

Cunoniaceae (*Lamanonia*) → folhas opostas, estípulas pronunciadas nos ramos jovens, fruto cápsula

Bignoniaceae (*Handroanthus*) → folhas opostas, folíolos longo-peciolulados de base obtusa, muitas vezes com genículo (espessamento tipo "cotovelo") na extremidade do peciólulo, fruto síliqua

Lamiaceae (*Vitex*) → folhas opostas, folíolos curto-peciolulados de base acuminada, fruto baga

Malvaceae (*Ceiba, Pseudobombax*) → folhas alternas, estípulas laterais nos ramos jovens, fruto cápsula

Araliaceae (*Schefflera*) → folhas alternas, pecíolo com bainha, fruto drupa



FOLHAS PINADAS

- RAQUE ALADA

Cunoniaceae (*Weinmannia*) → raque alada, folhas opostas, imparipinadas, recortadas, com estípulas pronunciadas nos ramos jovens, fruto cápsula

Fabaceae Mimosoideae (*Inga*) → raque alada, folhas alternas, paripinadas, margem inteira, raque com glândulas entre os folíolos, estames vistosos, pulvino desenvolvido, fruto legume

Anacardiaceae (*Schinus*) → raque alada, folhas alternas, imparipinadas, recortadas, odor característico nas folhas, nervação aberta (nervuras secundárias acabam na margem do folíolo), fruto drupa

- RAQUE SIMPLES

Fabaceae Caesalpinioideae (*Cassia, Senna, Copaifera*) → folhas alternas paripinadas, margem inteira, com pulvino, fruto lequme

Rutaceae (*Zanthoxylum*) → folhas alternas par ou imparipinadas, com pontuações translúcidas / odor cítrico, margem variável, raque canaliculada, com acúleos (mais frequentemente no tronco), fruto drupa

Fabaceae Faboideae (*Dalbergia, Machaerium*) → folhas alternas imparipinadas, margem inteira, com pulvino, flor zigomorfa (pétalas com formas distintas), fruto lequme ou sâmara

Picramniaceae (*Picramnia*) → folhas alternas imparipinadas, margem inteira, fruto baga, geralmente arvoretas - pode ser confundida com Fabaceae Faboideae porque parece ter pulvino

Sapindaceae (*Matayba, Cupania*) → folhas alternas imparipinadas, com folíolo terminal abortado, margem recortada ou inteira, fruto cápsula

Simaroubaceae (*Picrasma*) → folhas alternas imparipinadas, margem recortada, casca viva de sabor muito amargo, fruto drupa

Meliaceae (*Cedrela, Cabralea, Guarea, Trichilia*) → folhas alternas, par ou imparipinadas, margem inteira, geralmente qrandes em Cedrela e Cabralea (40-80 cm de comprimento), fruto cápsula

FOLHAS BIPINADAS



Bignoniaceae (*Jacaranda*) → folhas opostas, decídua com flores roxas, fruto síliqua

Fabaceae → Caesalpinioideae (*Peltophorum, Schizolobium*) folhas alternas, com pulvino, estames discretos e pétalas vistosas, fruto legume 6.3 Fabaceae Mimosoideae (*Anadenanthera, Mimosa*) folhas alternas, com alândulas, estames vistosos e pétalas discretas, fruto legume