CHAVE PARA GÊNEROS DE PTERIDÓFITAS DO PARANÁ

Kersten (2025)

1 Plantas com micrófilos uninervados e um único esporângio sobre os esporófilos

2 Esporófilos não diferenciados ou muito pouco diferenciados, não formando estróbilo evidente..... *Phlegmariurus*

2 Esporângios em estróbilos evidentes

3 Estróbilos complanados ou quadrangulares, microfilos ligulados, heterosporadas ..... *Selaginella*

3 Estróbilos cilíndricos, microfilos não ligulados, plantas homosporadas

4 Estróbilo ereto, séssil ou pedunculado, ramificado, esporos reticulados.

5 Ramos vegetativos com apenas um tipo de folha, caule cilíndrico ..... *Lycopodium*

5 Ramos vegetativos com folhas dimórficas, caule achatado

6 Folhas ventrais alternas, bem maiores que as folhas ventrais..... *Diphasium*

6 Folhas opostas cruzadas, folhas laterias maiores, folhas ventrais e dorsais menores ..... *Diphasiastrum*

4 Estróbilo pendente, séssis ou ereto e terminando em um único esporângio esporos rugosos.

7 Estróbilo pendente ..... *Palhinhaea*

7 Estróbio ereto

8 Esporófilos com a margem lisa (ou quase), em verticilos de até 5 folhas ..... *Lycopodiella*

8 Esporófilos com a margem denteada, em verticilos com mais de 5 folhas ..... *Pseudolycopodiella*

1 Plantas áfilas ou com megáfilos multinervados; sinângios, esporocarpos ou numerosos esporângios sob os esporófilo.

9 Esporângios em estróbilo terminal, caules ocos e articulados, folhas reduzidas, quase ausentes ..... *Equisetum*

9 Estróbilos ausentes, caules não ocos nem articulados

10 Plantas não formando soros, esporângios unidos em um sinângio ou esporocarpo

11 Esporângios unidos em um sinângio liberando os esporos por meio de aberturas

12 Plantas afilas, sinângios trilobulados apoiados sobre pequenos apêndices escamiformes ..... *Psilotum*



12 Plantas com folhas evidentes

13 Sinângios não localizados na lâmina. Lâmina simples; sem nervura principal, nervuras anastomosadas

14 Lâmina palmatilobada com mais de um sinângio..... *Cheiroglossa*

14 Lâmina simples com um único sinângio ..... *Ophioglossum*

13 Sinângios na face abaxial da lâmina; lâmina 1-4-pinada; nervuras livres

14 Lâmina 1-pinada; sinângios lineares e sésseis .....*Danaea*

14 Lâmina 3-4-pinada; sinângios globosos e pedicelados..... *Eupodium*

11 Esporos envoltos por um esporocarpo



15 Plantas diminutas, folhas menores que 0,3 cm, flutuantes,..... *Azolla*

15 Plantas com folhas maiores que 0,5 cm, flutuantes ou não

16Folhas simples recobertas por tricomas, plantas flutuantes.....*Salvinia*

16Folhas compostas, plantas enraizantes .....*Marsilea*

10 Plantas formando soros, esporângios livres e com algum tipo de ânulo,

17 Esporângios com pedicelo evidente; ânulo vertical interrompido pelo pedicelo ..... PARTE 2

17 Esporângios sésseis ou quase, ânulo lateral, apical ou obliquo





18 Ânulo lateral rudimentar, formado por um grupo circular de células pouco diferenciadas
- **19** Lâmina 2-pinada ..... *Osmunda*
- **19** Lâmina 1-pinado-pinatífida ..... *Osmundastrum*

18 Ânulo apical ou oblíquo com células nitidamente diferenciadas
- **20** Ânulo apical ou subapical, esporângios piriformes
  - **21** Primeiro par de pinas basais modificado formando uma espigueta... *Anemia*
  - **21** Esporângios nas margens ou ápice das frondes
    - **22** Folhas trepadeiras com crescimento indeterminado; esporângios na margem da lâmina ..... *Lygodium*
    - **22** Plantas não escandentes, lâmina aciculada (agulha) ou flabelada (leque)
      - **23** Esporângios no ápice de segmentos palmados, porção estéril da lâmina não dividida..... *Actinostachys*
      - **23** Esporângios no ápice de lâmina flabelada ou dicotômica..... *Schizaea*



- **20** Esporângios, sesseis ou subsésseis, globosos com o ânulo oblíquo soros sobre várias regiões da lâmina
  - **25** Lâmina dicotômica, com gemas nas axilas das ramificações; soros formados por 3 a 10 esporângios
    - **26** Caule e bifurcações das folhas com escamas, nervuras (maioria) no mínimo 2-furcadas ..... *Sticherus*
    - **26** Caule e bifurcações das folhas com tricomas, nervuras (maioria) 1-furcadas



      - **27** Frondes apoiantes anisotomicamente ramificadas, face abaxial com tricomas estrelados avermelhados ..... *Gleichenella*
      - **27** Frondes isotomicamente ramificadas, face abaxial glabrescente ou com tricomas pluricelulares brancos ou avermelhados na raque e nervura principal,..... *Dicranopteris*
  - **25** Lâmina não dicotômica, mais de 30 esporângios por soro
    - **28** Soros marginais
      - **29** Plantas com caule arborescentes completamente recoberto por raízes, lâminas espessas não translúcidas..... *Dicksonia*
      - **29** . Plantas com caules herbáceos, delicados, lâminas com 1-2 células de espessura, translúcidas
        - **30** Indúsio bivalvado ..... *Hymenophyllum*
        - **30** Indúsio cônico
          - **31** Frondes glabras ou com raros tricomas, várias vezes dividida ..... *Polyphlebium*
          - **31** Tricomas presentes e abundantes; lâmina inteira, 1-pinada ou mais dividida
            - **32** Tricomas presentes no tecido laminar entre as nervuras e nas margens da lâmina ..... *Trichomanes*
            - **32** Tricomas ausentes do tecido laminar entre as nervuras, presentes ou não nas margens e nervuras
              - **33** Tricomas bifurcados/estrelados presentes nas margens da lâmina, frondes menores que 5 cm de comprimento, inteiras ou pouco divididas ..... *Didymoglossum*
              - **33** Plantas maiores que 10 cm, tricomas de outros tipos
                - **34** Lianas escandendes caules longo reptantes com mais de 7 mm de diâmetro. ..... *Vandenboschia*
                - **34** Plantas terrícolas robustas e ereta, caule com até 2 mm de diâmetro ..... *Abrodictyum*





28 Soros abaxiais

35 Caule não arborescente; plantas exclusivamente com tricomas, face abaxial embranquecida ..... *Lophosoria*

35 Caule arborescente; escamas presentes, principalmente na base do pecíolo

36 Base do pecíolo geralmente com aflébias, escamas com uma ou mais setas nigrescentes.....*Alsophila*

36 Base do pecíolo sem aflébias; escamas sem setas nigrescentes.....*Cyathea*

PARTE 2 – POLYPODIALES

36 Folhas de dois tipos: basais arredondadas recobrindo o rizoma, e pendentes, estas com ápice lobado e esporângios recobrindo as extremidades dos lobos ..... *Platycerium*

36 Sem folhas protegendo o rizoma nem folhas lobadas com esporângios nas extremidades

37 Frondes articuladas ao caule formando filopódios

38 Soros acrosticóides .....*Elaphoglossum*

38 Soro de outros tipos

39 Folhas no mínimo 2-pinada, soros marginais com Indúsio em forma de copo ..... *Davallia*

39 Folhas no máximo 1-pinada, soros abaxiais, arredondados, sem indúsio,

40 Lâmina inteiras

41 Nervuras laterais principais definidas, oblíquas à costa e paralelas entre si

42 Duas linhas de soros entre duas nervuras laterais .....*Campyloneurum*

42 Uma linha de soros entre duas nervuras laterais..... *Niphidium*

41 Nervuras laterais imersas no tecido laminar, visíveis ou não

43 Frondes dimorfas ..... *Microgramma*

43 Frondes monomorfas;

44 Escamas presentes apenas sobre as nervuras, nunca peltadas .....*Campyloneurum*



44 Escamas peltadas presentes nas nervuras e tecido laminar

45 Escamas do caule clatradas, frondes com uma única aureola formada entre a nervura e a margem, nervuras laterais pouco visíveis .....*Pleopeltis*

45 Escamas do caule não clatradas, frondes com duas ou mais aureolas formadas entre as nervuras e a margem, nervuras laterais evidentes ..... *Microgramma*

40 Lâmina fendida, pinatífida, pinatissecta ou pinada

46 Escamas peltadas presentes nas nervuras e tecido laminar, soros protegidos por escamas ao redor, estas geralmente caducas .....*Pleopeltis*

46 Escamas ausentes do tecido laminar, podendo estar presente sobre as nervuras



46 Escamas ausentes do tecido laminar, podendo estar presente sobre as nervuras

47 Nervuras livres ..... *Pecluma*

47 Nervuras anastomosadas

48 Escamas não clatradas..... *Polypodium*





48 Escamas clatradas

49 Soros dispostos sobre uma única vênula; face abaxial da lâmina sem coloração azulada..... *Serpocaulon*

49 Soros dispostos sobre a união de duas vênulas; face abaxial da lâmina com coloração azulada/acinzentada ..... *Phlebodium*

37 Frondes contínuas com o caule, não formando filopódios

49 Pecíolo com 2 feixes vasculares

50 Soros lineares submarginais, indúsio abrindo em direção à margem .....*Lindsaea*

50 Soros arredondados ou alongados e paralelos às nervuras

51 Lâmina com tricomas unicelulares, aciculares, bifurcados ou estrelados, raramente glabra; soros arredondados, raramente lineares



52 Lâmina 2-pinado-pinatissecta, costa não sulcada adaxialmente, nervuras não atingindo as margens dos segmentos .....*Macrothelypteris*

52 Lâmina no máximo, 1-pinado-pinatífida, costa sulcada adaxialmente, nervuras atingindo as margens dos segmentos

53 Lâminas pinadas. Nervuras ligadas formando aréolas. Soros alongados sobre as nervuras transversais ..... *Meniscium*

53 Lâminas pinado-pinatífidas. Nervuras livres ou somente o par basal unido. Soros circulares ou elípticos sobre as nervuras laterais

54 Tricomas furcados e/ou estrelados presentes pelo menos nas escamas do caule e face adaxial da raque.....*Goniopteris*

54 Tricomas furcados e/ou estrelados ausentes

55 Pinas basais gradualmente reduzidas (4 pares), as menores formando

apenas pequenas aurículas ..... *Amauropelta*

55 Pinas basais pouco ou não reduzidas (2-3 pares)



56 Nervuras basais de segmentos adjacentes unindo-se diretamente no enseio, aeróforos presentes na base das pinas..... Steiropteris

56 Nervuras basais de segmentos adjacentes unindo-se a uma nervura que se dirige ao enseio; aeróforos ausentes

57 Caule longo-reptante, marrom escuro a preto, glabro ..... *Cyclosorus*

57 Caule curto-reptante,; marrom claro, escamoso ..... *Christella*



51 Lâmina glabra ou com tricomas pluricelulares e lineares; soros alongados

58 Soros em apenas um lado das nervuras ..... *Asplenium*

58 Soros pareados dorso com dorso em ambos os lados das nervuras

59 Caule ereto; sulco adaxial da costa decorrente ao sulco da raque; tricomas pluricelulares ausentes da costa ..... *Diplazium*

59 Caule dorsiventral (reptante); sulco adaxial da costa não decorrente ao sulco da raque; tricomas pluricelulares presentes da costa (face adaxial) .....*Deparia*



49 Pecíolo com 1, 3 ou mais feixes vasculares na base

60 Soros alongados a lineares

61 Soros marginais ou submarginais

62 Lâmina cordada, sagitada, hastada, tri-lobada, palmada ou pedada, porém não verdadeiramente pinada .....*Doryopteris*



62 Lâmina no mínimo 1-pinada

63 Caule revestido apenas por tricomas ..... *Pteridium*

63 Caule revestido por escamas e eventualmente tricomas

64 Abertura do indúsio voltada para fora do tecido laminar .....*Lindsaea*

64 Abertura do indúsio voltada para o centro do tecido laminar

65 Caule radial, ereto ou decumbente; lâmina sem tonalidade esbranquiçada na face abaxial

66 Base do pecíolo com 1 feixe vascular..... *Pteris*

66 Base do pecíolo com 3 feixes vasculares .....*Adiantopsis*

65 Caule dorsiventral, longo-reptante; lâmina com a face abaxial esbranquiçada..... *Histiopteris*

61 Soros abaxiais, paralelos às ou sobre as nervuras

66 Lâmina simples; soros localizados dentro de sulcos na lâmina; indúsio ausente.

67 Lâmina furcada; nervuras livres ..... *Hecistopteris*

67 Lâmina inteira; nervuras anastomosantes

68 Lâmina elíptica a oblanceolada; soros em 4 ou 6 fileiras (2 ou 3 fileiras de cada lado da nervura mediana)..... *Polytaenium*

68 Lâmina linear; soros em 2 fileiras (uma de cada lado da nervura mediana)

69 Célula apical das paráfises filiforme a clavada; lâmina <0,4 cm larg..... *Vittaria*

69 Célula apical das paráfises em forma de funil; lâmina >0,4 cm larg ..... *Radiovittaria*

66 Lâmina pinatífida ou mais dividida; soros localizados na superfície da lâmina; indúsio presente

70 Plantas trepadeiras; lâmina 2-pinada.....*Salpichlaena*

70 Plantas não trepadeiras; lâmina no máximo 1-pinada

71. Frondes férteis e estéreis monomóficas ou fracamente dimórficas

72 Folhas pinadas, margens das pinas serreadas.....*Telmatoblechnum*

72 Folhas pinatífitas nunca verdadeiramente pinadas, margens dos segmentos lisas

73 Caule robustos (> 15 cm de perímetro) revestido de escamas negras, margens serruladas .....*Neoblechnum*

73 Caule delgados (< 5 cm de perímetro), revestido de escamas marrom, margens lisas ..... *Blechnum*



71 Frondes férteis e estéreis claramente dimórfica

74 Escamas do rizoma denticulada; rizomas longo-reptantes ..... *Lomaridium*

74 Escamas do rizoma inteiras, rizoma ereto ou curto reptante

75.Todas as pinas adnatas à raque

76 Fronde com pelo menos 32 × 7 cm ..... *Cranfillia*

76 Fronde com no máximo 12 × 3 cm ....*Austroblechnum*
75 Pinas proximais sésseis oi pecioluladas, não adnatas
77 Raque com ápice flageliforme portando uma gema ..... *Cranfillia*
77 Raque com ápice não flageliforme e sem gemas
78 Lâmina com base truncada (em ângulo reto com nervura principal)..... *Parablechnum*
78 Lâmina com as pinas gradualmente reduzidas na base
79 Nervuras pouco visíveis, costa não sulcada ..... *Lomariocycas*
79 Nervuras secundárias evidentes, costa com sulco profundo *Lomaria*

60 Soros de outros tipos (arredondados, gimnogramóides ou acrosticóides)
80 Esporos clorofilados, verdes
81 Lâminas simples, com margem esclerificada e negra ..... *Grammitis*
81 Lâminas sem margem esclerificada e negra
82 Pecíolos e lâminas com setas castanhas ou hialinas
83 Escamas do caule clatradas
84 Lâminas geralmente com mais de 1 cm de largura ..... *Melpomene*
84 Lâminas geralmente com menos de 0,5 cm de largura .....*Leucotrichum*
83 Escamas do caule não clatradas
85 Hidatódios ausentes
86 Soros com paráfises glandulares cerosas, esbranquiçadas; indumento do pecíolo e lâmina formados por setas castanhas.....*Ceradenia*
86 Soros glabros ou apenas com paráfises castanhas, indumento do pecíolo e lâmina formados por setas castanhas .....*Zygophlebia*
85 Hidatódios presentes
87 Nervuras dos segmentos simples ou com apenas um ramo acroscópico ..... *Moranopteris*
87 Nervuras dos segmentos pinadas
88 Frondes com crescimento indeterminado; cápsula setosa ..... *Alansmia*
88 Frondes com crescimento determinado; cápsula do esporângio sem setas
89 Plantas geralmente menores que 15 cm compr ..... *Moranopteris*
89 Plantas geralmente maiores que 20 cm compr ..... *Terpsichore*
82 Pecíolos e lâminas sem setas, glabros ou com tricomas hialinos
90 Escamas do caule não clatradas, paleáceas; lâminas simples, furcadas ou pinatifidas
91 Soros unidos formando um cenossoro ..... *Cochlidium*
91 Soros discretos não formando cenossoros..... *Moranopteris*
90 Escamas do caule clatradas, castanho-escuras a negras; lâminas pinatissectas
92 Lâminas com menos de 0,5 cm de largura ..... *Stenogrammitis*
92 Lâminas com mais de 1 cm de largura;
93 Escamas do caule iridescentes, glabras ..... *Melpomene*
93 Escamas do caule, opacas, ciliadas ou não.....*Lellingeria*
80 Esporos não clorofilados, amarelos, marrom ou mais escuro
94 Soros marginais ou submarginais
95 Caule revestido apenas por tricomas, raramente glabrescente
96 Pecíolo e raque lisos; indúsios 2-valvados, constituídos por uma porção interna e outra externa..... *Dennstaedtia*
96 Pecíolo e raque espinescentes; indúsios escamiformes, formado pela margem recurvada da lâmina ..... *Hypolepis*
95 Caule revestido por escamas e eventualmente tricomas
97 Soros marginais; pseudo-indúsio sem nervuras.....*Adiantopsis*
97 Soros submarginais; pseudo-indúsio com nervuras ..... *Adiantum*
94 Soros abaxiais (sob a folha)
98 Esporângios dispersos sobre as nervuras (soros gimnogramóides) ou recobrindo a lâmina (soros acrosticóides)
99 Soros gimnogramóides (esporângios isolados sobre as nervuras)

100 Caule com tricomas; substância farinosa ausente na

face abaxial da lâmina ..... *Tryonia*

100 Caule com escamas; lâmina revestida por uma substância farinosa branca ou amarelada na face abaxial ..... *Pityrogramma*

99 Soros acrosticóides (recobrindo a lâmina)

101 Lâmina estéril inteira ..... *Elaphoglossum*

101 Lâmina estéril ao menos 1-pinada

102 Lâmina estéril 1-pinada

103 Folhas com menos de 1m de comprimento, plantas trepadeiras ..... *Mickelia*

103 Folhas com mais de 2m de comprimento, plantas terrícolas ..... *Acrostichum*

102 Lâmina estéril no mínimo 2-pinada ..... *Polybotrya*

98 Esporângios reunidos em soros arredondados ou apenas levemente alongados



104 Nervuras anastomosadas formando aréolas irregulares ..... *Tectaria*

104 Nervuras livres

105 Lâmina 1-pinada, caule estolonífero, escamas peltadas ..... *Nephrolepis*

105 Lâmina 1-pinada ou mais dividida; caule não estolonífero, escamas basifixas;

106 Caule reptante

107 Indúsio ausente

108 Lâmina ao menos 2-pinado-pinatífida ..... *Lastreopsis*

108 Lâmina 1-pinada a 1-pinado-pinatissecta ..... *Stigmatopteris*

107 Indúsio presente

109 Margens das pinas e pínulas espessada e contínuas entre si, raque com um sulco central ..... *Lastreopsis*

109 Margens das pinas e pínulas não espessadas e nem e contínuas, raques com dois sulcos separados por uma crista central elevada ..... *Rumohra*

106 Caule ereto

110 Soros alongados; oblíquos a costa ..... *Didymochlaena*

110 Soros arredondados; pínulas ou segmentos não dimidiados

111 Eixos da lâmina sem tricomas ctenitóides; margem das pínulas com projeções espinulosas ..... *Polystichum*

111 Eixos da lâmina com tricomas ctenitóides; margem das pínulas ou segmentos sem projeções espinulosas

112 Lâmina até 1-pinado-pinatífida ..... *Ctenitis*

112 Lâmina 2-pinado ou mais dividida ..... *Megalastrum*

CORRESPONDÊNCIA GÊNERO-FAMÍLIA

Gênero	Família
Abrodictyum	HYMENOPHYLLACEAE
Acrostichum	PTERIDACEAE
Actinostachys	SCHIZAEACEAE
Adiantopsis	PTERIDACEAE
Adiantum	PTERIDACEAE
Alansmia	POLYPODIACEAE
Alsophila	CYATHEACEAE
Amauropelta	THELYPTERIDACEAE
Anemia	ANEMIACEAE
Asplenium	ASPLENIACEAE
Austroblechnum	BLECHNACEAE
Azolla	SALVINIACEAE
Blechnum	BLECHNACEAE
Campyloneurum	POLYPODIACEAE
Ceradenia	POLYPODIACEAE
Christella	THELYPTERIDACEAE
Cochlidium	POLYPODIACEAE
Cranfillia	BLECHNACEAE
Ctenitis	DRYOPTERIDACEAE
Cyathea	CYATHEACEAE
Cyclodium	DRYOPTERIDACEAE
Cyclosorus	THELYPTERIDACEAE
Cheiroglossa	OPHIOGLOSSACEAE
Danaea	MARATTIACEAE
Dennstaedtia	DENNSTAEDTIACEAE
Deparia	ATHYRIACEAE
Dicksonia	DICKSONIACEAE
Dicranopteris	GLEICHENIACEAE
Didymochlaena	DIDYMOCHLAENACEAE
Didymoglossum	HYMENOPHYLLACEAE
Diphasiastrum	LYCOPODIACEAE
Diphasium	LYCOPODIACEAE
Diplazium	ATHYRIACEAE
Doryopteris	PTERIDACEAE
Elaphoglossum	DRYOPTERIDACEAE
Equisetum	EQUISETACEAE
Eupodium	MARATTIACEAE
Goniopteris	THELYPTERIDACEAE
Grammitis	POLYPODIACEAE
Hecistopteris	PTERIDACEAE
Histiopteris	DENNSTAEDTIACEAE
Hymenophyllum	HYMENOPHYLLACEAE
Hypolepis	DENNSTAEDTIACEAE
Lastreopsis	DRYOPTERIDACEAE
Lellingeria	POLYPODIACEAE
Leucotrichum	POLYPODIACEAE
Lindsaea	LINDSAEACEAE
Lomaria	BLECHNACEAE
Lomaridium	BLECHNACEAE
Lomariocycas	BLECHNACEAE
Lophosoria	DICKSONIACEAE

Gênero	Família
Lycopodiella	LYCOPODIACEAE
Lycopodium	LYCOPODIACEAE
Lygodium	LYGODIACEAE
Macrothelypteris	THELYPTERIDACEAE
Marsilea	MARSILEACEAE
Megalastrum	DRYOPTERIDACEAE
Meniscium	THELYPTERIDACEAE
Melpomene	POLYPODIACEAE
Mickelia	DRYOPTERIDACEAE
Microgramma	POLYPODIACEAE
Moranopteris	POLYPODIACEAE
Neoblechnum	BLECHNACEAE
Nephrolepis	NEPHROLEPIDACEAE
Niphidium	POLYPODIACEAE
Ophioglossum	OPHIOGLOSSACEAE
Osmunda	OSMUNDACEAE
Osmundastrum	OSMUNDACEAE
Palhinhaea	LYCOPODIACEAE
Parablechnum	BLECHNACEAE
Pecluma	POLYPODIACEAE
Phlebodium	POLYPODIACEAE
Phlegmariurus	LYCOPODIACEAE
Pityrogramma	PTERIDACEAE
Pleopeltis	POLYPODIACEAE
Polybotrya	DRYOPTERIDACEAE
Polyphlebium	HYMENOPHYLLACEAE
Polypodium	POLYPODIACEAE
Polystichum	DRYOPTERIDACEAE
Polytaenium	PTERIDACEAE
Psilotum	PSILOTACEAE
Pteridium	DENNSTAEDTIACEAE
Pteris	PTERIDACEAE
Radiovittaria	PTERIDACEAE
Rumohra	DRYOPTERIDACEAE
Salpichlaena	BLECHNACEAE
Salvinia	SALVINIACEAE
Schizaea	SCHIZAEACEAE
Selaginella	SELAGINELLACEAE
Serpocaulon	POLYPODIACEAE
Steiropteris	THELYPTERIDACEAE
Sticherus	GLEICHENIACEAE
Stigmatopteris	DRYOPTERIDACEAE
Tectaria	TECTARIACEAE
Telmatoblechnum	BLECHNACEAE
Terpsichore	POLYPODIACEAE
Thelypteris	THELYPTERIDACEAE
Trichomanes	HYMENOPHYLLACEAE
Tryonia	PTERIDACEAE
Vandenboschia	HYMENOPHYLLACEAE
Vittaria	PTERIDACEAE
Zygophlebia	POLYPODIACEAE

CHAVE BASEADA EM

Labiak, P. H. & Prado, J. 2003. Grammitidaceae (Pteridophyta) no Brasil com ênfase nos gêneros *Ceradenia, Cochlidium* e *Grammitis*. **Hoehnea** 30: 243-283.

Labiak, P.H. Rouhan, G. & Sundue, M. 2010. Phylogeny and taxonomy of *Leucotrichum* (Polypodiaceae): A new genus of grammitid ferns from the Neotropics **Taxon** 59 (3): 911–921

Matos, F. B. 2009. **Samambaias e licófitas da RPPN Serra Bonita, município de Camacan, sul da Bahia, Brasil.** Dissertação (Mestrado em Botânica). Universidade Federal do Paraná.

Moran, R.C. 2019 **American Genera of Ferns and Lycophytes, a guide for students**. The New York Botanical Garden

Pietrobom, M. R., Athayde Filho, F. P., Costa, F. M., Fernandes, R. S., Maciel, S., Souza, M. G. C., & Sylvestre, L. S. (2023). **Samambaias e licófitas no Brasil: biologia e taxonomia**.

Sakagami, C. S. 2006. **Pteridófitas do Parque Ecológico da Klabin, Telêmaco Borba, Paraná, Brasil**. Dissertação (Mestrado em Botânica), Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

Schwartsburd, P. 2006. **Pteridófitas do Parque estadual de Vila-Velha, Paraná, Brasil**. Dissertação (mestrado em botânica) Universidade Federal do Paraná. Curitiba.