CARACTERÍSTICAS VEGETATIVAS DAS PRINCIPAIS FAMÍLIAS BOTÂNICAS DO SUL DO BRASIL

C.V. Roderjan, adaptado por R. Kersten 2025

GIMNOSPERMAS

Folhas simples, espiraladas, uninervias, sem estípulas

Araucariaceae Folhas Lanceoladas, ápice longo-acuminado

Podocarpaceae Folhas lineares, ápice brevemente acuminado



MONOCOTILEDÔNEAS

Folhas apicais,simples ou compostas, alternas, sem estípulas, paralelinervias ou peniparalelinérvias.

Arecaceae Crescimento monopodial, **tronco formado pelas bainhas das folhas**, estas deixando cicatrizes no caule.

Folhas Pinadas: *Syagrus* (Gerivá), *Euterpe* (Palmito), *Attaleia* (Indaiá)

Folhas Bipinadas: *Caryota*

Folhas Palmadas: *Mauritia* (Buriti),

Asparagaceae Crescimento monopodial ou simpodial, tronco áspero, sem cicatrizes, **folhas simples, fibrosas**, de ápice aciculado.

Base do caule espessada: *Yuca*

Tronco uniforme ou quase: *Cordyline*

DICOTILEDÔNEAS

Anacardiaceae Folhas simples ou compostas, alternas, sem estípulas, nervuras laterais terminando nas margens. Geralmente resinosa.
Imparipenada, **pecíolo alado**: *Schinus* (Aroeira)
Simples ou trifoliolada: *Lythraea* (Bugreiro)



Annonaceae Folhas simples, alternas, dísticas, sem estípulas, margem inteira, casca desprendente em tiras. Eixo dos **ramos novos geralmente em zig-zag**: *Annona*, *Rollinea*

Apocinaceae Folhas simples, alternas, sem estípulas, **ramos novos com muitas lenticelas**, fruto folículos geminados, frutos e **ramos novos lactíferos**: *Aspidosperma* (Peroba)



Aquifoliaceae Folhas simples, alternas, com estípulas, **cartáceae**, glabras, **discolores**, margem denteada. **Casca interna arenosa**: *Ilex* (erva-mate)

Araliaceae **Folhas digitadas**, **alternas**, com estípulas apicais deixando cicatrizes anelares: *Didymopanax, Scheflera*

Asteraceae Folhas simples, **alternas**, sem estípulas, geralmente **pilosas**. Casca **interna arenosa e escura**: *Piptocarpha, Vernonia* (Cambará), *Baccharia* (vassoura)

Bignoniaceae Folhas compostas**, opostas**, sem estípulas, com **folíolos longo peciolados**, **digitadas**: *Handroanthus* (Ipê)
Ou **Bipinadas**: *Jacaranda* (Caroba)

Bombacaceae

Folhas **digitadas, folíolos curto-peciolados**, **alternas**, com estípulas laterais, madeira pouco densa
Com acúleos: *Chorisia* (Paineira)
Sem acúleos: *Pseudobombax* (Embiruçu)

Cecropiaceae

Crescimento predominatemente monopodial, **folhas palmadas**, alternas, com estípula apical: *Cecropia* (Embaúba)

Clusiaceae

Folhas simples, opostas, sem estípulas
Folhas lactíferas, esbranquiçadas, nervação pouco visível: *Clusia*
Folhas não lactíferas, verde-escuro, nervação bem impressa, casca viva lactífera: *Calophyllum* (Guanandi), *Rheedia* (Bacupari)



Cunoniaceae

Folhas compostas, opostas, **com estípulas interpeciolares, com raquis aladas.**
Imparipinadas: *Weinmannia* (Gramimunha)
Digitadas: Lamanonia (guaperê)



Euphorbiaceae

Folhas simples, alternas, com **estípulas**, geralmente **glândulas na base**, Toda a planta **lactescente**
Com glândulas e látex: *Sapium* (Leiteiro), *Croton* (Sangue-de-boi), *Gymnanthes* (Branquilho - em beira de rio)
Com glândula, sem látex, **três nervuras principais**:*Alchornea* (Tapiá)
Sem glândulas nem látex: *Hieronyma* (licurana)





Salicaceae

Folhas simples, alternas, dísticas, com estípulas, margem serreada:
Casearia (Guassatunga),
Xylosma (sucará – com espinhos característicos no caule)

Lamiaceae

Folhas simples ou compostas, opostas, sem estípulas
Digitadas com folíolos curto-peciolados: *Vitex* (Tarumã)

Verticiladas com **glândulas na base** (domácea): *Cytharexyllum* (Jacataúva)

Lauraceae

Folhas simples, alternas, sem estípulas, **lanceoladas**, nervuras marcadas, Toda a planta **aromática**. **Casca interna arenosa** (Exceto *Ocotea puberula*- canela-sebo*)*
Ocotea, Nectandra, Cinnamomum, Persea (Canelas)

Magnoliaceae

Folha simples, alterna, com estípula apical, sem exudação: *Talauma* (baguaçu)

Melastomataceae

Folhas simples, opostas, sem estípulas, nervuras **curvinérvias**:
Tibouchina (Quaresmeira), *Miconia* (jacatirão, pixirica)

Fabaceae

Folhas **compostas**, alternas, com estípulas e **pulvinos**

"Mimosoideas" Bipinadas, glândulas na ráquis: *Mimosa*, *Acacia*, *Piptadenia*

"Caesalpinoideas" Bipinadas, sem glândulas na ráquis: *Caesalpinia*, *Schizolobium*
Paripinadas: *Senna, Cássia, Holocalix*
Bifolioladas: *Bauhinia* (Pata-de-vaca), *Hymenae* (Jatobá), :

"Faboideas" Imparipinadas: *Dalbergia, Centrolobium, Myrocarpus*
Trifoliolada: *Erytrina* (Corticeira)



Meliaceae

Folhas grandes, compostas, alternas, sem estípulas
Pinadas: *Cedrela* (Cedro), *Cabralea* (Cangerana), *Guarea* (baga de morcego)

Trifolioladas: *Trichilia* (catiguá)

Monimiaceae

Folha simples, opostas, sem estípulas, **pontos translúcidos**, **aromática**, margem **serreada** no terço superior. *Mollinedia* (Pimenteira)

Moraceae

Folhas simples, alternas, **estípula terminal**, 1º par de nervuras **secundárias formando ângulo reto**: *Fícus, Coussapoa*



Myrtaceae

Folha simples, oposta, sem estípulas, peninérvia, nervura secundárias numerosas anastomosadas prox. a margem (**nervura coletora**). **Pontos translúcidos**. **Margem inteira**:
Tronco liso pela perda da casca: *Myrcia* (Guamirim), *Eugenia* (pitanga), Psidium (Araçá),
Casca rugosa esfoleante *Campomanesia* (Guabiroba)

Primulaceae

Folha simples, alterna, sem estípulas (folha nova parece estípula), **nervação pouco saliente**, **face abaxial esbranquiçada**. Casca interna com bolsa de resina: *Myrsine, Rapanea* (Capororoca)

Proteaceae

Folha simples ou pinadas, alternas, sem estípulas; lâminas foliares com acentuado polimorfismo (inteiras, serradas, lobadas, na mesma planta), coriáceas, pilosas no dorso. Casca com lenticelas pequenas e alinhadas, casca interna com trançado característico. *Roupala* e *Euplasias* (Carvalho-brasileiro)

Rosaceae

Folha simples, alternas, sem estípulas, com glândulas na base. Sem exudação ou odores: *Prunus* (pessegueiro)

Rubiaceae

Folhas simples, opostas, com estípula interpeciolar: *Bathysa* (queima-casca), *Amaioua* (Carvoeiro), *Posoqueria* (baga de macaco)

Rutaceae

Folhas compostas, trifolioladas ou pinadas, alternas ou opostas, sem estípulas
Trifolioladas opostas: *Balfourodendrom* (pau-marfim), *Esembechia* (Guatambu),
Imparipinadas alternas, pontos translúcidos e odor cítrico, casca com **acúleos**: *Zanthoxyllum* (mamica-de-porca, Juvevê)

Sapindaceae

Folhas compostas, imparipinadas ou trifolioladas, alternas, sem estípulas, sem pontuações, odores ou exudações. Folhas imparipinadas terminando em **folíolo abortivo**
Trifoliolada, margem serreada: *Alophyllus* (vacum)
Imparipinada margem inteira: *Matayba*
Imparipinada margem serreada: *Cupania* (camboatá)

Solanaceae

Folhas simples, alternas, com/sem estípulas, geralmente pilosas, ou então com espinhos, e com mau odor: *Solanum* (fumo-bravo)

Vochysiaceae

Folhas simples, **verticiladas**, sem estípulas e **sem glândulas**: *Vochysia* (Guaricica)