

Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Madrid

Teorema de clasificación de superficies

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Grado en Matemáticas

Autor: Rodrigo De Pool
Tutor: Javier Aramayona

Curso 2019-2020

Resumen

Aquí va algo

Imágenes que no he usado:




Figura 1: Ejemplos de superficies: Esfera, toro y banda de Möbius

Abstract

Here goes something

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Introducción a las superficies topológicas	1
1.2	Orientación de superficies	2
1.3	Superficies compactas	3
1.4	Suma conexa	6
1.5	Triangulación de una superficie	10
2	Clasificación de superficies compactas	13
3	Hacia las superficies no compactas	15
4	Algunos resultados que no sé si incluiremos	17

CAPÍTULO 1

Introducción

El trabajo abarcará un estudio de las superficies topológicas y su clasificación:

Comenzaremos por introducir la noción de superficie de forma rigurosa. Una vez familiarizados con este concepto, tendremos como primer objetivo clasificar las superficies bajo la hipótesis de compacidad. Para ello definiremos la suma conexa y la triangulación, siendo ambas herramientas que nos facilitarán el manejo de las superficies compactas. Finalmente, enunciaremos y demostraremos el teorema de clasificación de las superficies compactas, teorema que nos garantizará que toda superficie compacta es necesariamente homeomorfa: o a una esfera; o a una ‘suma’finita de toros; o a una suma ‘suma’finita de planos proyectivos.

Como segundo objetivo, estudiaremos el resultado de Kérèjártó. El teorema generaliza la clasificación retirando la exigencia de compacidad. Antes de sumergirnos en el teorema, serán necesarias nuevas herramientas que nos permitan manejar las superficies no compactas. Por ello, introduciremos las nociones de finales, frontera ideal y clases de orientabilidad.

Por último, examinaremos una demostración de Ian Richards [2] que construye una superficie representante para cada clase de equivalencia topológica. Adelantamos que la construcción revela una espectacular relación entre las superficies y los subconjuntos del conjunto de Cantor.

1.1. Introducción a las superficies topológicas

El concepto de superficie topológica busca generalizar la idea de *superficie* en el sentido usual. Más concretamente, buscamos abarcar todo conjunto que comparta localmente las propiedades topológicas de una superficie en \mathbb{R}^n .

Definición 1.1. Diremos que un espacio topológico, S , es una **superficie topológica** si para todos sus puntos existe un entorno homeomorfo a $U^2 = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| < 1\}$. Además, a X se le exige ser Hausdorff, segundo numerable y conexo.¹

Consideremos los siguientes ejemplos sencillos de superficies topológicas:

1. El conjunto $U^2 = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1\}$, dotado de la topología de subespacio, es trivialmente una superficie.
2. El cuadrado sin bordes

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$$

al ser dotado de la topología de subespacio, también es ejemplo de superficie.

3. Dado un homeomorfismo cualquiera:

$$f : S \rightarrow X$$

tendremos que si S es una superficie topológica, entonces $f(S)$ también lo es.

Por otro lado, si consideramos el cuadrado con sus bordes (\overline{C}), el conjunto no compone un ejemplo de superficie tal y como lo definimos. En este conjunto los puntos que pertenecen a las aristas no tienen entornos homeomorfos a U^2 . Veremos que \overline{C} es una ‘superficie con borde’, concepto que estudiaremos más adelante.

1.2. Orientación de superficies

Las superficies se dividen en dos clases: Las orientables y las no orientables. Intentaremos en esta sección esbozar el concepto de orientabilidad sin llegar a un completo rigor matemático.

En el plano definir una orientación equivale a elegir un sentido de rotación positivo. Por ejemplo, se podría elegir que girar en contra de las agujas del reloj se considera la rotación *positiva*. En \mathbb{R}^2 , una vez fijada la orientación, podemos desplazarnos por un camino cerrado y comprobar que el sentido de rotación positivo al final y al inicio del camino coinciden, en este caso decimos que el camino *conserva la orientación*. Si, por el contrario, ocurriese que los sentidos de rotación fueran distintos, diríamos que el camino *invierte la orientación* (esto nunca ocurre en \mathbb{R}^2). En general, conviene definir la orientación como la elección de una base de vectores, esta definición, además de equivalente que a la ya presentada, permite generalizar la orientabilidad a \mathbb{R}^n .

En \mathbb{R}^n elegir una **orientación** consiste en elegir qué bases vectoriales son *positivas* y cuales son *negativas*. Veamos como realizar esta clasificación: Sea \mathcal{B} el conjunto de

¹Si retiramos la hipótesis de conexión y sustituimos U^2 por U^n , obtenemos una *n-variedad* topológica. Sin embargo, en este trabajo nos limitamos al estudio de las 2-variedades conexas (superficies).

bases de \mathbb{R}^n , y sean B_1 y B_2 dos bases de este conjunto, entonces podemos definir la siguiente relación:

$$B_1 \sim B_2 \iff \det(B_1 B_2) > 0$$

Se puede comprobar con las propiedades de los determinantes que \sim define una relación de equivalencia. Tendremos entonces que definir una **orientación** en \mathbb{R}^n equivale a asignar a una clase de equivalencia la etiqueta de *orientación positiva* y a la otra la etiqueta de *orientación negativa*, i.e, equivale a definir una σ :

$$\sigma : \mathcal{B}/\sim \longrightarrow \{-1, 1\}$$

Observamos entonces que la orientación queda totalmente determinada por la elección de una base B de \mathbb{R}^n que catalogamos como *positiva*.

Para el caso de una superficie topológica abstracta, podemos imaginarla localmente como un abierto de \mathbb{R}^2 en donde elegimos una orientación. Si en la superficie todos los caminos cerrados conservan la orientación, diremos que la superficie es **orientable**, como por ejemplo una esfera. Inversamente, si existiese un camino cerrado que invierte la orientación (cambia el sentido de rotación), entonces diremos que la superficie es **no orientable**, como es el caso de una banda de Möbius. En las próximas secciones veremos varios ejemplos de ambas superficies.

Se puede demostrar que la orientabilidad es una propiedad topológica (se conserva por homeomorfismos). En el contexto del teorema de clasificación de superficies, observaremos como la orientabilidad de la superficie nos delimitará las clases de equivalencia a las que una superficie puede pertenecer.

(PREGUNTA: Qué tal? Agrego ejemplos? los detallo y dibujo? Debería añadir rigor?)

1.3. Superficies compactas

En nuestro objetivo de acercarnos a una clasificación completa de superficies, empezaremos por estudiar el caso de las superficies compactas. Para ello necesitaremos primero hacernos con un bagaje de ejemplos de superficies compactas elementales. Sin más preámbulo, alimentemos la curiosidad del lector con estos suculentos ejemplos:

La esfera

El conjunto $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = 1\}$ claramente conforma un ejemplo de superficie compacta. Alternativamente, se puede expresar la esfera como el disco $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |(x, y)| \leq 1\}$, realizando la identificación 1.1 y dotando al conjunto resultante de la topología cociente.

$$(1.1) \quad (x, y) \equiv (x, -y), \quad \forall (x, y) \in fr(D)$$

Se puede comprobar que ambas formas de definir la esfera son homeomorfas.




Figura 1.1: Esfera como espacio cociente

El toro

Si se toma el cuadrado cerrado $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$ con la topología de subespacio, el **toro** se construye de identificar los puntos de X según 1.2 y dotar al conjunto resultante de la topología cociente.

$$(1.2) \quad \begin{aligned} (x, -1) &\equiv (x, 1) & x \in [-1, 1] \\ (-1, y) &\equiv (1, y) & y \in [-1, 1] \end{aligned}$$

En la figura 1.2 se representa gráficamente el toro. Las aristas con el mismo símbolo indican aristas a identificar en el sentido indicado por las flechas.




Figura 1.2: Toro como espacio cociente

El plano proyectivo

Por su parte, el **plano proyectivo** corresponde al disco $D = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1\}$ en el cual se identifican los puntos antipodales de la frontera. Se ilustra esta identificación en la figura 1.3.

De los tres ejemplos de superficies compactas dadas hasta ahora, este es el único de una superficie no orientable.

Después de haber visto los ejemplos, es razonable cuestionarse si los espacios cocientes que tratamos en ellos son realmente conjuntos compactos. El siguiente lema nos demuestra que, en efecto, las superficies obtenidas son compactas.




Figura 1.3: Plano proyectivo como espacio cociente

Lema 1.2. *Sea X un espacio topológico e Y un espacio cociente que resulta de identificar puntos en X . Entonces:*

$$X \text{ compacto} \Rightarrow Y \text{ compacto}$$

*Demuestra*ción. Sea $f : X \rightarrow Y$ la función cociente que asocia a cada punto su clase de equivalencia; f es claramente sobreyectiva y, por ser cociente, es continua.

Siendo X compacto tenemos entonces que $f(X) = Y$ también lo es. \square

En nuestros ejemplos todas las superficies vienen de identificar puntos en conjuntos compactos. Se sigue entonces del lema que las superficies son a su vez compactas.

Expresión canónica

Las figuras 1.1, 1.2 e 1.3, de cada ejemplo respectivamente, sugieren una forma visual de definir superficies compactas: formamos un polígono con un número par de lados e identificamos sus aristas a pares.

Más aún, se puede definir una notación con la que referirnos a estos polígonos: Partiendo de cualquier vértice recorremos la figura en el sentido de las agujas del reloj, se anotan los símbolos según se recorre la respectiva arista y se agrega el exponente 1 o -1, según si la flecha va en el mismo sentido del recorrido o en sentido contrario.

Con esta notación: nos referimos a la esfera (figura 1.1) como aa^{-1} ; al toro (figura 1.2) como $aba^{-1}b^{-1}$; y al plano proyectivo (figura 1.3) como aa . Llamaremos **expresión canónica** a estas formas de referirnos a la esfera, al toro y al plano proyectivo, respectivamente.

La notación sugerida facilita enormemente la definición de nuevas superficies. Utilicemos esta herramienta para introducir un último ejemplo de superficie compacta:

Botella de Klein

La **botella de Klein** es la superficie que corresponde con la expresión $aba^{-1}b$.




Figura 1.4: Botella de Klein

1.4. Suma conexa

La suma conexa es un operador entre superficies. La idea será ir ‘sumando’ superficies compactas para generar nuevas. De hecho, si se me permite el *spoiler*, utilizaremos este operador en toros y planos proyectivos para construir superficies homeomorfas a **cualquier** otra superficie compacta.

Procedamos a definir matemáticamente el operador:

Definición 1.3. Dadas dos superficies S_1 y S_2 , se define la **suma conexa** de ambas ($S_1 \# S_2$) como la superficie generada al recortar un disco de cada superficie y pegarlas a través del borde de los discos retirados. Más formalmente:

1. Para cada S_i , tomamos un subconjunto $D_i \subset S_i$ homeomorfo al disco cerrado $E^2 = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \leq 1\}$. Llamamos S'_i al complementario del interior de D_i .
2. Tomamos un homeomorfismo $\psi : D_1 \longrightarrow D_2$
3. Definimos entonces $S_1 \# S_2$ como $S'_1 \cup S'_2$ dotado de la topología cociente que resulta de la identificación:

$$x \equiv \psi(x), \quad \forall x \in D_1$$

Habría que comprobar que la suma conexa está bien definida y resulta en una nueva superficie. Este aspecto lo abordamos en lema 4.4.

Ejemplos

Utilizando la notación introducida hasta el momento presentamos algunos ejemplos de sumas conexas:

Suma conexa de toros

Sean T_1 y T_2 dos toros disjuntos, estudiemos $S = T_1 \# T_2$. Nos ayudamos de la figura 1.5 para ilustrar el proceso:

Primero, retiramos de cada toro el disco con frontera c_i , como vemos en la primera imagen. Nótese que podemos expresarlo como la segunda imagen porque todos

los vértices del polígono están identificados. Finalmente, identificamos los bordes c_1 y c_2 , obteniendo el octágono que representa S , donde, de nuevo, todos los vértices representan el mismo punto.




Figura 1.5: Suma conexa de dos toros

Utilizando la notación para expresiones canónicas, de la figura 1.5 se deduce que S se puede expresar como $a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}a_2b_2a_2^{-1}b_2^{-1}$.




Figura 1.6: Suma conexa de dos toros como subvariedades de \mathbb{R}^3

Suma conexa de planos proyectivos

Podemos seguir un mecanismo parecido al anterior para realizar la suma conexa de dos planos proyectivos. En la figura 1.7 ilustramos la misma construcción para dos planos proyectivos. La expresión canónica de la superficie resultante es $a_1a_1a_2a_2$.

Suma conexa de esferas

En la figura 1.8 ilustramos la suma conexa de dos esferas. Curiosamente observamos




Figura 1.7: Suma conexa de dos planos proyectivos

que el resultado es otra esfera. Se puede comprobar que la esfera actúa como elemento neutro de la suma conexa.




Figura 1.8: Suma conexa de dos esferas

Otra propiedad interesante de la suma conexa es que conserva la compacidad, i.e., si $S = S_1 \# S_2$, entonces S será compacta si lo son S_1 y S_2 . En los ejemplos de la suma de toros, planos proyectivos y esferas, basta con usar el lema 1.2 para demostrarlo.

Expresiones canónicas de sumas conexas

Los ejemplos mencionados en la sección anterior proporcionan un método para describir sumas conexas arbitrarias de esferas, toros y planos proyectivos. Basta repetir los mismos procedimientos para comprobar que:

- La suma conexa de n esferas es igual a una esfera:

$$(1.3) \quad aa^{-1}$$

- La suma conexa de n toros se puede escribir como:

$$(1.4) \quad a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} \dots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}$$

- La suma conexa de n planos proyectivos se puede describir como:

$$(1.5) \quad a_1 a_1 a_2 a_2 \dots a_n a_n$$

A las expresiones 1.3, 1.4 y 1.5 las llamaremos *expresiones canónicas* de sus respectivas sumas conexas.

Antes de dar el asunto por concluido, veamos un último ejemplo de suma conexa:

Lema 1.4. *La suma conexa de dos planos proyectivos es una botella de Klein*

*Demuestra*ción. En la demostración trataremos al plano proyectivo como el disco unidad identificando los puntos diametralmente opuestos.

Seleccionamos del plano proyectivo el subconjunto $D = \{(x, y) : |y| \geq \frac{1}{2}, |x| \leq \sqrt{1 - y^2}\}$ homeomorfo al disco cerrado. Retiramos D como se muestra en la figura 1.9, los segmentos discontinuos representan la frontera del disco por la cual se ha de realizar la suma conexa.




Figura 1.9: Plano proyectivo menos un subconjunto homemorfo al disco cerrado

Partiendo de dos planos proyectivos, I e II , retiramos el disco como en la figura 1.9. Luego procedemos a identificar ambos conjuntos como se indica en la figura 1.10.




Figura 1.10: Botella de Klein = $I \# II$

La figura final obtenida es una *Botella de Klein*. □

El ávido lector se habrá dado cuenta de un detalle curioso de la demostración, retirar un disco de un plano proyectivo lo convierte en una banda de Möbius!

1.5. Triangulación de una superficie

Una triangulación, en caso de existir, pretende expresar una superficie como un conjunto de triángulos identificados por las aristas. La noción de triangulación, *a priori* inofensiva, será un ingrediente clave para poder manipular superficies compactas. Se define rigurosamente como:

Definición 1.5. Una **triangulación** de una superficie compacta, S , consiste en subconjuntos cerrados, $\{T_1, \dots, T_n\}$, que cubren a S y en una familia de homeomorfismos, $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$, que cumplen:

$$\phi_i : T'_i \longrightarrow T_i$$

Donde T'_i es un triángulo del plano \mathbb{R}^2 . Además, se exige que para cualesquiera dos T_i y T_j con $i \neq j$, se cumpla una de las siguientes condiciones:

- Son conjuntos totalmente disjuntos.
- Comparten un vértice en común y solo eso.
- Tienen toda una arista en común y solo eso.

Adicionalmente, llamaremos **vértice** a todo elemento de S que se corresponde por algún ϕ_i con un vértice en el plano. Y llamaremos **arista** a todo subconjunto de S que tenga por imagen una arista de algún T'_i .

Intuitivamente, podemos pensar en una triangulación como una teselación por triángulos de una superficie dada. Estudiemos algunos ejemplos concretos para familiarizarnos con el concepto:

El toro se puede triangular como ilustra la figura 1.11. Fijémonos que basta con definir una lista de triángulos, con sus respectivos vértices, para concretar una triangulación. En la figura indicada la lista sería: [Lista de triángulos]




Figura 1.11: Triangulación del toro

En la figura 1.12 señalamos un par de intentos de simplificar la triangulación del toro. Sin embargo, notemos que ninguna de las dos imágenes son triangulación del toro. La primera, aunque triangulación, no es homeomorfa al toro; La segunda ni siquiera satisface las condiciones de triangulación.

Para el caso del plano proyectivo, se propone en la figura 1.13 una triangulación.




Figura 1.12: Ejemplos de cosas que no son triangulaciones




Figura 1.13: Triangulación del plano proyectivo

Resultados sobre la triangulación

Primero, veamos un par de lemas que nos enmarcan el comportamiento de las triangulaciones:

Lema 1.6. *Sea S una superficie triangulable entonces una arista lo es de exactamente dos triángulos.*

Demuestra. TODO: En proceso, escribirla si hiciese falta

Si un punto de una arista pertenece a n triángulos \Rightarrow existe entorno del punto que está contenido dentro de estos n triángulos disjuntos y solo comparten la arista.

Una bola no puede ser homeomorfa a nada que no sea $n=2$. \square

Lema 1.7. *Sea S una superficie triangulable y $v \in S$ un vértice en esa triangulación, entonces podemos ordenar el conjunto de todos los triángulos con vértice v cíclicamente, $T_0, T_1, \dots, T_n = T_0$, de manera que T_i y T_{i+1} tienen toda una arista en común para todo $0 \leq i \leq n - 1$.*

Demuestra. TODO: En proceso, escribirla si hiciese falta

Que se puede conseguir es consecuencia de 1.6.

Que es único tengo que mirarlo en el libro \square

La triangulación nos servirá más adelante como herramienta potentísima para demostrar el teorema de clasificación de superficies compactas. Comprobaremos que

con ella podremos expresar cualquier superficie topológica compacta, por abstracta que sea, como un conjunto de triángulos en Intuitivamente, podemos pensar en la triangulación como una teselación por triángulos de una superficie. Para el caso de una esfera o un toro uno puede imaginarse tales teselaciones

La triangulación compone una herramienta potente para el manejo de superficies compactas. Comprobaremos más adelante que nos permite manipular la superficie como si se tratara de triángulos en \mathbb{R}^2 . Sin embargo, primero es necesario probar que *de facto* existe tal triangulación, requisito que parece especialmente intimidante para el caso de conjuntos abstractos. Por suerte, el matemático Tibor Radó demostró un teorema que nos garantiza que toda superficie compacta es triangulable. Enunciamos el teorema sin, lamentablemente, dar demostración.

Teorema 1.8. Teorema de triangulación

Toda S superficie compacta es triangulable.

Con este teorema concluimos el arsenal de herramientas que nos hará falta para emprender la demostración del teorema de clasificación de superficies compactas.

CAPÍTULO 2

Clasificación de superficies compactas

Teorema 2.1. *Teorema de clasificación de superficies compactas*

Toda superficie compacta es homeomorfa a una esfera, a una suma conexa de toros o una suma conexa de planos proyectivos.

1. Idea de la prueba
2. Visto como triángulos pegados
3. Pasos 1 al 5
4. Corolarios y ejemplos
5. Característica de Euler, conservación y género?
6. Superficies con borde?

CAPÍTULO 3

Hacia las superficies no compactas

[Complicaciones, citar resultados para superficies con borde]

[Introducir finales y frontera ideal]

[Demostrar algunos, citar otros, lemas de fronteras ideales]

[Tma de Kerekjartos sobre clasificación]

[Relación de espacios totalmente inconexos, separables (cjto denso numerable) y compacto con el Cjto de Cantor]

[Construcción de Ian Richards dando una superficie a cada posible frontera ideal]

CAPÍTULO 4

Algunos resultados que no sé si incluiremos

Cosas que empecé a escribir pero que probablemente no haga falta incluir en el TFG. Son definiciones elementales de topo y algunos lemas.

Definición 4.1. Un conjunto \mathcal{X} es no conexo si existen dos conjuntos cerrados, \mathcal{X}_1 y \mathcal{X}_2 , tal que $\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \cup \mathcal{X}_2$ y $\mathcal{X}_1 \cap \mathcal{X}_2 = \emptyset$.

Definición 4.2. Un conjunto \mathcal{X} se dice conexo si no cumple la definición anterior.

[Def de topo cociente] [Compacto va a compacto por f cont, conexo va a conexo]

Lema 4.3. *El pseudolema más útil de toda la topología*

Al dilatar, comprimir, trasladar y cortar-identificar una figura, el objeto obtenido es homeomorfo al inicial. ¿Por qué?, se pregunta un matemático, porque todas las transformaciones son continuas. (¿Incluir en el TFG en tono seriesísimo?)

Lema 4.4. *Para verificar que la suma conexa está bien definida hace falta aclarar varios puntos.*

1. *Tenemos que asegurar la existencia de un subconjunto homeomorfo a un disco.*

Demostración. Tomamos un punto $p \in S_i$ cualquiera. Como S_i es una 2-variedad, entonces existe un homeomorfismo g que manda un entorno, U , del punto p al círculo abierto.

Tomamos $E_{\frac{1}{2}}$ el disco cerrado de radio $\frac{1}{2}$, y $U' = g^{-1}(E_{\frac{1}{2}})$. Tenemos que $g|_{U'}$ es un homeomorfismo de un subconjunto de S_i a $E_{\frac{1}{2}}$ que a su vez es homeomorfo al disco cerrado de radio 1. \square

2. *Segundo, tenemos que asegurarnos que existe un tal ψ homeomorfismo:*

Demostración. Utilizando los g anteriores basta ver que $g(fr(D_i)) = fr(E^2)$, y luego componer las funciones para construir un homeomorfismo entre las fronteras. \square

3. Tercero, habría que comprobar que, en efecto, el objeto obtenido es una superficie. Es decir, comprobar que todo punto tiene un entorno homeomorfo al disco abierto, que el espacio es T_2 y que es conexo.

Demostración. Ideas (hace falta formalizarlo?) 1. Entorno homeomorfo a la bola: Tenemos que comprobarlo para los ptos frontera. Esta dems es engorrosa: Basta quizás con ver que localmente podemos tratar a los puntos de la frontera como si estuviesemos en R^2 , observando las construcciones de homeomorfismos podemos concluir que se puede crear un entorno homeomorfo a una bola al pegar dos semicírculos de cada superficie (vistas en R^2 localmente). 2. Conexión: Basta con probar que para todos los puntos del borde sus abiertos tienen puntos de ambas superficies. Esto se sigue directamente de la topología cociente inducida (analizar la definición con la función cociente, tendrás puntos en ambas superficies por tener abtos en ambas). 3. Ver que es T_2 resulta sencillo. Si los ptos son de superficies distintas, ya está, por ser disjuntas. Si son de la misma entonces también, porque antes eran t_2 . Si una es de la superficie, por concretar, de S^1 y la otra del borde, entonces tomamos los mismos abtos que antes separaban a los puntos, pero el abto del borde ya no es abto de la superficie cociente, es fácil comprobar que ese conjunto unión S^2' sí es un abto (por la def de topo cociente, todos los ptos serán interiores) y también es fácil ver que estos dos conjuntos serán disjuntos, por lo que hemos separado los dos ptos. \square

4. Y, finalmente, tenemos que comprobar que esta definición es independiente de los conjuntos D_i escogidos e independiente de los homeomorfismos.

Demostración. Ideas (hace falta formalizarlo?): 1. Que no depende del homeomorfismo es directo porque solo nos hace falta esa propiedad para establecer la topología cociente. Habiendo probado el punto anterior ya estaría. 2. Que no depende de la elección del disco se sigue de que podemos desplazar el disco por la superficie manteniendo el homeomorfismo con la superficie anterior. De no poder hacerlo entonces tendríamos que no se puede retirar un disco en la zona a la que estamos desplazándolo, pero en ese caso sencillamente no tomaríamos esa elección de disco por ser imposible. \square

Bibliografía

- [1] WILLIAM S. MASSEY: Introducción a la topología algebraica. *Editorial Reverté* **1** (2006), 1–29.
- [2] IAN RICHARDS *Classification of non compact surfaces...o algo así*

