

初等数论笔记

CHUDENGSHULUNBIJI

rogeryoung

目录

1	整数的整除性
---	--------

第 1 章 整数的整除性

注意我们的理论基础是整数，尽量通过分类讨论的方式得到结论。而且也要把握脉络，抓住重点，不要迷失于无谓的细节中。

定义 1.1

对于整数 a, b ，其中 $a \neq 0$ ，若存在整数 c ，它使得

$$b = ac$$

则 b 叫做 a 的倍数， a 叫做 b 的因数，记作 $a \mid b$ 。



有时也称作 a 能整除 b ，或 b 能被 a 整除，或 a 能除尽 b ，或 b 能被 a 除尽。

若 a 不能整除 b ，我们就记作 $a \nmid b$ 。

引理 1.1

如果对于整数 a, b 满足 $a \mid b$ ，则有

$$(-a) \mid b, \quad a \mid (-b), \quad (-a) \mid (-b), \quad |a| \mid |b|$$



这个比较显然，由定义知存在 c 使得 $b = ac$ ，再构造验证即可。

引理 1.2

对于整数 a, b, c 有 $a \mid b, b \mid c$ ，则有 $a \mid c$ 。



证明 因为 $a \mid b, b \mid c$ ，故存在整数 d, e 使得 $b = ad, c = be$ 。

因此存在整数 $f = de$ 使得 $c = af = ade$ ，故 $a \mid c$ 。

□

引理 1.3

对于整数 a, b 有 $|a| \mid |b|$ ，若 $|a| < |b|$ 则有 $a = 0$ 。



证明 因为 $|a| \mid |b|$ ，则存在整数 c 使得 $|a| = |b|c$ 。那么有

$$0 \leq |a| = |b|c < |b|$$

即 $0 \leq c < 1$ ，又 c 为整数，故 $c = a = 0$ 。

□

定理 1.1

对于整数 a, b ，若 $b \neq 0$ 则一定存在唯一一对 q, r 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|$$



证明 先证明存在性。

(1) 若恰 $b \mid a$ ，则必存在 c 使得 $a = bc$ ，此时有 $q = c, r = 0$ 。

(2) 否则一定存在 n 使得 $n|b| < a < (n+1)|b|$ ，即存在 $0 < r < |b|$ 使得 $a = |b|n + r$ 。

当 $b > 0$ 时，令 $q = n$ ；当 $b < 0$ 时，令 $q = -n$ 则有

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|$$

再证明唯一性。设存在两对 q_1, r_1 和 q_2, r_2 使得

$$a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2, \quad 0 \leq r_1, r_2 < |b|$$

相减有

$$a - a = b(q_1 - q_2) + r_1 - r_2 = 0$$

即 $r_1 - r_2 = -b(q_1 - q_2)$, 因此有 $b \mid (r_1 - r_2)$ 。而 $|r_1 - r_2| < |b|$, 又引理知有 $|r_1 - r_2| = 0$ 。故

$$r_1 = r_2, q_1 = q_2$$

即两对相同。 □

定义 1.2

若一个大于 1 的正整数, 只能被 1 和它本身整除, 不能被其他正整数整除, 这样的数叫做素数 (质数)。



定义 1.3

若一个大于 1 的正整数, 除了能被 1 和它本身整除外, 还能被其他正整数整除, 这样的数叫合数。

