

数学分析笔记

SHUXUEFENXIBIJI

rogeryoung

目录

1	实数集与函数	2
1.1	实数	2
1.2	函数的上下界	3
1.3	实数系的构造	4
2	数列极限	5
2.1	数列极限的概念	5
2.2	收敛数列的性质	5
2.3	数列极限存在的条件	7
2.4	柯西 (Cauchy) 准则	8
2.5	Stolz 公式	9
2.6	例题	9
3	函数极限	10
3.1	函数极限的概念	10
3.2	函数极限的性质	11
3.3	函数极限存在的条件	11
3.4	两个重要的极限	12
3.5	无穷小量与无穷大量	12
3.6	常见等价无穷小	13
4	函数的连续性	14
4.1	连续性的概念	14
4.2	连续函数的性质	15
4.3	初等函数的连续性	16
5	导数和微分	17
5.1	导数的定义	17
5.2	求导法则	18
5.3	单调性与导数	19
6	微分中值定理	20
6.1	拉格朗日定理	20
6.2	柯西中值定理	20

第 1 章 实数集与函数

集合论与函数和映射视作熟知的。若无额外说明, 皆在 \mathbb{R} 下。

1.1 实数

有理数和无理数统称实数, 有理数可用分数形式 $\frac{p}{q}$ 表示, 也可用有限十进小数或无限十进循环小数表示; 而无限十进不循环小数则成为无理数。

为了让任意实数都可用一个确定的无限小数来表示, 如下规定:

对于正有限小数 (包括正整数) x , 当 $x = a_0.a_1a_2\cdots a_n$ 时, 其中 $0 \leq a_i \leq 9, i = 1, 2, \cdots, n, a_n \neq 0$, a_0 为非负整数, 即

$$x = a_0.a_1a_2\cdots(a_n - 1)9999\cdots,$$

而当 $x = a_0$ 为正整数时, 则记

$$x = (a_0 - 1).9999\cdots$$

对于负有限小数 (包括负整数) y , 则先将 $-y$ 表示为无限小数, 再在所得无限小数之前加负号。并规定 0 表示为 $0.0000\cdots$ 。

实数有以下性质:

1. 实数集 \mathbb{R} 对加、减、乘、除 (除数不为 0) 四则运算是封闭的。
2. 实数集是有序的: 任意 a, b 必满足三个关系之一 ($a < b, a = b, a > b$)。
3. 实数的大小关系具有传递性: 若 $a > b, b > c$, 则有 $a > c$ 。
4. 实数具有阿基米德性: 对任何 $a, b \in \mathbb{R}$, 若 $b > a > 0$, 则存在正整数 n , 使得 $na > b$ 。
5. 实数集具有稠密性: 任意 a, b 之间必存在另一个实数, 可以是有理数, 也可以是无理数。

1.1.1 数集·确界原理

区间分为无限区间和有限区间。

设实数 $a < b$, 则称数集 $\{x \mid a < x < b\}$ 为开区间, 记作 (a, b) ; 数集 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 称为闭区间, 记作 $[a, b]$; 数集 $\{x \mid a \leq x < b\}$ 和 $\{x \mid a < x \leq b\}$ 都称为半开半闭区间, 分别记作 $[a, b)$ 和 $(a, b]$ 。以上几类区间统称为有限区间。

满足关系式 $x \geq a$ 的全体实数 x 的集合记作 $[a, +\infty)$, 类似地, 有 $(-\infty, a], (a, +\infty), (-\infty, a)$ 。特殊地 $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ 。这几类区间统称为无限区间。

设 $\delta > 0$, 满足 $|x - a| < \delta$ 的 x 的集合称为点 a 的 δ 邻域, 记作 $U(a; \delta)$, 或简单的记作 $U(a)$, 即有

$$U(a; \delta) = (a - \delta, a + \delta)$$

点 a 的空心 δ 邻域定义为

$$U^\circ(a; \delta) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\}$$

也可以简单的记作 $U^\circ(a)$ 。

此外，常用的邻域还有：

点 a 的 δ 右邻域 $U_+(a; \delta) = [a, a + \delta)$ ，左邻域 $U_-(a; \delta)$ 。以及点 a 的空心 δ 左、右邻域 $U_+^\circ(a)$ 与 $U_-^\circ(a)$ 。

以及 ∞ 邻域 $U(\infty) = \{x \mid |x| > M\}$ ，其中 M 为充分大的正数。类似的还有 $U(+\infty) = \{x \mid x > M\}$ 和 $U(-\infty) = \{x \mid x < -M\}$ 。

定义 1.1 (有界集)

设 S 为一个非空数集，若存在数 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in S$

1. 都有 $x \leq M$ ，则称 M 是 S 的一个上界。
2. 都有 $x \geq M$ ，则称 M 是 S 的一个下界。



若数集 S 既有上界又有下界，则称 S 为有界集，反之称为无界集。

定义 1.2 (上确界)

设 S 是一个数集，若数 β 满足：

1. β 是 S 的上界： $\forall x \in S$ ，有 $x \leq \beta$ 。
2. 任何小于 β 的数不是数集 S 的上界： $\forall \mu < \beta, \exists x_0 \in S$ 使得 $x_0 > \mu$ 。

则称数 β 为数集 S 的上确界，记作 $\sup S$ 。



定义 1.3 (下确界)

设 S 是一个数集，若数 α 满足：

1. α 是 S 的下界： $\forall x \in S$ ，有 $x \geq \alpha$ 。
2. 任何大于 α 的数不是数集 S 的下界： $\forall \mu > \alpha, \exists x_0 \in S$ 使得 $x_0 < \mu$ 。

则称数 α 为数集 S 的下确界，记作 $\inf S$ 。



上确界与下确界统称为确界。应注意，数集 S 的确界可能属于 S ，也可能不属于 S 。

定理 1.1 (确界原理)

设 S 为非空数集，若 S 有上界，则 S 必有上确界；若 S 有下界，则 S 必有下确界。



若把 $\pm\infty$ 看作非正常上下确界，前文定义视为正常上（下）确界，那么任一非空数集必有上下确界。

1.2 函数的上下界

定义 1.4

设 f 为定义在 D 上的函数。若存在数 $M(L)$ ，使得对每一个 $x \in D$ ，有 $f(x) \leq M(f(x) \geq L)$ ，则称 f 为 D 上的有上（下）界函数， $M(L)$ 称为 f 在 D 上的一个上（下）界。

反之，若存在数 $M(L)$ ，使得对每一个 $x \in D$ ，有 $f(x) \geq M(f(x) \leq L)$ ，则称 f 为 D 上的有下（上）界函数。



定义 1.5

设 f 为定义在 D 上的函数。若存在正数 M ，使得对每一个 $x \in D$ ，有 $|f(x)| \leq M$ ，则称 f 为 D 上的有界函数。

反之，若存在正数 M ，使得对每一个 $x \in D$ ，有 $|f(x)| \geq M$ ，则称 f 为 D 上的无界函数。



记函数 f 在 D 上的上确界为 $\sup_{x \in D} f(x)$ ，类似的有 $\inf_{x \in D} f(x)$ 。

定义 1.6

设 f 为定义在 D 上的函数，若对任何 $x_1, x_2 \in D$ ，当 $x_1 < x_2$ 时：

1. 总有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ ，则称 f 为 D 上的增函数，若成立严格不等式 $f(x_1) < f(x_2)$ 时，称 f 为 D 上的严格增函数。
2. 总有 $f(x_1) \geq f(x_2)$ ，则称 f 为 D 上的减函数，若成立严格不等式 $f(x_1) > f(x_2)$ 时，称 f 为 D 上的严格减函数。



增函数和减函数统称为单调函数，严格增函数和严格减函数统称为严格单调函数。

严格单调函数必有反函数，其也为严格单调函数。

定义 1.7

设 D 为对称于原点的数集，函数 f 为定义在 D 上的函数。若对每一个 $x \in D$ ：

1. 有 $f(-x) = -f(x)$ ，则称 f 为 D 上的奇函数。
2. 有 $f(-x) = f(x)$ ，则称 f 为 D 上的偶函数。



1.3 实数系的构造

定义 1.8 (Dedekind 分割)

设 A 为 \mathbb{Q} 的子集，若满足以下三个条件

1. $A \neq \emptyset, A \neq \mathbb{Q}$;
2. 当 $p \in A, p \in A^c$ 时， $p < q$;
3. 任给 $p \in A$ ，存在 $q \in A$ ，使得 $p < q$;

则称 A 为 \mathbb{Q} 的一个分割，分割的全体组成集合为 \mathbb{R} 。



第 2 章 数列极限

2.1 数列极限的概念

定义 2.1 (数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义)

设 $\{a_n\}$ 为数列, A 为定数。若对任给的正数 ε , 总存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 时有

$$|a_n - A| < \varepsilon$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A , 或称 A 为数列 $\{a_n\}$ 的极限, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \text{ 或 } a_n \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$$



等价定义: 任给 $\varepsilon > 0$, 若在 $U(A; \varepsilon)$ 之外数列 $\{a_n\}$ 中的项至多只有有限个, 则称 $\{a_n\}$ 收敛于极限 A 。

若对于数列 $\{a_n\}$, 不存在 A 使得 $a_n \rightarrow A$, 则称数列 $\{a_n\}$ 发散。

特殊地, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则称 $\{a_n\}$ 为无穷小数列。

定义 2.2 (无穷大数列)

若数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意正数 $M > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时,

(1) $a_n > M$, 则称数列 $\{a_n\}$ 发散于正无穷大, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 或 $a_n \rightarrow +\infty$ 。

(2) 有 $a_n < -M$, 则称数列 $\{a_n\}$ 发散于负无穷大, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, 或 $a_n \rightarrow -\infty$ 。



2.2 收敛数列的性质

定理 2.1 (唯一性)

若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则它只有一个极限。



证明 如果数列 $\{a_n\}$ 同时以 A, B 为极限, 即任给 $\varepsilon > 0$, 总存在 N_1, N_2 , 使得

$$|a_n - A| < \varepsilon, n > N_1; \quad |a_n - B| < \varepsilon, n > N_2$$

那么当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时需要恒成立

$$2\varepsilon > |a_n - A| + |a_n - B| \geq |A - B|$$

当 $A \neq B$ 时, 对于 $2\varepsilon < |A - B|$ 不恒成立, 因此只能 $A = B$ 。



定理 2.2 (有界性)

若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 有界。



证明 不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 。令 $\varepsilon = 1$, 那么存在 $N > N$ 使得

$$|a_n - A| \leq 1$$

令

$$M = \{|a_1|, \dots, |a_N|, |A-1|, |A+1|\}$$

那么对任意正整数 n , 总有 $|a_n| \leq M$ 。 □

定理 2.3 (保不等式性, 保序性)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 则有

(1) 如果存在 $n > N$ 使得 $a_n \geq b_n$ 恒成立, 则 $A \geq B$ 。

(2) 反之, 如果 $A > B$, 则存在 $n > N_1$ 使得 $a_n > b_n$ 恒成立。 ♡

证明 (1) 如果设 $B - A = 2\delta > 0$, 那么存在 $N_2, N_3 > N$

$$|a_n - A| < \delta, n > N_2; \quad |b_n - B| < \delta, n > N_3$$

于是当 $n > \max\{N_2, N_3\}$ 时有

$$a_n < A + \delta = B - \delta < b_n$$

因此矛盾, 故 $A \geq B$ 。

(2) 设 $A - B = 2\delta > 0$, 那么存在 N_2, N_3

$$|a_n - A| < \delta, n > N_2; \quad |b_n - B| < \delta, n > N_3$$

于是存在 $N_1 = \max\{N_2, N_3\}$, 当 $n > N_1$ 时有

$$a_n > A - \delta = B + \delta > b_n$$

□

若 b_n 是常数列, $A \neq 0$, 我们还可得到推论: 存在 N , 使得当 $n > N$ 时, 有

$$\frac{1}{2}|A| < |a_n| < \frac{3}{2}|A|$$

定理 2.4 (迫敛性, 夹逼定理)

设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足当 $n > N_0$ 有 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = A$ 。 ♡

证明 即对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1, N_2 , 使得当 $n > N_1$ 有

$$A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$$

当 $n > N_2$ 有

$$A - \varepsilon < c_n < A + \varepsilon$$

因此当 $n > \max\{N_0, N_1, N_2\}$ 时, 有

$$A - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < A + \varepsilon$$

□

定理 2.5 (四则运算)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$, 则有

(1) $\{\alpha a_n + \beta b_n\}$ 收敛到 $\alpha A + \beta B$, 其中 α, β 为常数。

(2) $\{a_n b_n\}$ 收敛到 AB 。

(3) 当 $B \neq 0$ 时, $\{a_n/b_n\}$ 收敛到 A/B 。



证明 (1) 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1, N_2 使得

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2|\alpha| + 1}, n > N_1; \quad |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2|\beta| + 1}, n > N_2$$

则当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时有

$$\begin{aligned} |(\alpha a_n + \beta b_n) - (\alpha A + \beta B)| &\leq |\alpha||a_n - A| + |\beta||b_n - B| \\ &< \frac{\varepsilon|\alpha|}{2|\alpha| + 1} + \frac{\varepsilon|\beta|}{2|\beta| + 1} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

(2) 由收敛数列的有界性, 存在 M 使得 $|a_n| \leq M$, 那么

$$0 \leq |a_n b_n - AB| = |(a_n - A)b_n + A(b_n - B)| \leq M|a_n - A| + |A||b_n - B|$$

由迫敛性知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n b_n - AB| = 0$ 。

(3) 由保号性的推论, 存在 N 使得当 $n > N$ 时有 $|b_n| > \frac{|B|}{2}$, 那么

$$0 \leq \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|b_n - B|}{|b_n||B|} \leq \frac{2}{|B|^2} |b_n - B|$$

由迫敛性知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = 0$ 。

□

定义 2.3 (数列的子列)

设 $\{a_n\}$ 为数列, 如果 $\{n_k\}$ 是一列严格递增的正整数, 则数列 $\{a_{n_k}\}$ 称为数列 $\{a_n\}$ 的一个子列。



特殊的子列 $\{a_{2k}, a_{2k-1}\}$ 分别称为偶子列与奇子列。

定理 2.6

数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件: $\{a_n\}$ 的任何子列都收敛。

**2.3 数列极限存在的条件****定义 2.4**

若数列 $\{a_n\}$ 各项满足关系式 $a_n \leq a_{n+1} (a_n \geq a_{n+1})$, 则称 $\{a_n\}$ 为递增 (递减) 数列, 统称为单调数列。



定理 2.7 (单调有界定理)

单调有界数列必有极限。

**定理 2.8 (致密性定理)**

任何有界数列必定有收敛的子列。



2.4 柯西 (Cauchy) 准则

定义 2.5

设 $\{a_n\}$ 为数列, 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $N(\varepsilon)$ 使当 $m, n > N(\varepsilon)$ 时有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon$$

则称 $\{a_n\}$ 为 *Cauchy* 数列或基本列。

**定理 2.9**

Cauchy 数列必定时有界数列。



证明 取 $\varepsilon = 1$, 则存在 N 使得当 $m, n > N$ 时有

$$|a_m - a_n| < 1$$

令 $M = \max\{|a_k| + 1 \mid 1 \leq k \leq N + 1\}$, 则当 $n \leq N$ 时显然有 $|a_n| \leq M$, 而当 $n > N$ 时有

$$|a_n| \leq |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| < 1 + |a_{N+1}| \leq M$$

这说明 $\{a_n\}$ 是有界数列。

**定理 2.10 (Cauchy 收敛准则)**

$\{a_n\}$ 为 *Cauchy* 数列当且仅当它是收敛的。



证明 (1) 充分性: 设 $\{a_n\}$ 收敛到 A , 则任给 $\varepsilon > 0$ 存在 N , 当 $n > N$ 时有

$$|a_n - A| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

因此当 $m, n > N$ 时有

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - A| + |A - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

这说明 a_n 为 *Cauchy* 数列。

(2) 必要性: Todo ……



柯西收敛准则的条件称为柯西条件。

2.5 Stolz 公式

定理 2.11

对于任意的 $1 \leq k \leq n$, 设 $b_k > 0$ 且 $m \leq \frac{a_k}{b_k} \leq M$, 则有

$$m \leq \frac{\sum a_n}{\sum b_n} \leq M$$



定理 2.12 (Stolz 公式一)

设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$, 且 $\{y_n\}$ 严格单调地趋于 $+\infty$, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = A$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$$



证明 分类讨论 Todo……



定理 2.13 (Stolz 公式二)

设数列 $\{y_n\}$ 严格单调地趋于 0, 且数列 $\{x_n\}$ 也收敛到 0, 那么如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = A$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$$



证明 分类讨论 Todo……



2.6 例题

问题 2.1 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum a_n}{n} = A$ 。

解 即对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $n > N_1$ 使得

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

那么变形有

$$\left| \frac{\sum a_n}{n} - A \right| \leq \frac{\sum |a_n - A|}{n} = \frac{\sum_{k=1}^{N_1} |a_k - A|}{n} + \frac{\sum_{k=N_1+1}^n |a_k - A|}{n}$$

注意到 $\sum_{k=1}^{N_1} |a_k - A|$ 已经为定值, 从而存在 $n > N_2$ 使得

$$\frac{\sum_{k=1}^{N_1} |a_k - A|}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

因此当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时有

$$LHS < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{n - N_1}{n} \times \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

第3章 函数极限

3.1 函数极限的概念

定义 3.1

设 f 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的函数, A 为定数。若对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在正数 $M = M(\varepsilon) \geq a$, 使得当 $x > M$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

则称函数 f 当 x 趋于 $+\infty$ 时以 A 为极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \text{ 或 } f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$$



类似的有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 。

不难证明

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

定义 3.2

设函数 f 在 $U^\circ(x_0; \delta')$ 内有定义, A 为定数。若对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在正数 $\delta < \delta'$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称函数 f 当 x 趋于 x_0 时以 A 为极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ 或 } f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$$



定义 3.3

设函数 f 在 $U_+^\circ(x_0; \delta')$ 内有定义, A 为定数。若对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在正数 $\delta < \delta'$, 使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称函数 f 当 x 趋于 x_0^+ 时以 A 为极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A \text{ 或 } f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0^+)$$



类似的还有左极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, 统称为单侧极限。又可记为

$$f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ 与 } f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

同理还有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

3.2 函数极限的性质

定理 3.1 (唯一性)

若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则此极限是唯一的。



定理 3.2 (局部有界性)

若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 f 在 x_0 的某空心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有界。



定理 3.3 (保不等式性)

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 均存在。若存在正数 N_0 , 使得当 $n > N_0$ 时, 有 $a_n \leq b_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 。



定理 3.4 (迫敛性)

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 且在某 $U^\circ(x_0; \delta')$ 上有

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ 。



定理 3.5 (四则运算法则)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 均存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$



3.3 函数极限存在的条件

定理 3.6 (海涅 (Heine) 定理, 归结原则)

若 $f(x)$ 在 $U^\circ(x_0; \delta')$ 上有定义。 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件是: 任何含于 $U^\circ(x_0; \delta')$ 且以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\}$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在且相等。



即若对任何 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。

定理 3.7

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某空心右邻域 $U_+^\circ(x_0)$ 有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 的充要条件是: 对任何以

x_0 为极限的递减数列 $\{x_n\} \subset U_+(x_0)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 。

定理 3.8

设 $f(x)$ 为定义在 $U_+(x_0)$ 上的单调有界函数, 则右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 存在。

定理 3.9 (柯西准则)

设 $f(x)$ 在 $U^\circ(x_0; \delta')$ 上有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件是: 任给 $\varepsilon > 0$, 存在正数 $\delta (< \delta')$, 使得对任何 $x', x'' \in U^\circ(x_0, \delta)$, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$ 。

3.4 两个重要的极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

3.5 无穷小量与无穷大量

定义 3.4 (无穷小量)

设函数 f 在某 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称 f 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量。

定义 3.5 (有界量)

设函数 f 在某 $U^\circ(x_0)$ 上有界, 则称 f 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的有界量。

无穷小量收敛于 0 的速度有快有慢。设当 $x \rightarrow x_0$ 时, f 与 g 均为无穷小量。

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 为 g 的高阶无穷小量, 或称 g 为 f 的低阶无穷小量。

记作

$$f(x) = o(g(x)) (x \rightarrow x_0)$$

特别地, f 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量记作

$$f(x) = o(1) (x \rightarrow x_0)$$

若存在正数 K 和 L , 使得在某 $U^\circ(x_0)$ 上有

$$K \leq \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L$$

则称 f 与 g 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的同阶无穷小量。特别当

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$$

时, f 与 g 必为同阶无穷小量。

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ 则称 f 与 g 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的等价无穷小量。记作

$$f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$$

注意并不是任何两个无穷小量都可以进行这种阶的比较。例如 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sin \frac{1}{x}$ 和 x^2 都是无穷小量, 但它们的比都不是有界量。

定理 3.10

设函数 f, g, h 在 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, 且有 $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$, 则

1. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)h(x) = A$ 。

2. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{f(x)} = B$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{g(x)} = B$



定义 3.6 (无穷大量)

设函数 f 在某 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, 若对任给的 $G > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in U^\circ(x_0; \delta) \subset U^\circ(x_0)$ 时, 有 $|f(x)| > G$, 则称函数 f 当 $x \rightarrow x_0$ 时有非正常极限 ∞ , 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 。



3.6 常见等价无穷小

实际上这些等价无穷小就是泰勒展开。

$$\begin{aligned} \frac{x}{1-x} &= x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + O(x^6) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + O(x^6) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^7) \\ 1 - \cos x &= \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + O(x^6) \\ e^x - 1 &= x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + O(x^6) \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + O(x^7) \\ \sqrt{x+1} - 1 &= \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256} + O(x^6) \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + O(x^7) \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + O(x^7) \end{aligned}$$

第 4 章 函数的连续性

4.1 连续性的概念

定义 4.1 (连续性)

设函数 f 在某 $U(x_0)$ 上有定义。若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

则称 f 在点 x_0 连续。



记 $\Delta x = x - x_0$, 称为自变量 x 在点 x_0 的增量或改变量。设 $y_0 = f(x_0)$, 相应的函数 y 在点 x_0 的增量记为

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = y - y_0$$

连续性的 ε - δ 形式定义: 若对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 则称函数 f 在点 x_0 连续。

或者进一步表示为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} x\right)$$

定义 4.2

设函数 f 在某 $U_+(x_0)$ 上有定义。若

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

则称 f 在点 x_0 右连续。同理左连续。



因此函数 f 在点 x_0 连续的充要条件是: f 在点 x_0 既是左连续, 又是右连续。

定义 4.3 (间断点)

设函数 f 在某 $U^\circ(x_0)$ 上有定义。若 f 在点 x_0 无定义, 或 f 在点 x_0 有定义而不连续, 则称点 x_0 为函数 f 的间断点或不连续点。



若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 而 f 在点 x_0 无定义, 或有定义但 $f(x_0) \neq A$, 则称点 x_0 为 f 的可去间断点。

若函数 f 在点 x_0 的左、右极限都存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, 则称点 x_0 为函数 f 的跳跃间断点。

可去间断点与跳跃间断点统称为第一类间断点, 所有其他形式的间断点统称为第二类间断点。

若函数 f 在区间 I 上的每一点都连续, 则称 f 为 I 上的连续函数。对于闭区间或半开区间的端点, 函数在这些点上连续是指左连续或右连续。

4.2 连续函数的性质

定理 4.1 (局部有界性)

若函数 f 在点 x_0 连续, 则 f 在某 $U(x_0)$ 上有界。



定理 4.2 (局部保号性)

若函数 f 在点 x_0 连续, 且 $f(x_0) > 0$, 则对任何正数 $r < f(x_0)$, 存在某 $U(x_0)$, 使得对一切 $x \in U(x_0)$, 有 $f(x) > r$ 。



定理 4.3 (四则运算)

若函数 f, g 在点 x_0 连续, 则 $f \pm g, f \cdot g, f/g$ 也都在点 x_0 连续。



定理 4.4

若函数 f 在点 x_0 连续, g 在点 u_0 连续, $u_0 = f(x_0)$, 则复合函数 $g \circ f$ 在 x_0 连续。



定义 4.4

设 f 为定义在数集 D 上的函数。若存在 $x_0 \in D$, 使得对一切 $x \in D$, 有 $f(x_0) \geq f(x)$, 则称 f 在 D 上有最大值, 并称 $f(x_0)$ 为 f 在 D 上的最大值。



定理 4.5 (最大、最小值定理)

若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有最大值与最小值。



定理 4.6 (介值定理)

若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$ 。若 μ 为介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任何实数。则至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x_0) = \mu$ 。



定理 4.7

若函数 f 在 $[a, b]$ 上严格单调并连续, 则反函数 f^{-1} 在其定义域 $[\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}]$ 上连续。



定义 4.5

设 f 是定义在区间 I 上的函数。若对任给的 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ 使得对任何 $x', x'' \in I$, 只要 $|x' - x''| < \delta$ 就有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

就称函数 f 在区间 I 上一致连续。



定理 4.8 (一致连续性)

若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续。



4.3 初等函数的连续性

定理 4.9

设 $p > 0$, a, b 为任意两个实数, 则有

$$p^a \cdot p^b = p^{a+b}, (p^a)^b = p^{ab}$$



定理 4.10

指数函数 $a^x (a > 0)$ 在 \mathbb{R} 上是连续的。



第 5 章 导数和微分

5.1 导数的定义

定义 5.1

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域有定义, 若极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在, 则称函数 f 在点 x_0 可导, 并称该极限为函数 f 在点 x_0 的导数, 记作 $f'(x_0)$ 。



定理 5.1

若函数 f 在点 x_0 可导, 则 f 在点 x_0 连续。



定义 5.2

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某右邻域 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上有定义, 若右极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, (0 < \Delta x < \delta)$$

存在, 则称该极限值为 f 在点 x_0 的右导数, 记作 $f'_+(x_0)$ 。同理有左导数。



左导数和右导数统称为单侧导数。

定理 5.2

若函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域上有定义, 则 $f'(x_0)$ 存在的充要条件是 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。



若函数 f 在区间 I 上每一点都可导 (对区间端点, 仅考虑相应的单侧导数), 则称 f 为 I 上的可导函数。此时对每一个 $x \in I$, 都有 f 的一个导数 $f'(x)$ (或单侧导数) 与之对应。

这样就定义了一个在 I 上的函数, 称为导函数, 简称为导数。记作 $f', y', \frac{dy}{dx}$, 即

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}, x \in I$$

有时 $f'(x_0)$ 也可写作 $y'|_{x=x_0}$ 或 $\frac{dy}{dx}|_{x=x_0}$ 。

曲线 $y = f(x)$ 在点 (x_0, y_0) 的切线方程是

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

定义 5.3

若函数 f 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 上对一切 $x \in U(x_0)$ 有

$$f(x_0) \geq f(x)$$

则称 f 在点 x_0 取得极大值, 称点 x_0 为极大值点。同理有极小值点。



极大值、极小值统称为极值，极大值点、极小值点统称为极值点。

定理 5.3 (费马定理)

设函数 f 在点 x_0 的某邻域上有定义，且在点 x_0 可导。若点 x_0 为极值点，则必有 $f'(x_0) = 0$ 。

5.2 求导法则

定理 5.4

若函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在点 x_0 可导，则函数 $f(x) = u(x) \pm v(x)$ 在点 x_0 也可导，且

$$f'(x_0) = u'(x_0) \pm v'(x_0)$$

函数 $f(x) = u(x)v(x)$ 在点 x_0 也可导，且

$$f'(x_0) = u'(x_0)v'(x_0)$$

若 $v(x) \neq 0$ ，则函数 $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ 在点 x_0 也可导，且

$$f'(x_0) = \frac{u'(x_0)v(x_0) - u(x_0)v'(x_0)}{v(x_0)^2}$$

定理 5.5

设 $y = f(x)$ 为 $x = \phi(y)$ 的反函数，若 $\phi(y)$ 在点 y_0 的某邻域上连续、严格单调且 $\phi'(y_0) \neq 0$ ，则 $f(x)$ 在点 $x_0 = \phi(y_0)$ 可导，且

$$f'(x_0) = \frac{1}{\phi'(y_0)}$$

定理 5.6

设 $u = \phi(x)$ 在点 x_0 可导， $y = f(u)$ 在点 $u_0 = \phi(x_0)$ 可导，则复合函数 $f \circ \phi$ 在点 x_0 可导，且

$$(f \circ \phi)'(x_0) = f'(u_0)\phi'(x_0) = f'(\phi(x_0))\phi'(x_0)$$

5.2.1 基本求导法则

1. $(u \pm v)' = u' \pm v'$
2. $(uv)' = u'v + uv'$
3. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
4. $(u \pm v)' = u' \pm v'$

5.2.2 基本初等函数导数公式

1. $(c)' = 0$ (c 为常数)
2. $(x^a)' = ax^{a-1}$ (a 为任意实数)
3. $(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x, (\tan x)' = \sec^2 x$
4. $(\cot x)' = -\csc^2 x, (\sec x)' = \sec x \tan x, (\csc x)' = -\csc x \cot x$

5. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
 6. $(a^x)' = a^x \ln a (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$
 7. $(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a} (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$

5.3 单调性与导数

定理 5.7

设 f 在区间 I 上可导, 则 $f(x)$ 在 I 上递增 (减) 的充要条件时

$$f'(x) \geq 0 (\leq 0)$$



定理 5.8 (介值定理)

设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数, μ 时严格介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的数, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \mu$ 。



第 6 章 微分中值定理

6.1 拉格朗日定理

定理 6.1 (罗尔 (Rolle) 中值定理)

若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 且 $f(a) = f(b)$ 。则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

定理 6.2

若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

拉格朗日公式还有下面几种等价形式

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), a < \xi < b$$

$$f(b) - f(a) = f'(a + \theta(b - a))(b - a), 0 < \theta < 1$$

$$f(a + h) - f(a) = f'(a + \theta h)h, 0 < \theta < 1$$

6.2 柯西中值定理

定理 6.3

设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 且 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

6.3 凹凸性

定义 6.1

设 f 为定义在区间 I 上的函数, 若对 I 上当任意两点 x_1, x_2 和任意实数 $\lambda \in (0, 1)$ 总有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

则称 f 为 I 上的凸函数。反之, 如果总有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

则称 f 为 I 上的凹函数。