居家力量与平衡训练表

55岁女性 · 踝部骨折一年后无痛 · 有骨质疏松史 · 前4周起步版

每周2次力量

开始条件：骨折已获医生允许正常负重；没有椎体压缩骨折或近期不明原因腰背痛。
骨质疏松程度尚不明确，先轻量练习；如不满足上述条件，先由骨科或康复师调整。


周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
力量① ~ ⑦	步行 + 平衡	轻松活动	力量① ~ ⑦	步行 + 平衡	步行 + 平衡	休息 / 散步

第1周：每个力量动作只做1组。第2周起，无新增不适再按卡片组数练。

每组休息60 ~ 90秒 | 用力呼气，回程吸气 | 每组结束仍能标准地多做约3次

01 椅子坐站

6 ~ 10次 × 2组




椅子靠墙，徒手慢起慢坐。
脚跟不抬，不偏向健侧。

需要时扶稳固支撑

02 坐姿弹力带划船

10 ~ 12次 × 2组




带固定在下胸高度，肘向后拉。
背自然直立，不含胸猛拽。

先检查肋木和固定点

03 墙壁俯卧撑

6 ~ 10次 × 2组




身体整体靠近墙，再推回。
先站近些，双脚保持稳定。

踝部牵拉痛则停做

04 扶肋木侧抬腿

每侧8 ~ 12次 × 2组




扶稳，小幅抬腿，脚尖朝前。
身体不侧倒，先不加弹力带。

支撑脚踝不适则停做

05 坐姿轻哑铃推举

8 ~ 10次 × 1 ~ 2组




坐稳，向上推至舒适高度。
不耸肩、不挺腰、不憋气。

肩不适可改坐姿弯举

06 扶肋木双脚提踵

6 ~ 10次 × 1 ~ 2组




扶稳，两脚同时慢踮起、放下。
脚踝不向内外歪，不弹震。

不适改坐姿、不负重提踵

07 坐姿抗旋转推手

每侧6 ~ 8次 × 1 ~ 2组




带从侧方胸高处拉来，轻阻力。
双手向前推停2秒，躯干不转。

换侧做；图为斜侧面示意

08 扶肋木并脚站

20秒 × 2次




双脚并拢，睁眼站稳。
手始终可扶到肋木，不闭眼。

平衡练习：每次3 ~ 5分钟

09 扶肋木前后脚站

20秒 × 2次，再交换前后脚



一脚前移半步，左右留间距。
睁眼扶稳；熟练后减少手扶。

前后脚各做两轮

热身、步行与进阶

热身5分钟：轻松走、肩绕环、屈伸肘、坐姿勾绷脚。
步行10 ~ 20分钟，可拆成每次5 ~ 10分钟，选择平地。
第1周1组；第2周无新增不适，再增加到卡片组数。
第3 ~ 4周先加次数；连续两次轻松完成、次日正常，
才加最小一档重量或阻力，次数退回下限。一次只加一项。

保护脚踝与骨骼

先不做跳跃、壶铃摆荡、卷腹、负重扭腰或弓背搬重物。
出现踝痛、明显不稳，或次日新肿胀、跛行：停诱发动作。
持续不缓解应复诊；突然明显腰背痛，应停练并评估。
椅子无轮且靠墙；穿防滑鞋；弹力带完好、固定牢靠。
带骨密度报告复诊，明确程度及是否需要治疗。

第　周打卡　☐ 力量1　☐ 力量2　☐ 步行　☐ 步行　☐ 步行　☐ 平衡　☐ 平衡

依据：NHS家庭力量练习、BHOF骨质疏松运动及安全姿势建议。图为动作要点简图；箭头表示动作方向。