

ដំណោះស្រាយគណិតវិទ្យា QCM ប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់វិស្វករសាលាតិបណ្ឌ ២០១៧

ធ្វើដំណោះស្រាយដោយ ស៊ី សំអុន ធីស្សិតថ្នាក់វិស្វករសាលាតិបណ្ឌ

∴ ∴ ∴
∴

១. គេឲ្យ E ជាសំណុំឫសទាំងអស់នៃសមីការ $x^2 + 5x + 6 = 0$ ។
- (ក) $E = \{-2\}$ (ខ) $E = \{-3\}$ (គ) $E = \{3, 2\}$ (ឃ) $E = \{3, -2\}$ (ង) $E = \{-3, -2\}$

ដំណោះស្រាយ

តាម Vieta's Theorem គេមាន $X^2 - SX + P = 0$ ដែល α និង β ជាឫសនៃសមីការនេះ គេបាន $\alpha + \beta = S$ និង $\alpha \cdot \beta = P$
ដើម្បី ឲ្យបានសមីការមានទម្រង់ $x^2 + 5x + 6 = 0$ លុះត្រាតែ ផលបូកឫស $\alpha + \beta = -5$ និង $\alpha \cdot \beta = 6$
∴ ចម្លើយ ង

សម្គាល់ យើងអាចដោះស្រាយតាមវិធីផ្សេងទៀតក៏បាន តែខ្លះអាចនឹងចំណាយពេលច្រើន ។

២. សំណុំ I នៃឫសទាំងអស់របស់សមីការ $2^{2x} - 4 \geq 0$ គឺ
- (ក) $I = (-\infty; 1)$ (គ) $I = (1; \infty)$ (ង) ចម្លើយផ្សេង
(ខ) $I = [1; +\infty)$ (ឃ) $I = (-\infty; 1]$

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $2^{2x} - 4 \geq 0$ នោះ

$$2^{2x} \geq 2^2$$
$$\Leftrightarrow 2x \geq 2$$
$$\Rightarrow x \geq 1$$

∴ ចម្លើយ ខ

៣. ចូរគណនា $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x}-1}$ គឺ
- (ក) -3 (ខ) 3 (គ) 2 (ឃ) -2 (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1+x}-1)}{x}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+x} + 1 = 2$$

∴ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x}-1} = 2$

∴ ចម្លើយ គ

៤. តម្លៃនៃ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$ គឺ

(ក) 2

(ខ) 1

(គ) -2

(ឃ) 1

(ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{x^2} \quad \left(1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) \\ &= 2 (1)^2 = 2 \end{aligned}$$

∴ ចម្លើយ ក

៥. បើ $f'(x)$ ជាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x) = (x - 1)e^x$ នោះ

(ក) $f'(x) = e^x$

(គ) $f'(x) = (x - 1)$

(ង) $f'(x) = xe^x$

(ខ) $f'(x) = (x - 1)e^x$

(ឃ) $f'(x) = 2xe^x$

ដំណោះស្រាយ

$$f(x) = (x - 1)e^x$$

$$f'(x) = (x - 1)'e^x + (e^x)'(x - 1)$$

$$\begin{aligned} \text{Hint : } (u(x) \cdot v(x))' &= u'(x)v(x) + v'(x)u(x) \\ &= xe^x \end{aligned}$$

∴ ចម្លើយ ង

៦. យក $f(x) = 3 \sin(2x + 3)$ ជាអនុគមន៍ និង $f'(x)$ ជាដេរីវេនៃ $f(x)$ ។ គេបាន

(ក) $f'(x) = 2 \cos(2x + 3)$

(គ) $f'(x) = 3 \cos(2x + 3)$

(ង) ចម្លើយផ្សេង

(ខ) $f'(x) = 6 \cos(2x + 3)$

(ឃ) $f'(x) = 6 \sin(2x + 3)$

ដំណោះស្រាយ

$$f(x) = 3 \sin(2x + 3)$$

$$f'(x) = 3(2x + 3)' \cos(2x + 3)$$

$$\begin{aligned} \text{Hint : } (\sin u(x))' &= u'(x) \cos u(x) \\ &= 6 \cos(2x + 3) \end{aligned}$$

∴ ចម្លើយ ខ

៧. គេយក r ជាម៉ូឌុល និង θ ជាអាកុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z = 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i$ គេបាន

- (ក) $r = 4, \theta = \frac{3\pi}{4}$
- (គ) $r = 4, \theta = -\frac{3\pi}{4}$
- (ង) ចម្លើយផ្សេង
- (ខ) $r = 4, \theta = \frac{\pi}{4}$
- (ឃ) $r = 4, \theta = -\frac{\pi}{4}$

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $z = 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i$ នោះ $z = 4 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = 4 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right]$
 $\Rightarrow r = 4, \theta = -\frac{\pi}{4}$
 \therefore ចម្លើយ ឃ

៨. ចូរគណនា $\int_0^1 (6\sqrt{x} + 6x) \, dx$ ស្មើនឹង

- (ក) 7
- (ខ) -7
- (គ) $\frac{7}{6}$
- (ឃ) $-\frac{7}{6}$
- (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $\int_0^1 (6\sqrt{x} + 6x) \, dx$

$$= 4\sqrt{x^3} + 3x^2 \Big|_0^1$$

$$\int_0^1 (6\sqrt{x} + 6x) \, dx = 4 \left(\sqrt{1^3} \right) + 3(1)^2 - 0 = 7$$

\therefore ចម្លើយ ក

៩. បើ $f(x) = \int 4xe^{x^2} \, dx$ នោះ

- (ក) $f(x) = 4e^{x^2} + c$
- (គ) $f(x) = 2e^{x^2} + c$
- (ង) ចម្លើយផ្សេង
- (ខ) $f(x) = e^{x^2} + c$
- (ឃ) $f(x) = 4xe^{x^2} + c$

ដំណោះស្រាយ

ដែល $f(x) = \int 4xe^{x^2} \, dx = 2 \int 2xe^{x^2} \, dx$ តាង $t = x^2 \Rightarrow dt = 2x \, dx$

នោះ $f(x) = 2 \int e^t \, dt = 2e^t + c$

$$\Rightarrow f(x) = \int 4xe^{x^2} \, dx = 2e^{x^2} + c$$

\therefore ចម្លើយ គ

១០. កន្សោម $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$ ស្មើនឹង

(ក) $S_n = 2(1 - 2^{-n})$

(គ) $S_n = \frac{1 - 2^n}{2}$

(ង) ចម្លើយផ្សេង

(ខ) $S_n = \frac{2^n - 1}{2}$

(ឃ) $S_n = 2(2^n - 1)$

ដំណោះស្រាយ

តាម $S_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$ ដែល $q = \frac{1}{2}$ ចំពោះ $0 < q < 1$

$$\Rightarrow S_n = 1 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - (2)^{-n}}{\frac{1}{2}}$$

$$S_n = 2(1 - 2^{-n})$$

\therefore ចម្លើយ ក

១១. ក្នុងចំណោមអនុគមន៍ខាងក្រោម តើអនុគមន៍មួយណាមិនមែនជាអនុគមន៍ខួប?

(ក) $f_1(x) = \frac{8 - \cos(\sqrt{2}x)}{4 + \cos(\sqrt{2}x)}$

(ខ) $f_5(x) = \frac{\cos(5x) - \cos(3x)}{4 + \cos(7x) + \cos(2x)}$

(ឃ) $f_4(x) = \frac{8 - \cos(3x)}{4 + \cos(2x)}$

(គ) $f_2(x) = \frac{8 - 3\cos(\pi x)}{4 + \cos(3\pi x)}$

(ង) $f_3(x) = \frac{5 + \cos(3\pi x)}{4 + 3\cos(3x)}$

ដំណោះស្រាយ

\therefore ចម្លើយ ង

១២. គេឲ្យ \vec{a} និង \vec{b} ជាវ៉ិចទ័រពីក្នុងលំហដែល $\|\vec{a}\| = 3, \|\vec{b}\| = 4$ និង $\|\vec{a} - \vec{b}\| = \sqrt{43}$ ។ ចូរកត់មូលេខនៃ $\|2\vec{a} + \vec{b}\|$ ។

(ក) 5

(ខ) 6

(គ) 7

(ឃ) 8

(ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $\|\vec{a} - \vec{b}\| = \sqrt{43} \Leftrightarrow \|\vec{a} - \vec{b}\|^2 = \sqrt{43}^2$

$$\|\vec{a} - \vec{b}\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$\sqrt{43}^2 = 3^2 + 4^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = -9$$

និង $\|2\vec{a} + \vec{b}\|^2$

$$\|2\vec{a} + \vec{b}\|^2 = 4\|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$= 4 \cdot 3^2 + 4^2 + 4(-9) = 4^2$$

$$\Rightarrow \|2\vec{a} + \vec{b}\| = \sqrt{4^2} = 4$$

\therefore ចម្លើយ ង

១៣. គេឲ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{a} = (1, 1, 1)$, $\vec{b} = (1, -2, -1)$, $\vec{c} = (-1, -2, 1)$ ។ ចូរកមាឌ V នៃតេត្រាអែតដែលកំណត់ដោយវ៉ិចទ័រទាំងបីនេះ ។

- (ក) $V = 4$
- (ខ) $V = \frac{4}{3}$
- (គ) $V = 8$
- (ឃ) $V = \frac{8}{3}$
- (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

មាឌតេត្រាអែត $V = \frac{1}{6} (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \frac{1}{6} |-8| = \frac{4}{3}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= (-2 - 2) - (1 - 1) + (-2 - 2) = -8 \end{aligned}$$

∴ ចម្លើយ ខ

១៤. គេយក a, b ជាប្រវែងជ្រុងជាប់នឹងមុំកែង និង c ជាប្រវែងអ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណកែងមួយ។ បើ a កើនឡើងដោយអត្រា 5cm/s នៅពេល $a = 4\text{cm}$ និង b កើនឡើងដោយអត្រា 10cm/s នៅពេល $b = 3\text{cm}$ ចូរកមាត្រាកំណើននៃបរិមាត្រត្រីកោណនេះ ។

- (ក) 20cm/s
- (ខ) 10cm/s
- (គ) 15cm/s
- (ឃ) 25cm/s
- (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $c^2 = a^2 + b^2$ (ពីតាគីរ) និង $p = a + b + c$ (បរិមាត្រ)
គេបាន $2cdc = 2ada + 2bdb$ និង $dp = da + db + dc$
$$dc = \frac{ada + bdb}{c} = \frac{ada + bdb}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$
$$dc = \frac{4 \cdot 5 + 3 \cdot 10}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 10\text{cm/s}$$
$$\Rightarrow dp = 5\text{cm/s} + 10\text{cm/s} + 10\text{cm/s} = 25\text{cm/s}$$

∴ ចម្លើយ ឃ

១៥. ចូរគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $f(x) = x^{x^{2017}}$ ។

- (ក) $x^{x^{2017}} (2017 \ln(x) + 1)$
- (ខ) $x^{x^{2017} + 2016} (2016 \ln(x) + 1)$
- (គ) $x^{x^{2017} + 2016} (2017 \ln(x) + 1)$
- (ឃ) $x^{x^{2017} + 2016} (2017 \ln(x) - 1)$
- (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

$$f(x) = x^{x^{2017}}$$
$$\ln f(x) = x^{2017} \ln x$$
$$\frac{f'(x)}{f(x)} = 2017x^{2016} \ln x + x^{2016}$$
$$f'(x) = f(x)x^{2016} (2017\ln x + 1)$$
$$f'(x) = x^{x^{2017}} x^{2016} (2017\ln x + 1)$$
$$\Rightarrow f'(x) = x^{x^{2017}+2016} (2017\ln x + 1)$$

\therefore ចម្លើយ គ

១៦. តម្លៃនៃ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x^{x^{2017}}\right)$ គឺ៖
- (ក) 1

(ខ) 2

(គ) e

(ឃ) e^{-1}

(ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x^{x^{2017}}\right) = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(x^{x^{2017}}\right)}$$
$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2017} \ln x}$$
$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^{2017}}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dx} (\ln x)}{\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^{2017}}\right)}}$$
$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{2017}{x^{2018}}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{2017}}{-2017}}$$
$$= e^0 = 1$$

\therefore ចម្លើយ ក

១៧. គេយក $a_{n+1} = \sqrt[3]{6 + a_n}$ និង $a_0 = 0$ ។ ចូរកលីមីត A នៃស្លឹក a_n ។
- (ក) $A = 3$

(ខ) $A = 2$

(គ) $A = 1$

(ឃ) $A = 0$

(ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

តាង $A > 0$ ជាលីមីតរបស់ស្លឹក a_n

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1} = A \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{6 + a_n} \\ A &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{6 + A} \\ A^3 &= 6 + A \\ A^3 - A - 6 &= 0 \Rightarrow A = 2 \\ \therefore \text{ចម្លើយ ខ}\end{aligned}$$

១៨. គេយក $f(x) = x^3 - 3x + m + 2$ ដែល m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ ចូរកំណត់តម្លៃទាំងអស់នៃ m ដើម្បីឲ្យខ្សែកោងតាងអនុគមន៍នេះកាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីស បាន៣ចំណុចខុសគ្នា។

(ក) $m < -8$ (ខ) $-8 \leq m < -4$ (គ) $-4 < m < 0$ (ឃ) $-4 \leq m \leq 0$ (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

$$\begin{aligned}\text{គេមាន } f(x) &= x^3 - 3x + m + 2 \\ f'(x) &= 3x^2 - 3 \\ f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \\ &\Rightarrow x = \pm 1 \\ \text{ដើម្បីឲ្យអនុគមន៍នេះកាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីសបាន៣ចំណុចខុសគ្នា លុះត្រាតែ } f(-1)f(1) &< 0 \\ \text{គេបាន } (-1 + 3 + m + 2)(1 - 3 + m + 2) &< 0 \\ (m + 4)(m) &< 0 \\ \Rightarrow m > -4 \text{ និង } m < 0 \text{ ឬ } -4 < m < 0 \\ \therefore \text{ចម្លើយ គ}\end{aligned}$$

១៩. គេមាន $f(x)$ ជាអនុគមន៍ កំណត់បាន និងមានរាំងតេក្រាលលើចន្លោះបិទ $[0; \pi]$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $f(\pi - x) = f(x)$ និង $I = \int_0^\pi xf(x)dx$ ។ គេបាន

(ក) $I = \frac{\pi}{3} \int_0^\pi f(x)dx$ (ខ) $I = \int_0^\pi f(x)dx$ (គ) $I = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(x)dx$ (ឃ) $I = \frac{\pi}{4} \int_0^\pi f(x)dx$ (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

២០. គេយក x_1, x_2 ជាឫសពីរនៃមីការ $x^2 - (3 \sin t - \cos t)x - 8 \cos^2 t = 0$ និង $G = x_1^2 + x_2^2$ ។ ចូរកតតម្លៃតូចជាងគេ G_{\min} និងតម្លៃ ធំជាងគេ G_{\max} នៃកន្សោម G ។

(ក) $G_{\min} = 6, G_{\max} = 16$ (គ) $G_{\min} = 2, G_{\max} = 4$ (ង) ចម្លើយផ្សេង

(ខ) $G_{\min} = 6, G_{\max} = 19$ (ឃ) $G_{\min} = 8, G_{\max} = 18$

ដំណោះស្រាយ

ប្រើ Vieta's Theorem នោះ $x_1 + x_1 = -\frac{b}{a} = (3 \sin t - \cos t)$ និង $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = -8 \cos^2 t$
យើងមាន $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 &= (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 \\ &= (3 \sin t - \cos t)^2 - 2(-8 \cos^2 t) \\ &= (3 \sin t - \cos t)^2 + 16 \cos^2 t \\ &= 9 \sin^2 t - 6 \sin t \cos t + 17 \cos^2 t \\ &= (3 \cos t - \sin t)^2 + 8 (\sin^2 t + \cos^2 t) \\ &= (3 \cos t - \sin t)^2 + 8 (*) \end{aligned}$$

ប្រើ Cauchy – Schwarz ដែល $\forall a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, និង $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$
សមភាពនេះកើតមានពេល $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$
នោះ $(3 \cos t - \sin t)^2 \leq (3^2 + (-1)^2) (\sin^2 t + \cos^2 t)$
 $(3 \cos t - \sin t)^2 \leq 10 (**)$
តាម (*) និង (**)
គេបាន $(3 \cos t - \sin t)^2 \leq 10 + 8$
 $\Rightarrow (3 \cos t - \sin t)^2 \leq 18$
គេបានតម្លៃធំបំផុត គឺ $G_{\max} = 18$ និង តម្លៃតូចបំផុត គឺ $G_{\min} = 8$
បញ្ជីយ យ

២១. គេឲ្យ f ជាអនុគមន៍កំណត់បាន និងមានអាំងតេក្រាលលើចន្លោះ $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ ។ ចូរគណនារកតម្លៃនៃ $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\cos x)}{f(\cos x) + f(\sin x)} dx$ ។

- (ក) $I = \frac{\pi}{3}$
- (ខ) $I = \frac{2\pi}{3}$
- (គ) $I = \frac{\pi}{2}$
- (ឃ) $I = \frac{\pi}{4}$
- (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

$$\begin{aligned} \text{ដោយ } I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\cos x)}{f(\cos x) + f(\sin x)} dx \quad (i) \\ \text{នោះ } I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right]}{f\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right] + f\left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right]} dx \\ &\Rightarrow I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin x)}{f(\sin x) + f(\cos x)} dx \quad (ii) \\ &\text{គេបាន } (i) + (ii) \\ 2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{4}$$

ចម្លើយ ឃ

២២. ផលបូកនៃលេខខ្ទង់រាយ និងលេខខ្ទង់ដប់នៃ 2018^{2017} គឺ

- (ក) 13 (ខ) 14 (គ) 5 (ឃ) 6 (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

យើងអាចធ្វើ តាម $2018^{2017} \equiv 68 \pmod{100}$
 ផលបូកនៃលេខខ្ទង់រាយ និងលេខខ្ទង់ដប់នៃ 2018^{2017} គឺ $6 + 8 = 14$
 \therefore **ចម្លើយ ខ**

២៣. យក λ ជាមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ (L_λ) ដែលកាត់តាមចំណុច $P(-1; 2)$ ។ (C) ជាខ្សែកោងតាងសមីការ $y = x^2$ និង A_λ ជាក្រឡាផ្ទៃនៃដែនប្លង់ដែលខណ្ឌដោយ (L_λ) និង (C) ។ តម្លៃនៃ λ ដែលនាំឲ្យ A_λ មានកម្លាំងតូចជាងគេគឺ

- (ក) $\lambda = 2$ (ខ) $\lambda = -2$ (គ) $\lambda = 3$ (ឃ) $\lambda = -3$ (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

២៤. ចូររកតម្លៃលេខនៃ $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ ។

- (ក) $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{\sqrt{5}-1}}{2}$ (ខ) $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{\sqrt{5}+1}}{2}$ (ឃ) $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$
 (គ) $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

$$\begin{aligned} \text{តាង } \theta &= \frac{\pi}{5}, \quad 0 < \cos \theta < 1 \\ 5\theta &= \pi \\ 3\theta &= \pi - 2\theta \\ \sin 3\theta &= \sin(\pi - 2\theta) \\ 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta (3 - 4 \sin^2 \theta) &= 2 \sin \theta \cos \theta \\ 3 - 4(1 - \cos^2 \theta) &= 2 \cos \theta \\ 4 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta - 1 &= 0 \\ \Rightarrow \cos \theta &= \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \end{aligned}$$

ចម្លើយ គ

២៥. តាង $E = a + a^2 + a^4$ និង $F = a^3 + a^5 + a^6$ ដែល $a = \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right)$ និង $i^2 = -1$ ។

(ក) $\left(E = \frac{2 + i\sqrt{7}}{2}, F = \frac{2 - i\sqrt{7}}{2}\right)$

(គ) $\left(E = \frac{-1 + i\sqrt{7}}{2}, F = \frac{-1 - i\sqrt{7}}{2}\right)$

(ខ) $\left(E = \frac{1 + i\sqrt{7}}{2}, F = \frac{1 - i\sqrt{7}}{2}\right)$

(ឃ) $\left(E = \frac{-2 + i\sqrt{7}}{2}, F = \frac{-2 - i\sqrt{7}}{2}\right)$

(ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

យើងមាន $E = a + a^2 + a^4$ និង $F = a^3 + a^5 + a^6$ នោះ

$$E + F = 1 + a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5 + a^6 - 1 = \frac{a^7 - 1}{a - 1} - 1$$

$$a^7 = \cos\left[\left(\frac{2\pi}{7}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right)\right]^7$$

$$= \cos(2\pi) + i \sin(2\pi) = 1$$

$$\Rightarrow E + F = \frac{1 - 1}{a - 1} - 1 = -1$$

ពិនិត្យ៖ មានតែចម្លើយ (គ) តែមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $E + F = \frac{-1 + i\sqrt{7}}{2} + \frac{-1 - i\sqrt{7}}{2} = -1$

\therefore ចម្លើយ គ

២៦. យក x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 ជាចំនួនពិតដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 = 4$ ។

ចូរកតម្លៃតូចជាងគេ F_{\min} និងតម្លៃធំជាងគេ F_{\max} នៃកន្សោម $F = \sqrt{6}x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5$ ។

(ក) $F_{\min} = -16, F_{\max} = 16$

(គ) $F_{\min} = -4, F_{\max} = 4$

(ង) ចម្លើយផ្សេង

(ខ) $F_{\min} = -6, F_{\max} = 6$

(ឃ) $F_{\min} = -12, F_{\max} = 12$

ដំណោះស្រាយ

គេមាន $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 = 4$ និង $F = \sqrt{6}x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5$

ដោយប្រើ Cauchy – Schwarz ដែល $\forall a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ និង $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

$$\text{សមភាពនេះកើតមានពេល } \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$$

$$(\sqrt{6}x_1 - 4x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5)^2 \leq \left((\sqrt{6})^2 + (-4)^2 + 3^2 + (-2)^2 + 1^2\right)(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2)$$

$$F^2 \leq (36)(4)$$

$$F \leq \sqrt{36 \times 4} = \pm 12$$

\therefore ចម្លើយ ឃ

២៧. គេមាន $E_n = \frac{20}{(5-4)(5^2-4^2)} + \frac{20^2}{(5^2-4^2)(5^3-4^3)} + \dots + \frac{20^n}{(5^n-4^n)(5^{n+1}-4^{n+1})}$ និង $E = \lim_{n \rightarrow +\infty} E_n$ ។ គេបាន
- (ក) $E = 5$ (ខ) 4 (គ) 3 (ឃ) 2 (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

លំហាត់ អាចមើលដោយ ចំណាំបាន គឺ **បន្លឺយ ខ** គឺ $E = \lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = 4$

$$\begin{aligned} \frac{20^k}{(5^k-4^k)(5^{k+1}-4^{k+1})} &= \frac{a_k}{5^k-4^k} - \frac{a_{k+1}}{5^{k+1}-4^{k+1}} \\ &= \frac{a_k(5^{k+1}-4^{k+1})}{5^k-4^k} - \frac{a_{k+1}(5^k-4^k)}{5^{k+1}-4^{k+1}} \\ &= \frac{5^k(5a_k-a_{k+1})-4^k(a_{k+1}-4a_k)}{(5^k-4^k)(5^{k+1}-4^{k+1})} \end{aligned}$$

$$5^k(5a_k-a_{k+1})-4^k(a_{k+1}-4a_k)=4^k \cdot 5^k$$

$$\begin{aligned} \begin{cases} 5a_k-a_{k+1}=0 \\ a_{k+1}-4a_k=5^k \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a_{k+1}=5a_k \\ a_{k+1}-4a_k=5^k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{k+1}=5^{k+1} \\ a_k=5^k \end{cases} \\ \sum_{k=1}^n \frac{20^k}{(5^k-4^k)(5^{k+1}-4^{k+1})} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{5^k}{5^k-4^k} - \frac{5^{k+1}}{5^{k+1}-4^{k+1}} \right) \\ &= \frac{5}{5-4} - \frac{5^{n+1}}{5^{n+1}-4^{n+1}} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} E_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{5-4} - \frac{5^{n+1}}{5^{n+1}-4^{n+1}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(5 - \frac{1}{1-\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}} \right) \\ &= 5-1=4 \end{aligned}$$

\therefore **បន្លឺយ ខ**

២៨. យក a_1, a_2, \dots, a_m ជាចំនួនគត់ធំជាងសូន្យដែលខុសគ្នាពីរៗ និងមានតួចែកបឋមតូចជាង 5 ។ បើ $F_m = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_m}$ គេបាន
- (ក) $F_m < 3$ (ខ) $8 < F_m < 12$ (គ) $3 \leq F_m \leq 8$ (ឃ) $12 \leq F_m < 20$ (ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

a_m មានតួចែកបឋម តូចជាង 5 នោះគេបាន a_m មានទម្រង់ $2^x \cdot 3^y$ ដែល $x, y \geq 0$ ជាចំនួនគត់

F_m មានតម្លៃអតិបរមា កាលណា ផលបូករាយ គ្រប់តម្លៃនៃ x, y ពីតូចទៅដល់ធំ ។

ហើយ $F_m < F_\infty, \forall m \in \mathbb{N}$

យើងបាន $F_m < \sum_{x=0}^\infty \sum_{y=0}^\infty \frac{1}{2^x \cdot 3^y} = \left(\sum_{x=0}^\infty \frac{1}{2^x} \right) \left(\sum_{y=0}^\infty \frac{1}{3^y} \right)$

$$F_m < \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = 2 \cdot \frac{3}{2}$$
$$\Rightarrow F_m < 3$$

\therefore ចម្លើយ ក

២៩. គេឲ្យ f ជាអនុគមន៍មានដេរីវេគ្រប់លំដាប់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $f(y) - f(x) = (y - x) f' \left(\frac{x + y}{2} \right)$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x និង y ។ នោះគេបាន
- (ក) $f(x) = \frac{ax + b}{x^2 + 2}$

(គ) $f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + 9}$

(ឃ) $f(x) = x^6 + ax^4 + b$
- (ខ) $f(x) = ax^2 + bx + c$

(ង) ចម្លើយផ្សេង

ដំណោះស្រាយ

៣០. រកក្រឡាផ្ទៃនៃដែនប្លង់ដែលខណ្ឌដោយក្រាបតាង $x = 0, x = \frac{\pi}{2}, y = 0$ និង $y = \frac{\cos x}{\sin^6 x + 1}$ ។
- (ក) $\frac{\sqrt{3} \ln (2 + \sqrt{3}) + \pi}{8}$

(គ) $\frac{\sqrt{3} \ln (2 - \sqrt{3}) + \pi}{6}$

(ង) ចម្លើយផ្សេង
- (ខ) $\frac{\sqrt{3} \ln (2 - \sqrt{3}) + \pi}{6}$

(ឃ) $\frac{\sqrt{3} \ln (2 + \sqrt{3}) + \pi}{6}$

ដំណោះស្រាយ

លំហាត់នេះបើធ្វើវែង ខ្ញុំ សូមធ្វើដំណោះស្រាយនៅពេលក្រោយ
ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ ចម្លើយ ឃ

ខ្ញុំមានបើកបច្ចៀនគូរសម្រាប់សិស្សឆ្នាក់ទី១២
បើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាច ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 096 9405 840

សូមអរគុណ

∴ ∴