



Devoir surveillé n° 1 (55 min)

Vous êtes invité·e·s à faire figurer sur votre copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, que vous aurez développée. La qualité de votre rédaction, la clarté et la précision de vos raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de votre copie.

Les élèves disposant d'un P.A.P. n'ont pas à traiter les questions marquées du symbole ★



Exercice n° 1 - Questions de cours

1. ★ Écrire la formule du crible.
2. Donner la formule des probabilités conditionnelles.
3. À quelle condition peut-on affirmer que deux événements A et B sont indépendants ?

Exercice n° 2 - Dans une urne

Dans une urne on place 50 boules numérotées de 1 à 50. On considère les événements suivants :

- A : « La boule tirée porte un numéro pair »
 - B : « La boule tirée porte un numéro qui est un multiple de 5 »
 - C : « La boule tirée porte un numéro supérieur ou égal à 30 »
1. Déterminer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(C)$
 2. ★ Décrire explicitement l'évènement $A \cap B$
 3. (a) En justifiant, déterminer la valeur de $\mathbb{P}(B \cap C)$
 (b) En déduire alors $\mathbb{P}_C(B)$
 (c) Peut-on affirmer que les événements B et C sont indépendants ?

Exercice n° 3 - État grippal

Lors d'une épidémie de grippe, on vaccine un tiers de la population. On constate qu'un malade sur dix est vacciné et que la grippe touche un quart de la population.

On choisit un individu au hasard dans la population et on considère les événements suivants :

- V : « L'individu est vacciné »
 - M : « L'individu est malade »
1. Grâce aux informations de l'énoncé et sans calcul, déterminer $\mathbb{P}(M)$, $\mathbb{P}(V)$ et $\mathbb{P}_M(V)$
 2. Les événements M et V sont-ils indépendants ?
 3. ★ Sur votre copie, construire un arbre pondéré permettant de représenter la situation et y placer, si possible, les probabilités de la question précédente.
 4. Calculer $\mathbb{P}(M \cap V)$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
 5. Dans cette question seulement, on suppose que l'individu choisi est vacciné.
 (a) Exprimer la probabilité que cet individu soit malade à l'aide des événements M et V .
 (b) Calculer alors la probabilité qu'un individu vacciné soit malgré tout malade.



Question bonus : Déterminer $\mathbb{P}(\overline{M} \cap V)$, puis $\mathbb{P}_{\overline{M}}(V)$

Exercice n° 4 - D'un tableau naît un arbre

On considère le tableau croisé d'effectifs suivant :

	A	$\bar{A}$	Total
B	80		
$\bar{B}$			140
Total	120		200

1. Compléter le tableau ci-dessus.
2. Déterminer la valeur de $\mathbb{P}_A(B)$ et de $\mathbb{P}_B(A)$ en explicitant vos calculs.
3. Compléter les deux arbres ci-après :



4. ★ Déterminer la valeur de $\mathbb{P}(A \cap B)$ - Point bonus si vous utilisez plusieurs méthodes

Exercice n° 5 - Q.C.M. (À points négatifs)

Pour chacune des questions suivantes, une et une seule des réponses proposées est exacte. Pour répondre, entourez sur la feuille la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Une réponse correcte rapporte des points. L'absence de réponse ne rapporte ni ne retire aucun point. Une réponse incorrecte ou une réponse multiple retire des points. .

Question n° 1 : ★ Si les événements A et B sont indépendants et que $\mathbb{P}(A) = 0,5$ et $\mathbb{P}(B) = 0,4$, combien vaut $\mathbb{P}(A \cap B)$?

A	B	C	D
0,1	0,2	0,3	0,4

Question n° 2 : Sur la route de son travail, Pierrick rencontre deux feux tricolores. Il a déterminé que la probabilité de devoir d'arrêter au premier feu est de $\frac{1}{3}$ et que celle de devoir s'arrêter au second est de $\frac{2}{5}$. Il a également déterminé qu'il y a une probabilité de $\frac{1}{2}$ de devoir s'arrêter à au moins un des deux feux tricolores. Quelle est la probabilité de devoir s'arrêter aux deux feux ?

A	B	C	D
$\frac{1}{30}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{13}{30}$