

Vrai/Faux

LE RIRE

Il nous détend, nous rassemble et nous permet de communiquer. Une expression bienfaisante et contagieuse. **Nathalie Picard**

1 C'EST « LE PROPRE DE L'HOMME »

FAUX Cet aphorisme de Rabelais est célèbre mais erroné : d'autres animaux rient. C'est le cas des grands singes (gorilles, chimpanzés...), surtout les jeunes, lorsqu'ils s'amuse. Les rats produisent aussi des sons assimilés au rire. En 1998, aux États-Unis, des scientifiques ont découvert qu'ils émettent des vocalisations ultrasonores (inaudibles pour nous) quand ils jouent entre eux. En les chatouillant, les chercheurs se sont aperçus que ces mêmes cris survenaient à une fréquence redoublée. Ce joyeux babil partage plusieurs traits avec sa version humaine : un déclenchement par le jeu, l'existence de zones corporelles plus sensibles que d'autres, un rôle social, une inhibition en cas d'émotions négatives... Des observations confirmées en 2016 par une équipe allemande.

4

ON RIT SEULEMENT QUAND C'EST DRÔLE

FAUX En étudiant 1200 épisodes de rire naturel, le psychologue américain Robert Provine a montré qu'ils survenaient en réponse à un trait d'humour dans moins de 20 % des cas. La plupart suivent des remarques banales, comme « ravi de vous avoir rencontré ». Preuve qu'ils sont avant tout un signal social. Dans un contexte humoristique, l'incongruité provoque souvent le rire : « C'est une différence

2

CERTAINES PERSONNES RIENT EN DORMANT

VRAI Ce phénomène s'appelle « l'hypnogélie ». Il se produit souvent chez les bébés mais disparaît après un an. Les adultes, eux, sourient rarement pendant la nuit et ne rient pas, d'après une étude menée par le service des pathologies du sommeil de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, à Paris (*Journal of Sleep Research*, 2019). En revanche, cela peut arriver chez des personnes atteintes d'un trouble du comportement en sommeil paradoxal. Durant cette phase, le verrou qui empêche tout mouvement du corps (seuls les yeux peuvent bouger) ne fonctionne plus : ces dormeurs vivent physiquement leurs songes et peuvent rire, bouger ou crier.

3

IL EST COMMUNICATIF

VRAI Difficile de rester de marbre lorsqu'on entend quelqu'un s'esclaffer. En effet, ce son active les mêmes régions cérébrales que si nous rions nous-mêmes. Le phénomène siège dans une zone du cortex impliquant des neurones miroirs. Selon le psychologue britannique Robin Dunbar, la contagion du rire permet, sous l'action des endorphines, de créer des relations positives et de renforcer la cohésion. « Au cours de l'évolution, divers mécanismes ont émergé dans cet objectif. Le toilettage social fonctionne pour de petits groupes de primates, le rire diffuse des endorphines chez un plus grand nombre d'individus, et la musique encore davantage », note Romain Di Stasi, chercheur à l'Université libre de Bruxelles (Belgique).





TIM ROBERTS/GETTY IMAGES

6

IL FAIT APPEL À DE NOMBREUX MUSCLES

VRAI Ce n'est pas pour rien que l'on a l'impression de s'être dépensé physiquement après un fou rire ! Il fait notamment travailler nos grands zygomatiques, situés au niveau de nos joues. En se contractant, ceux-ci tirent la lèvre supérieure vers le haut et l'extérieur. En tout, une vingtaine de muscles faciaux participent à l'expression d'un franc sourire. C'est moins que pour un froncement de sourcils (40 muscles du visage activés), mais le rire sollicite d'autres zones de notre corps. Il correspond ainsi à un mécanisme bien particulier de la respiration : une inspiration suivie d'une expiration avec des exclamations hachées (ha ! ha ! ha !), puis une nouvelle inspiration. « La phase d'expiration saccadée est due aux mouvements du diaphragme, du muscle droit de l'abdomen et de ceux de la cage thoracique », liste le D^r Éric Smadja dans son essai *Le Rire* (éd. Que sais-je, 2011). S'ajoutent les muscles du larynx, impliqués dans le son produit par vibration des cordes vocales, ou encore ceux liés à la posture (les épaules et la tête).

RIRE SPONTANÉ OU RIRE FORCÉ, C'EST PAREIL

FAUX Ils n'impliquent pas les mêmes régions du cerveau. « Le rire spontané provient de façon plus marquée du tronc cérébral, tandis que le rire volontaire est davantage lié à des zones conscientes, comme le cortex prémoteur », indique le chercheur Romain Di Stasi. La forme du conduit vocal change aussi : dans le rire spontané, elle est moins proche de celle liée à la parole. Par ailleurs, des études d'imagerie cérébrale ont montré que le cerveau ne traite pas le rire d'autrui de la même manière selon qu'il est authentique ou non : un rire forcé génère une activation plus forte du cortex préfrontal, une zone impliquée dans la résolution de problème. Le cerveau tente de décrypter ce signal. Pour autant, les deux formes sont parfois difficiles à distinguer au niveau sonore.

7

SES EFFETS ANTIDOULEURS SONT AVÉRÉS

VRAI « Le rire libère des endorphines, des substances associées au bien-être », précise le docteur en psychologie Romain Di Stasi. Produites entre autres lorsqu'on fait du sport, elles agissent comme des antidouleurs naturels. En 2011, des scientifiques de l'université d'Oxford (Grande-Bretagne) ont mené une expérience auprès de volontaires. Ils ont montré à une partie d'entre eux des vidéos comiques et à l'autre groupe des documentaires très neutres, puis ils ont mesuré leur tolérance

à la douleur. Résultat : les participants qui avaient visionné des films drôles résistaient mieux au contact du froid. Les endorphines ont aussi un effet apaisant et atténuent les tensions. Véritable antistress, le rire présente donc de multiples bienfaits, notamment en matière de santé cardiovasculaire. La Fédération française de cardiologie conseille d'ailleurs sur son site de « rechercher les occasions de rire tous les jours, de pratiquer l'autodérision, de s'amuser des travers de la vie ».