

Correction de la feuille 4 sur le calcul d'intégrales

Exercice 1 Les trois fonctions sont des dérivées immédiates. On peut faire le changement de variables $y = x^2$ si on ne le voit pas directement.

$$\int x\sqrt{x^2+4}dx = \frac{1}{3}(x^2+4)^{\frac{3}{2}}, \quad \int \frac{x}{(x^2+1)^{1/3}}dx = \frac{3}{4}(x^2+1)^{\frac{2}{3}}, \quad \int x\exp(-x^2)dx = -\frac{1}{2}\exp(-x^2)$$

Exercice 2 Les changements de variables sautent aux yeux :

$$\int \frac{dx}{x^2+16} = \frac{1}{4} \arctan(x/4), \quad \int \frac{e^x dx}{1+e^{2x}} = \arctan(e^x), \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = -\sqrt{1-x},$$
$$\int \frac{e^x dx}{\sqrt{16-e^{2x}}} = \arcsin(e^x/4), \quad \int \frac{xdx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{2} \arcsin(x^2), \quad \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)} = 2 \arctan(\sqrt{x})$$

Exercice 3 Pour $n \neq -1$:

$$\int x^n \ln(x) dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln(x) - \int \frac{x^n}{n+1} dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \ln(x) - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}.$$
$$\int \frac{\ln(x)}{x} dx = \int u du = \frac{u^2}{2} = \frac{(\ln(x))^2}{2}.$$

Pour l'intégrale $\int e^{-x}(\cos x)^2 dx$ remplacer le cosinus en fonction de sa forme exponentielle (=linéariser), puis regarder la partie réelle de l'expression :

$$\int \exp(-x)(\cos x)^2 dx = -\frac{1}{10} \exp(-x) \cos(2x) + \frac{1}{5} \exp(-x) \sin(2x) - \frac{1}{2} \exp(-x).$$

Dernière intégrale faite en TD.

Exercice 4 Si $n \neq 1$:

$$\int \frac{dx}{(x-a)^n} = \frac{(x-a)^{1-n}}{1-n}.$$

Si $n = 1$ poser $\alpha = a + ib$. Si $b \neq 0$:

$$\int \frac{dx}{x-a-ib} = \int \frac{(x-a+ib)dx}{(x-a)^2+b^2} = \frac{1}{2} \ln((x-a)^2+b^2) + i \arctan((x-a)/b),$$

et si $b = 0$, $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a|$.

Exercice 5 Fait en TD.

Exercice 6

$$\int \frac{dx}{49-4x^2} = \int \frac{1}{14} \left(\frac{1}{7-2x} - \frac{1}{7+2x} \right) dx = \frac{1}{28} \ln \left| \frac{7+2x}{7-2x} \right|.$$
$$\int \frac{5x-12}{x(x-4)} dx = \int \left(\frac{3}{x} + \frac{2}{x-4} \right) dx = 3 \ln|x| + 2 \ln|x-4|.$$
$$\int \frac{37x-11}{(x+1)(x-2)(x-3)} dx = \int \left(\frac{4}{x+1} - \frac{5}{x-2} + \frac{1}{x-3} \right) dx = 4 \ln|x+1| - 5 \ln|x-2| + \ln|x-3|.$$
$$\int \frac{2x^2-15x+33}{(x+1)(x-5)} dx = \int \left(\frac{-25/3}{x+1} + \frac{4/3}{x-5} + 2 \right) dx = -\frac{25}{3} \ln|x+1| + \frac{4}{3} \ln|x-5| + 2x,$$
$$\int \frac{x-1}{x^2+x+1} dx = \int \frac{(y-\sqrt{3})dy}{y^2+1} = \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) - \sqrt{3} \arctan \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + C,$$
$$\int \frac{dx}{(x^2+4x+5)^2} = \int \frac{dx}{((x+2)^2+1)^2} = \int \frac{(1+\tan^2 \theta)d\theta}{(1+\tan^2 \theta)^2} = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin(2\theta)}{4} = \frac{1}{2} \arctan(x+2) + \frac{(x+2)/2}{1+(x+2)^2}.$$

Exercice 7 Première et deuxième intégrale: $y = \cos(x)$, dernière: (faite en TD) $y = \tan(x/2)$.

$$\int (\sin x)^3 dx = \int (y^2 - 1) dy = \frac{1}{3} y^3 - y = \frac{1}{3} (\cos x)^3 - \cos(x).$$

$$\int \frac{\sin x}{(2 + \cos x)^2} dx = \int \frac{-dy}{(2 + y)^2} = \frac{1}{2 + y} = \frac{1}{2 + \cos(x)}$$

Exercice 8 Formule du binôme, moivre, et prendre la partie réelle. La seconde s'obtient facilement à partir de la première en posant $\theta = t + \pi/2$.

$$\int (\cos \theta)^n d\theta = \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{2^n} \frac{\sin(2k - n)\theta}{(2k - n)},$$

Exercice 9 Fait en TD, poser $x = \tan \theta$ et on est ramené à l'exo 8.

Exercice 10 Première intégrale: changement de variables $x = \cos(t)$ ($t \in]0, \pi[$) puis $y = \tan(t/2) \dots$

$$\int \frac{dx}{(1-x)\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{-\sin(t)dt}{(1-\cos t)\sin(t)} = \int \frac{\frac{2}{1+y^2} dy}{\frac{1-y^2}{1+y^2} - 1}$$

$$= \int -\frac{1}{y^2} dy = \frac{1}{y} = \frac{1}{\tan(t/2)} = \frac{1 + \cos(t)}{\sin(t)} = \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}$$

Deuxième intégrale: poser $y = 2x - 3$ puis $y = \operatorname{ch}(t)$. On a $t = \operatorname{argch}(y) = \ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) \dots$

$$\int \sqrt{x^2 - 3x + 2} dx = \frac{1}{4} \int \sqrt{y^2 - 1} dy = \frac{1}{4} \int (\operatorname{sh} t)^2 dt = \frac{1}{16} \int (e^{2t} + e^{-2t} - 2) dt$$

$$= \frac{1}{32} (e^{2t} - e^{-2t}) - \frac{t}{8} = \frac{1}{8} y \sqrt{y^2 - 1} - \frac{1}{8} \ln(y + \sqrt{y^2 - 1})$$

$$= \frac{1}{4} (2x - 3) \sqrt{x^2 - 3x + 2} - \frac{1}{8} \ln(2x - 3 + 2\sqrt{x^2 - 3x + 2})$$

Pour la suivante même technique avec $y = \frac{2x+1}{\sqrt{3}}$ et $y = \operatorname{sh}(t)$, $t = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$

$$\int \sqrt{x^2 + x + 1} dx = \frac{3}{4} \int \sqrt{y^2 + 1} dy = \frac{3}{8} (y \sqrt{y^2 + 1} + \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}))$$

$$= \frac{1}{4} (2x + 1) \sqrt{x^2 + x + 1} + \frac{3}{8} \ln(2x + 1 + 2\sqrt{x^2 + x + 1}).$$

Pour la dernière poser $y = \frac{2x-1}{\sqrt{5}}$ et $y = \cos(t) \dots \dots$

$$\int \sqrt{-x^2 + x + 1} = \frac{5}{4} \int \sqrt{1 - y^2} dy = \frac{5}{8} (y \sqrt{1 - y^2} - \arccos(y))$$

$$= \frac{1}{4} (2x - 1) \sqrt{-x^2 + x + 1} - \frac{5}{8} \arccos\left(\frac{2x - 1}{\sqrt{5}}\right).$$

Exercice 11 Poser donc $y = \sqrt{x} \dots$

$$\int \frac{\sqrt{x} dx}{(x-1)^2} = \int \frac{2y^2}{(y^2-1)^2} dy = \int \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{y+1} + \frac{1}{y-1} + \frac{1}{(y-1)^2} + \frac{1}{(y+1)^2} \right) dy$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{y-1}{y+1} \right| - \frac{y}{y^2-1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} \right| - \frac{\sqrt{x}}{x-1}.$$

$$\int \frac{x\sqrt{x} dx}{(x+1)^2} = \int \frac{2y^4 dy}{(y^2+1)^2} = \int \left(2 - \frac{4}{y^2+1} + \frac{2}{(1+y^2)^2} \right) dy$$

$$= 2y - 3 \arctan(y) + \frac{y}{y^2+1} = 2\sqrt{x} - 3 \arctan(\sqrt{x}) + \frac{\sqrt{x}}{x+1}.$$