

Homework #2 Cheat Sheet

CS231

1 Language of Booleans and Integers

1.1 Syntax

$t ::= \text{true} \mid \text{false} \mid \text{if } t \text{ then } t \text{ else } t$
 $\quad \mid n \mid t + t \mid t > t$
 $n ::= \text{integer constant}$
 $v ::= \text{true} \mid \text{false} \mid n$
 $T ::= \text{Bool} \mid \text{Int}$

1.2 Small-Step Operational Semantics

$$\frac{}{\text{if true then } t_2 \text{ else } t_3 \longrightarrow t_2} \quad (\text{E-IFTRUE})$$
$$\frac{}{\text{if false then } t_2 \text{ else } t_3 \longrightarrow t_3} \quad (\text{E-IFFALSE})$$
$$\frac{t_1 \longrightarrow t'_1}{\text{if } t_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 \longrightarrow \text{if } t'_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3} \quad (\text{E-IF})$$
$$\frac{t_1 \longrightarrow t'_1}{t_1 + t_2 \longrightarrow t'_1 + t_2} \quad (\text{E-PLUS1})$$
$$\frac{t_2 \longrightarrow t'_2}{v_1 + t_2 \longrightarrow v_1 + t'_2} \quad (\text{E-PLUS2})$$
$$\frac{n = n_1 \text{ } [[+]] \text{ } n_2}{n_1 + n_2 \longrightarrow n} \quad (\text{E-PLUSRED})$$
$$\frac{t_1 \longrightarrow t'_1}{t_1 > t_2 \longrightarrow t'_1 > t_2} \quad (\text{E-GT1})$$
$$\frac{t_2 \longrightarrow t'_2}{v_1 > t_2 \longrightarrow v_1 > t'_2} \quad (\text{E-GT2})$$
$$\frac{v = n_1 \text{ } [[>]] \text{ } n_2}{n_1 > n_2 \longrightarrow v} \quad (\text{E-GTRED})$$

1.3 Static Type System

$$\frac{}{\text{true} : \text{Bool}} \quad (\text{T-TRUE}) \qquad \frac{}{\text{false} : \text{Bool}} \quad (\text{T-FALSE})$$

$$\frac{t_1 : \text{Bool} \quad t_2 : T \quad t_3 : T}{\text{if } t_1 \text{ then } t_2 \text{ else } t_3 : T} \quad (\text{T-IF})$$

$$\frac{}{n : \text{Int}} \quad (\text{T-NUM})$$

$$\frac{t_1 : \text{Int} \quad t_2 : \text{Int}}{t_1 + t_2 : \text{Int}} \quad (\text{T-PLUS})$$

$$\frac{t_1 : \text{Int} \quad t_2 : \text{Int}}{t_1 > t_2 : \text{Bool}} \quad (\text{T-GT})$$

2 Call-by-Value Lambda Calculus

2.1 Syntax

$t ::= x \mid \text{function } x \rightarrow t \mid t \ t$
 $v ::= \text{function } x \rightarrow t$

2.2 Substitution

$[x \mapsto v]x = v$
 $[x \mapsto v]x' = x', \text{ where } x \neq x'$
 $[x \mapsto v]\text{function } x \rightarrow t_0 = \text{function } x \rightarrow t_0$
 $[x \mapsto v]\text{function } x_0 \rightarrow t_0 = \text{function } x_0 \rightarrow [x \mapsto v]t_0, \text{ where } x \neq x_0$
 $[x \mapsto v]t_1 \ t_2 = [x \mapsto v]t_1 \ [x \mapsto v]t_2$

2.3 Small-Step Operational Semantics

$$\frac{}{((\text{function } x \rightarrow t) \ v) \longrightarrow [x \mapsto v]t} \quad (\text{E-APPBETA})$$

$$\frac{t_1 \longrightarrow t'_1}{t_1 \ t_2 \longrightarrow t'_1 \ t_2} \quad (\text{E-APP1})$$

$$\frac{t_2 \longrightarrow t'_2}{v_1 \ t_2 \longrightarrow v_1 \ t'_2} \quad (\text{E-APP2})$$