空间旋转在 Hilbert 空间中的表示

Spatial Rotations in Hilbert Space: Representations

角动量理论系列讲义, 第二篇: 旋转的幺正表示, Lie 代数表示与 SU(2) 双覆盖

RongYu

角动量理论系列讲义

2026.8.9

目录

导言 4

I 从三维空间旋转到 Hilbert 空间旋转 5

1 从三维空间旋转到 Hilbert 空间旋转 6

1.1 两个不同的空间 6

1.2 空间旋转的 Hilbert 空间表示 6

1.3 为什么要求这是群表示 8

2 从 SO(3) 继承来的旋转算符性质 9

2.1 单位旋转 9

2.2 旋转的复合 9

2.3 逆旋转 10

2.4 正交性与幺正性 10

2.5 非交换性 10

2.6 连续旋转 11

II 无穷小旋转, 生成元与 Lie 代数表示 12

3 Hilbert 空间中的无穷小旋转 13

3.1 恒等旋转附近 13

3.2 无穷小生成元 14

3.3 幺正性对生成元的限制 14

4 从 so(3) 到 Hilbert 空间中的 Lie 代数 16

4.1 群表示诱导 Lie 代数表示 16

4.2 Lie 括号结构必须保持 17

4.3 Lie 群与 Lie 代数的对应 19

5 从生成元得到有限量子旋转 21

5.1 固定轴旋转 21

5.2 指数形式 21

5.3 轴角参数 22

5.4 Euler 角 22

III 为什么需要 SU(2) 24

6 一个重要问题：这种表示是否已经包含所有量子旋转 25

7 SU(2) 与 SO(3) 27

7.1 SU(2) 的定义 27

7.2 SU(2) 与 SO(3) 的联系 28

7.3 su(2) 与 so(3) 30

7.4 2π 与 4π 31

IV SU(2) 的二维表示：Pauli 矩阵与 S 型生成元 33

8 SU(2) 的特殊二维表示 34

8.1 二维表示空间 34

8.2 Pauli 矩阵 34

8.3 Pauli 矩阵与 su(2) 35

8.4 定义 S 型生成元 36

9 一般表示与二维表示的关系 38

9.1 同一个旋转群可以有不同表示 38

9.2 不同维数的表示 38

9.3 二维表示为什么特殊 39

10 第二篇总结 40

导言

上一篇《三维空间旋转与 SO(3)》把经典旋转本身研究透彻: 旋转是 $\mathbb{R}^3$ 上保持内积与取向的线性映射, 全体旋转构成三参数连续群 $SO(3)$; 有限旋转可以写成轴角形式 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$ 或 Euler 角形式, 其无穷小层面由三个生成元 G_1, G_2, G_3 描述, 生成元满足对易关系 $[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk} G_k$, 构成 Lie 代数 $\mathfrak{so}(3)$; 生成元经过指数映射重建有限旋转: $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta) = \mathrm{e}^{\theta\, \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}}$. 上一篇结尾提出了第二篇的问题: 把 $SO(3)$ 通过群表示映射到量子力学的 Hilbert 空间后, 旋转矩阵、生成元、对易关系和指数形式分别会变成什么?

本讲回答这个问题. 全篇沿着一条与上一篇完全平行的链

$$
\begin{array}{|c|}
\hline
SO(3) \longrightarrow \text{群表示} \longrightarrow \hat{U}(\boldsymbol{R}) \longrightarrow \text{无穷小生成元} \longrightarrow \text{Lie 代数表示} \longrightarrow SU(2) \longrightarrow \\
\text{二维表示} \longrightarrow \text{Pauli 矩阵与 } S \\
\hline
\text{群表示与继承性质 (第 1–2 节)} \longrightarrow \text{无穷小结构与对易代数 (第 3–4 节)} \longrightarrow \text{指数形式 (第 5} \\
\text{节)} \longrightarrow SU(2) \text{ 双覆盖 (第 6–7 节)} \longrightarrow \text{二维表示 (第 8–9 节)} \\
\hline
\end{array}
\tag{0.1}
$$

组织如下. 第 1 节引入群表示的概念, 把 $SO(3)$ 映射为 Hilbert 空间中的幺正旋转算符; 第 2 节逐项检查这些算符继承自 $SO(3)$ 的性质. 第 3–4 节把上一篇的无穷小结构搬进 Hilbert 空间: 由无穷小旋转引入三个自伴生成元, 并证明生成元的对易代数正是 $\mathfrak{so}(3)$ 的结构通过表示映射的结果. 第 5 节从生成元经指数映射恢复有限旋转算符, 并与上一篇的指数形式逐字对照. 第 6 节指出一个重要问题: $SO(3)$ 的普通表示不能容纳一切允许的量子旋转结构, 由此在第 7 节自然引入 $SU(2)$ 及其与 $SO(3)$ 的双覆盖关系. 第 8 节研究 $SU(2)$ 的二维表示, 建立 Pauli 矩阵的纯数学性质并定义 S 型生成元; 第 9 节说明二维表示在不同维数表示中的地位. 第 10 节总结全篇的两个平行映射.

本讲只讨论这些对象作为旋转的表示与生成元的数学来源, 刻意不赋予具体的物理意义: 生成元究竟是轨道角动量、自旋角动量还是总角动量, 它们如何测量, 本讲一概不涉及, 那是第三篇的主题.

Part I

从三维空间旋转到 Hilbert 空间旋转

本部分引入群表示的概念: 每个空间旋转 $R \in SO(3)$ 对应一个作用在量子态上的幺正算符 $\hat{U}(\boldsymbol{R})$, 且对应保持群乘法; 随后逐项检查旋转算符继承自 $SO(3)$ 的性质: 单位元, 复合, 逆, 幺正性, 非交换性与连续性.

内容概要

- 理解三维物理空间 $\mathbb{R}^3$ 与量子态 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 是两个不同的空间, 旋转分别以旋转矩阵与旋转算符作用于其上.
- 掌握群表示的定义: 表示空间, 表示矩阵, 保持群乘法的群同态.
- 理解 $\boldsymbol{R} \mapsto \hat{U}(\boldsymbol{R})$ 是把旋转映为作用在态上的线性算符, 而不是映为量子态.
- 会对照列出旋转算符从 $SO(3)$ 继承的性质, 理解正交性与幺正性是同一思想在不同空间的实现.

1

从三维空间旋转到 Hilbert 空间旋转

1.1 两个不同的空间

首先要明确区分两个空间. 第一个是三维物理空间 $\mathbb{R}^3$: 它的元素是位置向量 $\boldsymbol{x}$, 旋转 $\boldsymbol{R} \in SO(3)$ 作用在其上, 把向量按几何方式搬动: $\boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}$. 上一篇的全部内容, 从旋转矩阵到生成元, 都生活在这个空间里.

第二个是量子态所在的 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$: 它的元素是量子态右矢 $|\psi\rangle$, 内积 $\langle\phi|\psi\rangle$ 给出测量概率 $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$. 量子力学中, 把整个物理系统旋转后, 量子态必须相应改变: 需要一个作用在 $\mathscr{H}$ 上的算符, 它把态 $|\psi\rangle$ 变为转动后的态 $|\psi'\rangle$. 这个算符就是本篇研究的对象.

两个空间的结构完全不同: $\mathbb{R}^3$ 是实三维空间, 旋转是矩阵乘法; $\mathscr{H}$ 是 (一般无穷维) 复内积空间, 旋转是线性算符. 空间旋转的量子理论, 就是在一一对应的意义上把 $\mathbb{R}^3$ 上的旋转结构" 翻译" 到 $\mathscr{H}$ 上. 这种翻译不是任意的: 它必须保持旋转的全部代数结构, 这正是群表示概念的内容.

1.2 空间旋转的 Hilbert 空间表示

Def. 1　群表示

设 G 是群, V 是域 F 上的向量空间, $\mathrm{GL}(V)$ 是 V 上全体可逆线性算符构成的群. 若映射 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ 保持群乘法:

$$\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1)\rho(g_2) \qquad \text{对一切} g_1, g_2 \in G,$$

则称 ρ 为群 G 在线性空间 V 上的表示 (representation), 记作 (ρ, V); 称 V 为表示空间, $\dim V$ 为表示的次数. 若 V 是 Hilbert 空间且 ρ 取值在幺正算符之集 $U(\mathscr{H})$ 中, 则称幺正表示.

表示论的全部要点是: 同一个群可以在不同的向量空间上" 扮演", 群元本身不变, 改变的

是它作用的空间与它在该空间中的具体实现 (表示矩阵). 群 G 是被表示的群, 表示空间是 V, 群元 g 在 V 上的实现是线性算符 $\rho(g)$.

现在取 $G = SO(3)$, 表示空间取量子态的 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$:

Def. 2　空间旋转的表示

空间旋转的 Hilbert 空间表示是把每个旋转矩阵 $\boldsymbol{R} \in SO(3)$ 对应到一个幺正算符 $\hat{U}(\boldsymbol{R}) \in U(\mathscr{H})$ 的映射

$$\rho : \ SO(3) \longrightarrow U(\mathscr{H}), \qquad \boldsymbol{R} \longmapsto \hat{U}(\boldsymbol{R}),$$

满足 $\hat{U}(\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2) = \hat{U}(\boldsymbol{R}_1)\hat{U}(\boldsymbol{R}_2)$. 态在旋转下按 $|\psi\rangle \mapsto \hat{U}(\boldsymbol{R})\,|\psi\rangle$ 变换, $\hat{U}(\boldsymbol{R})$ 称为旋转算符.

这里最容易混淆的一点值得强调: 表示 ρ 不是把旋转矩阵 $\boldsymbol{R}$ 映射成一个量子态, 而是映射成作用在量子态上的线性算符. $\boldsymbol{R}$ 与 $\hat{U}(\boldsymbol{R})$ 的作用对象不同: $\boldsymbol{R}$ 作用于空间向量, $\hat{U}(\boldsymbol{R})$ 作用于态向量. 两者的联系是: $\hat{U}(\boldsymbol{R})$ 是 $\boldsymbol{R}$ 这个几何旋转在态空间中的实现.

一个提醒

把 $\boldsymbol{R}$ 与 $\hat{U}(\boldsymbol{R})$ 放在一起时, 时刻问自己: 它作用在哪个空间上? 是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量, 还是 $\mathscr{H}$ 中的态? 本篇的全部推导都建立在这个区分之上.




图 1: 旋转的两种实现: 同一个旋转在三维物理空间 $\mathbb{R}^3$ 中实现为矩阵作用 $\boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}$, 在量子态空间 $\mathscr{H}$ 中实现为算符作用 $|\psi\rangle \mapsto \hat{U}(\boldsymbol{R})\,|\psi\rangle$; 表示 ρ 把两种实现联系起来.

1.3 为什么要求这是群表示

要求 $\boldsymbol{R} \mapsto \hat{U}(\boldsymbol{R})$ 保持群乘法, 不是数学上的洁癖, 而是物理的自洽性. 在空间中连续做两个旋转, 先 $\boldsymbol{R}_1$ 后 $\boldsymbol{R}_2$, 总效果是复合旋转 $\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1$ (第一篇, 乘积从右往左作用). 对应地, 量子层面必须先作用 $\hat{U}(\boldsymbol{R}_1)$ 再作用 $\hat{U}(\boldsymbol{R}_2)$, 总效果必须等于复合旋转对应的算符 $\hat{U}(\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1)$:

$$\hat{U}(\boldsymbol{R}_2)\hat{U}(\boldsymbol{R}_1) = \hat{U}(\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1).$$

如果这个等式不成立, 那么" 先转 90° 再转 90°" 这个物理过程在量子描述中就有两种不同的结果, 取决于我们是把它当作两次旋转的复合还是当作一次 180° 的旋转; 这显然不能接受. 因此表示条件不是外加的约束, 而是" 旋转算符描述的是旋转" 这一说法的数学定义.

由此建立本篇最重要的思想:

本篇的纲领

后面所有量子旋转的数学结构 – 旋转算符, 生成元, 对易代数, 指数形式 – 都是 $SO(3)$ 的结构通过表示映射进入 Hilbert 空间后的结果. 量子层面不会出现任何 $SO(3)$ 本身没有的结构.

最后补充幺正性的物理来源. 空间旋转保持量子态之间的物理可区分性: 转动前后的两对态, 其跃迁概率必须相同. 因此 $\hat{U}(\boldsymbol{R})$ 应保持内积, 即 $|\left\langle \hat{U}\phi \middle| \hat{U}\psi \right\rangle|^2 = |\langle \phi|\psi\rangle|^2$ 对一切态成立. 对线性算符, 保持模长蕴含保持内积 (极化恒等式), 故 $\left\langle \hat{U}\phi \middle| \hat{U}\psi \right\rangle = \langle \phi|\psi\rangle$, 即 $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{I}$: 旋转算符是幺正算符. 这里只用到旋转与恒等变换连续相连这一事实 (旋转可以连续地进行), 因此排除了反幺正实现.

2

从 SO(3) 继承来的旋转算符性质

这一节把上一篇 $SO(3)$ 的每一条基本性质, 逐项搬到旋转算符上. 每一项的证明都只需表示条件 $\hat{U}(\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2)=\hat{U}(\boldsymbol{R}_1)\hat{U}(\boldsymbol{R}_2)$ 与经典对应.

2.1 单位旋转

空间的恒等旋转 $\boldsymbol{I}\in SO(3)$ 对应 Hilbert 空间中的恒等算符:

Prop. 1　单位元

$$\hat{U}(\boldsymbol{I})=\hat{I}.$$

Pf　对任意 $\boldsymbol{R}\in SO(3)$, 表示条件给出 $\hat{U}(\boldsymbol{I})\hat{U}(\boldsymbol{R})=\hat{U}(\boldsymbol{I}\boldsymbol{R})=\hat{U}(\boldsymbol{R})$; 右乘 $\hat{U}(\boldsymbol{R})^{-1}$ (它存在, 因为 $\hat{U}(\boldsymbol{R})$ 可逆), 得 $\hat{U}(\boldsymbol{I})=\hat{I}$. □

2.2 旋转的复合

空间旋转的乘法对应旋转算符的乘法, 这正是表示条件本身:

Prop. 2　复合

对 $\boldsymbol{R}_1,\boldsymbol{R}_2\in SO(3)$,

$$\hat{U}(\boldsymbol{R}_1)\hat{U}(\boldsymbol{R}_2)=\hat{U}(\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2).$$

特别地, 绕同一轴的旋转算符满足转角相加: $\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)\hat{U}(\boldsymbol{n},\varphi)=\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta+\varphi)$, 其中 $\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta):=\hat{U}(\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta))$.

Pf　第一个等式即表示条件. 第二个等式由第一篇的 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\varphi)=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta+\varphi)$ 代入表示条件立即得出. □

2.3 逆旋转

Prop. 3　逆元

$$\hat{U}(\boldsymbol{R}^{-1}) = \hat{U}(\boldsymbol{R})^{-1}.$$

Pf　由表示条件, $\hat{U}(\boldsymbol{R})\hat{U}(\boldsymbol{R}^{-1}) = \hat{U}(\boldsymbol{R}\boldsymbol{R}^{-1}) = \hat{U}(\boldsymbol{I}) = \hat{I}$; 同理 $\hat{U}(\boldsymbol{R}^{-1})\hat{U}(\boldsymbol{R}) = \hat{I}$. 故 $\hat{U}(\boldsymbol{R}^{-1})$ 是 $\hat{U}(\boldsymbol{R})$ 的逆. □

由 $\boldsymbol{R}^{-1} = \boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}$ (第一篇) 与幺正性, 逆旋转算符同时可以写成 $\hat{U}(\boldsymbol{R}^{-1}) = \hat{U}(\boldsymbol{R})^{-1} = \hat{U}(\boldsymbol{R})^{\dagger}$.

2.4 正交性与幺正性

Prop. 4　保持内积

空间旋转矩阵保持三维实内积: $(\boldsymbol{R}\boldsymbol{x})\cdot(\boldsymbol{R}\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}$, 因此是正交矩阵, $\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}$; 旋转算符保持量子态内积: $\left\langle \hat{U}\phi \middle| \hat{U}\psi \right\rangle = \langle \phi|\psi\rangle$, 因此是幺正算符, $\hat{U}^{\dagger}\hat{U} = \hat{I}$.

Pf　经典部分已在第一篇证明 (保持内积等价于正交性). 量子部分: 幺正性的物理来源已在第 1.3 节说明: 旋转保持跃迁概率, 由极化恒等式, 保持模长的线性算符保持内积, 即 $\hat{U}^{\dagger}\hat{U} = \hat{I}$. □

这里要强调两点. 第一, 两条性质是相同的几何思想在不同空间中的实现: $\mathbb{R}^3$ 的实内积由矩阵 $\boldsymbol{R}$ 保持, $\mathscr{H}$ 的复内积由算符 $\hat{U}$ 保持. 第二, 正交矩阵本身并没有”变成”幺正矩阵: 它们是不同空间上的不同对象, 一个是 3×3 实矩阵, 一个是 (一般无穷维) 态空间上的算符; 表示 ρ 把它们一一对应起来, 而不是把它们等同起来. 保持内积的共同性质正是表示理论中”正交”与”幺正”这对概念平行对应的原因.

2.5 非交换性

Prop. 5　非交换

设表示是忠实的: 不同的空间旋转对应不同的旋转算符 (这是物理上必须的, 否则两个不同的旋转操作在量子层面无法区分). 则 $SO(3)$ 的非 Abel 性被保持:

$$\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2 \neq \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1 \quad\Longrightarrow\quad \hat{U}(\boldsymbol{R}_1)\hat{U}(\boldsymbol{R}_2) \neq \hat{U}(\boldsymbol{R}_2)\hat{U}(\boldsymbol{R}_1).$$

特别地, 绕不同轴的两个旋转算符一般不对易; 绕同一轴的旋转算符可交换 (命题 2.2).

Pf　反证. 若 $\hat{U}(\boldsymbol{R}_1)\hat{U}(\boldsymbol{R}_2) = \hat{U}(\boldsymbol{R}_2)\hat{U}(\boldsymbol{R}_1)$, 由表示条件, $\hat{U}(\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2) = \hat{U}(\boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1)$; 忠实性给出 $\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2 = \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1$, 与假设矛盾. □

这里" 忠实" 是关键的限定: 数学上存在非忠实的表示 (例如把每个旋转都映为恒等算符的平凡表示), 其中一切乘积都交换; 但这样的表示不描述物理, 因为不同的旋转在量子层面将无法区分. 本篇使用的旋转表示都是忠实的, 它把 $SO(3)$ 的乘法结构完整体现出来. 这一非交换性是下一部分生成元对易代数非零的根源: 经典层面两个有限旋转不对易, 无穷小层面两个生成元就对易子非零.

2.6　连续旋转

Prop. 6　连续性

$SO(3)$ 是连续群, 旋转算符也随之连续变化: 对固定轴 $\boldsymbol{n}$, 映射 $\theta \mapsto \hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta)$ 连续, 且满足 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, 0) = \hat{I}$, $\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta)\hat{U}(\boldsymbol{n}, \varphi) = \hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta + \varphi)$.

Pf　经典映射 $\theta \mapsto \boldsymbol{R}(\boldsymbol{n}, \theta)$ 连续 (第一篇); 物理上, 连续转动的量子实现必须连续, 否则无限小的转动会在态上引起有限跳变. 群性质继承自命题 2.2. □

于是第 1–2 节的内容可以收束为一个对应:

第一篇到第二篇的对应

$$SO(3) \longrightarrow \{\text{Hilbert 空间中的旋转算符}\}$$

右边是幺正算符之集 $U(\mathscr{H})$ 的一个子群: 它含恒等算符, 对乘法封闭 (命题 2.2), 对取逆封闭 (命题 2.3), 群乘法连续依赖于三个参数 (命题 2.6). 也就是说, 右边同样具有 Lie 群结构, 与 $SO(3)$ 同构 (对忠实表示). 它是 $SO(3)$ 的精确镜像.

Part II

无穷小旋转, 生成元与 Lie 代数表示

本部分对应第一篇的” 无穷小旋转与生成元” 与”Lie 代数” 两章: 从恒等旋转附近的旋转算符展开引入无穷小生成元, 由幺正性推出生成元的反自伴性并转而使用自伴生成元, 证明群表示在无穷小层面诱导 Lie 代数表示且必须保持对易结构, 最后从生成元经指数映射恢复有限旋转算符, 并给出 Euler 角的量子版本.

内容概要

- 掌握旋转算符在恒等附近的展开 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, \mathrm{d}\theta) = \hat{I} - \dfrac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathrm{d}\theta\, \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}} + O(\mathrm{d}\theta^2)$.
- 会由幺正性推导生成元的反自伴性, 理解 i 与 $\hbar$ 因子的由来.
- 理解群表示诱导 Lie 代数表示, 会完整推导对易关系 $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k$.
- 掌握有限旋转算符的指数形式 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\, \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}/\hbar}$ 及其与经典指数形式的逐项对应, 含 Euler 角的量子版本.

3

Hilbert 空间中的无穷小旋转

这一节对应第一篇的" 无穷小旋转与生成元". 上一篇从转角趋于零的旋转矩阵 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n}, \mathrm{d}\theta)$ 的一阶展开得到了生成元; 现在对旋转算符做同样的事.

3.1 恒等旋转附近

考虑一个非常小的空间旋转 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n}, \mathrm{d}\theta)$ 及其对应的旋转算符 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, \mathrm{d}\theta) = \hat{U}(\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n}, \mathrm{d}\theta))$. 由连续性 (命题 2.6), $\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta)$ 在 $\theta = 0$ 附近与恒等算符 $\hat{I}$ 任意接近: $\theta \to 0$ 时 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta) \to \hat{U}(\boldsymbol{n}, 0) = \hat{I}$. 因此在 θ 很小时, $\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta)$ 可以按 θ 作 Taylor 展开, 保留一阶项:

Prop. 1　恒等附近的展开

$$\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta) = \hat{I} + \theta\, \hat{X}(\boldsymbol{n}) + O(\theta^2),$$

其中 $\hat{X}(\boldsymbol{n}) = \mathrm{d}\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta)/\mathrm{d}\theta\big|_{\theta=0}$ 是某个 (与 $\boldsymbol{n}$ 有关的) 线性算符.

Pf　即 Taylor 展开 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta) = \hat{U}(\boldsymbol{n}, 0) + \theta\, \hat{U}'(\boldsymbol{n}, 0) + O(\theta^2)$, 其中 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, 0) = \hat{U}(\boldsymbol{I}) = \hat{I}$ (命题 2.1). □

与上一篇完全平行, 有限旋转的全部局部信息都集中在 $\theta \to 0$ 的这一阶展开里: 知道了 $\hat{X}(\boldsymbol{n})$, 原则上可以重建整个单参数族 (第 5 节). 这就是" 无穷小旋转" 在量子层面的含义: 它不是某个具体的旋转, 而是恒等旋转附近的线性近似.

3.2 无穷小生成元

Def. 1　无穷小生成元

绕坐标轴 $\boldsymbol{e}_i$ 的无穷小旋转算符给出三个基本生成元

$$\hat{X}_i := \left.\frac{\mathrm{d}\,\hat{U}(\boldsymbol{e}_i,\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right|_{\theta=0}, \qquad i=1,2,3,$$

于是 $\hat{U}(\boldsymbol{e}_i,\mathrm{d}\theta)=\hat{I}+\mathrm{d}\theta\,\hat{X}_i+O(\mathrm{d}\theta^2)$. 对一般方向的转轴 $\boldsymbol{n}$, 由空间中的无穷小旋转 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\mathrm{d}\theta)=\boldsymbol{I}+\mathrm{d}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}+O(\mathrm{d}\theta^2)$ (第一篇) 是沿三个坐标轴分量的线性组合, 且表示保持乘法与连续性, 得

$$\hat{U}(\boldsymbol{n},\mathrm{d}\theta)=\hat{I}+\mathrm{d}\theta\,(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{X}})+O(\mathrm{d}\theta^2), \qquad \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{X}}=n_1\hat{X}_1+n_2\hat{X}_2+n_3\hat{X}_3.$$

称 $\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{X}}$ 为绕轴 $\boldsymbol{n}$ 的无穷小旋转的生成元. 精确的机制 – 表示在恒等元附近的微分是线性映射 – 将在第 4.1 节给出.

Eg. 1　轨道旋转算符

若 $\mathscr{H}$ 取为无自旋粒子的轨道态空间, 旋转算符由位置本征态上的作用定义: $\hat{U}(\boldsymbol{R})\,|\boldsymbol{x}\rangle=|\boldsymbol{R}\boldsymbol{x}\rangle$. 则无穷小旋转满足

$$\hat{U}(\boldsymbol{n},\mathrm{d}\theta)\,|\boldsymbol{x}\rangle=|\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\mathrm{d}\theta)\boldsymbol{x}\rangle\,,$$

用第一篇的展开 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\mathrm{d}\theta)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}+\mathrm{d}\theta\,(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{x})+O(\mathrm{d}\theta^2)$, 可以看出 $\hat{X}(\boldsymbol{n})$ 在此空间中作用为微分算子. 本篇不深入任何具体空间: 生成元的性质全部由表示的公理结构决定.

3.3 幺正性对生成元的限制

旋转算符是幺正算符, 这一性质对生成元施加严格限制.

Prop. 2　生成元的反自伴性

设 $\hat{U}(\mathrm{d}\theta)=\hat{I}+\mathrm{d}\theta\,\hat{X}+O(\mathrm{d}\theta^2)$ 是一族幺正算符, 则

$$\hat{X}^\dagger=-\hat{X},$$

即无穷小生成元必为反自伴算符.

Pf　把展开代入幺正条件 $\hat{U}(\mathrm{d}\theta)^\dagger \hat{U}(\mathrm{d}\theta) = \hat{I}$:

$$\hat{I} = \big(\hat{I} + \mathrm{d}\theta\, \hat{X}^\dagger + O(\mathrm{d}\theta^2)\big)\big(\hat{I} + \mathrm{d}\theta\, \hat{X} + O(\mathrm{d}\theta^2)\big) = \hat{I} + \mathrm{d}\theta(\hat{X}^\dagger + \hat{X}) + O(\mathrm{d}\theta^2).$$

一阶项必须为零: $\hat{X}^\dagger + \hat{X} = 0$. □

这与第一篇的结论完全平行: 那里从正交性 $\boldsymbol{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}$ 推出经典生成元反对称 $\boldsymbol{G}^{\mathsf{T}} = -\boldsymbol{G}$; 这里从幺正性 $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{I}$ 推出量子生成元反自伴 $\hat{X}^\dagger = -\hat{X}$. 反对称矩阵与反自伴算符分别是实空间与复 Hilbert 空间中" 无穷小等距变换" 的标准形式.

反自伴算符在物理上不顺手: 可观测量由自伴算符表示. 因此按标准归一化引入三个自伴生成元:

Def. 2　自伴生成元与生成元三元组

定义

$$\hat{J}_i := \mathrm{i}\hbar\, \hat{X}_i, \qquad i = 1, 2, 3,$$

则 $\hat{J}_i^\dagger = \hat{J}_i$ (自伴), 且无穷小旋转写成

$$\hat{U}(\boldsymbol{n}, \mathrm{d}\theta) = \hat{I} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathrm{d}\theta\, \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}} + O(\mathrm{d}\theta^2), \qquad \hat{\boldsymbol{J}} = (\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3). \tag{3.1}$$

称 $\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3$ 为旋转算符的三个自伴生成元, 组成生成元三元组 $\hat{\boldsymbol{J}}$.

Pf　自伴性: $\hat{J}_i^\dagger = (-\mathrm{i}\hbar)\hat{X}_i^\dagger = -\mathrm{i}\hbar(-\hat{X}_i) = \mathrm{i}\hbar\hat{X}_i = \hat{J}_i$. 展开式由 $\hat{X}_i$ 的定义代回即得. □

因子 $\mathrm{i}\hbar$ 的来历值得说明: i 把反自伴变为自伴 (与经典情形 $\boldsymbol{G}^{\mathsf{T}} = -\boldsymbol{G}$ 对照, 那里只需要实数, 量子情形必须乘 i 才能在复空间中得到自伴算符); $\hbar$ 使 $\hat{J}_i$ 具有角动量的量纲 (经典生成元 $\boldsymbol{G}_i$ 无量纲, 指数 $\mathrm{e}^{\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}}$ 中 θ 是角度; 量子指数 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}/\hbar}$ 中 $\hat{\boldsymbol{J}}/\hbar$ 无量纲).

本篇的立场

到目前为止, $\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3$ 只是 Hilbert 空间中空间旋转的生成元: 它们的全部定义来自旋转算符的无穷小展开与幺正性, 不涉及任何具体的物理对象. 它们究竟是轨道角动量还是自旋角动量, 是第三篇的主题; 本篇只使用它们作为旋转生成元的数学身份.

4

从 so(3) 到 Hilbert 空间中的 Lie 代数

这是全篇第二个核心: 群表示在无穷小层面自动给出 Lie 代数表示, 第一篇的对易结构 $[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk} G_k$ 必须被保持, 由此得到 $\hat{\boldsymbol{J}}$ 的对易代数.

4.1 群表示诱导 Lie 代数表示

把经典与量子两个无穷小展开并排对照:

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n}, \mathrm{d}\theta) = \boldsymbol{I} + \mathrm{d}\theta\, \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G} + O(\mathrm{d}\theta^2), \qquad \hat{U}(\boldsymbol{n}, \mathrm{d}\theta) = \hat{I} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\mathrm{d}\theta\, \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}} + O(\mathrm{d}\theta^2).$$

第一篇的生成元 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}$ 与这里的生成元算符 $\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}$ 之间存在由表示 ρ 诱导的对应. 一般地:

Def. 1　诱导的代数表示

对 $\boldsymbol{X} \in \mathfrak{so}(3)$, 曲线 $t \mapsto \rho(\mathrm{e}^{t\boldsymbol{X}})$ 是 $U(\mathscr{H})$ 中的幺正单参子群, 定义

$$\pi(\boldsymbol{X}) := \left.\frac{\mathrm{d}\,\rho(\mathrm{e}^{t\boldsymbol{X}})}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0},$$

即 $\pi(\boldsymbol{X})$ 是该单参子群的生成元. 这给出映射 $\pi : \mathfrak{so}(3) \to \{\mathscr{H}$ 上的算符$\}$, 称为群表示 ρ 诱导的生成元映射 (Lie 代数表示).

对 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}$: $\rho(\mathrm{e}^{t\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}}) = \rho(\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n}, t)) = \hat{U}(\boldsymbol{n}, t)$, 故

$$\pi(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}) = \left.\frac{\mathrm{d}\,\hat{U}(\boldsymbol{n}, t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{X}} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}},$$

即经典旋转生成元 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}$ 对应量子旋转生成元 $-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}$ (带 i 与 $1/\hbar$ 因子). 映射 π 是线性的: 由定义, $\pi(s\boldsymbol{X}) = \mathrm{d}\rho(\mathrm{e}^{ts\boldsymbol{X}})/\mathrm{d}t|_{t=0} = s\pi(\boldsymbol{X})$, 且任意方向的无穷小旋转是三个基本生成元的线性组合 (第一篇), 表示保持乘法, 故 π 在 $\mathfrak{so}(3)$ 上按线性组合分配. 它在单位元附近把群的乘法对应为生成元的加法, 这正是" 群表示在恒等元附近的微分" 的内容.

4.2 Lie 括号结构必须保持

因为 π 是群表示诱导的代数表示, 第一篇生成元之间的对易结构必须被保留: 对易子在 π 下的像, 等于像的对易子. 这一性质的严格论证如下. 先需要一个纯代数引理.

Lem. 1　群对易子恒等式

设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 是矩阵 (或算符), 则

$$\mathrm{e}^{\varepsilon \boldsymbol{A}} \mathrm{e}^{\varepsilon \boldsymbol{B}} \mathrm{e}^{-\varepsilon \boldsymbol{A}} \mathrm{e}^{-\varepsilon \boldsymbol{B}} = \boldsymbol{I} + \varepsilon^2 [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] + O(\varepsilon^3).$$

Pf　把四个指数都展开到二阶:

$$\mathrm{e}^{\varepsilon \boldsymbol{A}} \mathrm{e}^{\varepsilon \boldsymbol{B}} = \boldsymbol{I} + \varepsilon(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) + \frac{\varepsilon^2}{2}(\boldsymbol{A}^2 + 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}^2) + O(\varepsilon^3),$$
$$\mathrm{e}^{-\varepsilon \boldsymbol{A}} \mathrm{e}^{-\varepsilon \boldsymbol{B}} = \boldsymbol{I} - \varepsilon(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) + \frac{\varepsilon^2}{2}(\boldsymbol{A}^2 + 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}^2) + O(\varepsilon^3).$$

相乘, 一阶项相消; 二阶项为 ε^2 乘以

$$\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}^2 + 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}^2) + \frac{1}{2}(\boldsymbol{A}^2 + 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{B}^2) - (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}],$$

故乘积 $= \boldsymbol{I} + \varepsilon^2 [\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] + O(\varepsilon^3)$. □

现在用两次这个引理. 第一次在经典层面: 第一篇已证 $[\boldsymbol{G}_x, \boldsymbol{G}_y] = \boldsymbol{G}_z$, 取 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{G}_x$, $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{G}_y$, 并写 $\mathrm{e}^{\varepsilon \boldsymbol{G}_x} \mathrm{e}^{\varepsilon \boldsymbol{G}_y} \mathrm{e}^{-\varepsilon \boldsymbol{G}_x} \mathrm{e}^{-\varepsilon \boldsymbol{G}_y} = \mathrm{e}^{\varepsilon^2 \boldsymbol{G}_z} + O(\varepsilon^3)$, 即

$$\boldsymbol{R}_x(\varepsilon) \boldsymbol{R}_y(\varepsilon) \boldsymbol{R}_x(-\varepsilon) \boldsymbol{R}_y(-\varepsilon) = \boldsymbol{R}_z(\varepsilon^2) + O(\varepsilon^3) :$$

绕 x 轴与绕 y 轴的无穷小旋转的" 群对易子", 给出绕 z 轴的 ε^2 阶小旋转. 第二次在量子层面: 表示保持乘法, 把上式两边同时用 ρ 映过去:

$$\hat{U}_x(\varepsilon) \hat{U}_y(\varepsilon) \hat{U}_x(-\varepsilon) \hat{U}_y(-\varepsilon) = \hat{U}_z(\varepsilon^2) + O(\varepsilon^3),$$

其中 $\hat{U}_x(\varepsilon) = \hat{U}(\boldsymbol{R}_x(\varepsilon))$ 等. 左边用展开式(3.1): $\hat{U}_x(\varepsilon) = \hat{I} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varepsilon \hat{J}_x$, $\hat{U}_x(-\varepsilon) = \hat{I} + \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varepsilon \hat{J}_x$, 代入引理得

$$\hat{U}_x(\varepsilon)\hat{U}_y(\varepsilon)\hat{U}_x(-\varepsilon)\hat{U}_y(-\varepsilon) = \hat{I} - \frac{\varepsilon^2}{\hbar^2}[\hat{J}_x, \hat{J}_y] + O(\varepsilon^3).$$

右边展开: $\hat{U}_z(\varepsilon^2) = \hat{I} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\varepsilon^2\hat{J}_z + O(\varepsilon^4)$. 比较 ε^2 项:

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = \mathrm{i}\hbar\,\hat{J}_z.$$

循环置换下标, 得完整的对易代数:

Thm. 1　旋转生成元的对易关系

Hilbert 空间中的旋转生成元满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \mathrm{i}\hbar\,\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k, \tag{4.1}$$

即 $[\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{J}},\ \boldsymbol{b}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}] = \mathrm{i}\hbar\,(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\hat{\boldsymbol{J}}$.

Pf　上述推导: 经典群对易子恒等式 (引理 4.2) 给出 ε^2 阶的绕 z 轴旋转; 表示保持乘法把它映为算符等式; 两边分别用经典生成元关系 $[\boldsymbol{G}_x, \boldsymbol{G}_y] = \boldsymbol{G}_z$ (第一篇) 与量子无穷小展开(3.1) 展开, 比较 ε^2 项即得 $[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = \mathrm{i}\hbar\hat{J}_z$; 其余分量由循环置换与第一、三两个坐标轴的同类论证给出. □

这条定理是全篇最重要的结论, 其内容分三层. 第一, 三个生成元彼此不对易, 与第一篇 $[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk}G_k$ 结构相同: 经典非 Abel 性在无穷小层面的表现, 通过表示完整地进入了 Hilbert 空间. 第二, 系数从 ε_{ijk} 变成 $\mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}$: i 来自生成元的自伴化 (反自伴 $\hat{X}_i$ 换成自伴 $\hat{J}_i = \mathrm{i}\hbar\hat{X}_i$), $\hbar$ 来自量纲归一化; 结构常数 ε_{ijk} 本身没有变. 第三, 也是最要紧的:

对易关系不是假设

量子力学中的角动量型对易关系 $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k$ 不是额外假设, 而是 $SO(3)$ 的 Lie 代数结构 $[G_i, G_j] = \varepsilon_{ijk}G_k$ 通过表示映射进入 Hilbert 空间后的结果.

在 Lie 代数的语言里, 定理(4.1) 说: π 是 $\mathfrak{so}(3)$ 到 Hilbert 空间算符之集的 Lie 代数表示, 即

$$[\pi(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{G}),\ \pi(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{G})] = \pi\Big([\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{G},\ \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{G}]\Big) = \pi\Big((\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{G}\Big),$$

括号结构被严格保持. 代回去 (两边同乘 $-\hbar^2$) 就是(4.1) 的矢量形式. $\mathfrak{so}(3)$ 与 $\hat{\boldsymbol{J}}$ 代数之

间的这个同构, 是" 角动量算符是旋转的生成元" 这句话的数学内容.

4.3 Lie 群与 Lie 代数的对应

把两层的对应放在一起. 先需要一个关于单参子群的标准事实:

Lem. 2　单参子群由其生成元唯一决定

设 $\hat{A}$ 是算符. 初值问题

$$\frac{\mathrm{d}\hat{U}(t)}{\mathrm{d}t} = \hat{A}\hat{U}(t), \qquad \hat{U}(0) = \hat{I}$$

在算符意义下有唯一解 $\hat{U}(t) = \mathrm{e}^{t\hat{A}}$.

Pf　存在性: 对指数级数逐项求导得 $\mathrm{d}\,\mathrm{e}^{t\hat{A}}/\mathrm{d}t = \hat{A}\mathrm{e}^{t\hat{A}}$, 且 $\mathrm{e}^{0} = \hat{I}$. 唯一性: 若 $\hat{V}(t)$ 也是解, 则 $\mathrm{d}\left(\mathrm{e}^{-t\hat{A}}\hat{V}(t)\right)/\mathrm{d}t = -\hat{A}\mathrm{e}^{-t\hat{A}}\hat{V}(t) + \mathrm{e}^{-t\hat{A}}\hat{A}\hat{V}(t) = 0$ (两个算符都与 $\mathrm{e}^{-t\hat{A}}$ 可交换), 故 $\mathrm{e}^{-t\hat{A}}\hat{V}(t)$ 恒等于其初值 $\hat{I}$, 即 $\hat{V}(t) = \mathrm{e}^{t\hat{A}}$. □

Prop. 1　群表示与代数表示的对应

设 $\rho\colon SO(3) \to U(\mathscr{H})$ 是幺正表示, π 是它诱导的代数表示. 则对 $\boldsymbol{X} \in \mathfrak{so}(3)$,

$$\rho\left(\mathrm{e}^{\boldsymbol{X}}\right) = \mathrm{e}^{\pi(\boldsymbol{X})}.$$

即: 先指数映射再表示, 等于先表示再指数映射. 对连通 Lie 群, 表示 ρ 完全由 π 决定.

Pf　固定 $\boldsymbol{X} \in \mathfrak{so}(3)$. 映射 $t \mapsto \rho(\mathrm{e}^{t\boldsymbol{X}})$ 是 $U(\mathscr{H})$ 中的幺正单参子群 (ρ 保持乘法, $\mathrm{e}^{(s+t)\boldsymbol{X}} = \mathrm{e}^{s\boldsymbol{X}}\mathrm{e}^{t\boldsymbol{X}}$), 其生成元正是 $\pi(\boldsymbol{X})$ (π 的定义: 诱导生成元映射). 而 $t \mapsto \mathrm{e}^{t\pi(\boldsymbol{X})}$ 是以同一算符为生成元的单参子群. 由引理 4.3 的唯一性, 两者相等; 取 $t = 1$ 得 $\rho(\mathrm{e}^{\boldsymbol{X}}) = \mathrm{e}^{\pi(\boldsymbol{X})}$. 对连通群, 每个群元都是有限个指数的乘积, 故 ρ 由 π 完全决定. □

$$\begin{array}{ccc} SO(3) & \xrightarrow{\ \rho\ } & U(\mathscr{H}) \\ {\scriptstyle\exp}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\exp} \\ \mathfrak{so}(3) & \xrightarrow[\ \pi\ ]{} & \{\text{旋转生成元代数}\} \end{array} \tag{4.2}$$

(4.2) 是整篇的结构图: 顶行是有限旋转的对应 (群表示), 底行是无穷小旋转的对应 (Lie

代数表示), 两条竖线都是指数映射. 上一篇建立了左侧的对应 $SO(3) \leftrightarrow \mathfrak{so}(3)$; 本节的定理建立右侧的对应 $U(\mathscr{H}) \leftrightarrow \{\text{生成元代数}\}$; 表示条件保证整个方形可交换. 于是:

两层的对应

$SO(3) \longrightarrow$ Hilbert 空间旋转算符群,　　$\mathfrak{so}(3) \longrightarrow$ Hilbert 空间旋转生成元代数.

有限层面的群同构与无穷小层面的代数同构同步成立, 这正是" 旋转的表示" 一词的完整内容.

5

从生成元得到有限量子旋转

这一节对应第一篇的” 从生成元回到有限旋转”:固定转轴得到单参旋转算符群, 由无穷小生成元经指数映射恢复有限旋转算符, 并指出经典与量子使用的是同一个物理旋转参数.

5.1 固定轴旋转

固定转轴 $\boldsymbol{n}$. 由命题 2.2, $\theta \mapsto \hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)$ 满足

$$\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)\hat{U}(\boldsymbol{n},\varphi)=\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta+\varphi), \qquad \hat{U}(\boldsymbol{n},0)=\hat{I},$$

加上连续性 (命题 2.6), 它是 $U(\mathscr{H})$ 中的一个幺正单参子群: 群元素被一个连续参数 θ 标记, 参数可以相加. 这与第一篇的经典单参子群 $\theta \mapsto \boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$ 完全平行. 于是” 绕固定轴的旋转” 这个几何对象, 在 Hilbert 空间中实现为一族连续旋转算符; 这一族的全部内容由它的生成元 $\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}$ (第 3.2 节) 决定.

5.2 指数形式

Thm. 1　有限旋转算符的指数形式

对单位向量 $\boldsymbol{n}$ 与 $\theta\in\mathbb{R}$,

$$\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}/\hbar}. \tag{5.1}$$

Pf　把 $\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)$ 视为 θ 的函数. 由单参子群性质与(3.1),

$$\frac{\mathrm{d}\,\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)}{\mathrm{d}\theta}=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta+\varepsilon)-\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)}{\varepsilon}=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{\hat{U}(\boldsymbol{n},\varepsilon)-\hat{I}}{\varepsilon}\,\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}})\,\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta),$$

初值为 $\hat{U}(\boldsymbol{n},0)=\hat{I}$. 由引理 4.3 的唯一性, 解是 $\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}/\hbar}$. □

这个公式与第一篇的 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)=\mathrm{e}^{\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}}$ 逐字平行: 有限对称变换等于生成元的指数. 差别只在两点: 指数中的 i 与 $1/\hbar$ (由自伴生成元的归一化带来), 以及作用对象 (算符与矩阵,

分别作用在 $\mathscr{H}$ 与 $\mathbb{R}^3$ 上). 由指数形式立即得到 $\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)$ 的幺正性 ($\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}$ 自伴, 指数给出幺正算符), 这与第 2.4 节一致.

把有限旋转切成 N 份再复合, 也能得到同一公式: 由单参子群性质, $\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta) = \hat{U}(\boldsymbol{n},\theta/N)^N$, 每份用无穷小展开(3.1):

$$\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta) = \Big(\hat{I} - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\frac{\theta}{N}\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}} + O\Big(\frac{1}{N^2}\Big)\Big)^N \xrightarrow[N\to\infty]{} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}/\hbar},$$

其中最后一步用第一篇的乘积极限 $\lim(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{X}/N)^N = \mathrm{e}^{\boldsymbol{X}}$. 两种推导给出同一结果: 有限量子旋转是无穷小生成元的积累.

5.3 轴角参数

经典旋转与量子旋转使用的是同一个物理旋转参数. 一个旋转由转轴 $\boldsymbol{n}$ 与转角 θ 完全确定 (第一篇的轴角表示); 在量子层面, 同一个 $(\boldsymbol{n},\theta)$ 进入指数 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}/\hbar}$: 转轴进入生成元 $\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}$, 转角是参数本身. 也就是说, 参数化不因空间而变: 旋转的几何数据 $(\boldsymbol{n},\theta)$ 是唯一的, 变的只是它实现的空间与方式. 上一篇与这一篇因此形成完全平行的结构:

$SO(3)$ 中的旋转 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)=\mathrm{e}^{\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}}$	$\longrightarrow$	$\mathscr{H}$ 旋转算符 $\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}/\hbar}$
$\downarrow$		$\downarrow$
$\mathfrak{so}(3)$ 生成元 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}$		自伴生成元 $\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}$

(5.2)

两列的每一项逐行对应: 有限旋转对有限旋转算符, 经典生成元对量子生成元, 指数映射对指数映射. 这就是第 4.3 节对应关系在轴角参数下的具体形式.

5.4 Euler 角

第一篇证明了任意旋转可以分解为三次基本旋转 (zyz 约定):

$$\boldsymbol{R}(\alpha,\beta,\gamma) = \boldsymbol{R}_z(\alpha)\boldsymbol{R}_y(\beta)\boldsymbol{R}_z(\gamma).$$

表示保持乘法, 把等式两边同时映到 Hilbert 空间, 立即得到 Euler 角的量子版本:

Prop. 1　Euler 角的量子版本

$$\hat{U}(\alpha,\beta,\gamma) := \hat{U}\Big(\boldsymbol{R}(\alpha,\beta,\gamma)\Big) = \hat{U}_z(\alpha)\,\hat{U}_y(\beta)\,\hat{U}_z(\gamma) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha\hat{J}_z/\hbar}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\beta\hat{J}_y/\hbar}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma\hat{J}_z/\hbar},$$

乘积次序与经典完全一致 (从右往左: 自转, 章动, 进动).

Pf　第一个等号是定义; 第二个等号由表示条件与 Euler 分解逐项保持; 第三个等号由指数形式(5.1) 逐项代入. □

注意参数化的退化不影响算符本身: 万向锁 ($\beta = 0$ 或 π) 是坐标选取的奇点, 转动算符 $\hat{U}(\alpha,\beta,\gamma)$ 在 $\beta = 0$ 处完全正常, 只是同一算符有无穷多种 Euler 角描述 (第一篇第 3.3 节). 本篇只需要 Euler 角作为旋转算符的一种参数化, 第三篇将用到它在固定 j 空间中的矩阵元.

Part III

为什么需要 SU(2)

本部分提出一个特殊问题: $SO(3)$ 的普通表示中, 转 2π 的算符恒为恒等算符; 但量子物理允许 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, 2\pi) = -\hat{I}$ 的结构存在, 这种结构不能作为 $SO(3)$ 的普通表示出现. 由此自然引入 $SU(2)$: 它与 $SO(3)$ 局部结构相同 (Lie 代数同构) 而全局结构不同 (双覆盖), 使这些表示能够作为普通表示出现.

内容概要

- 理解普通表示中 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, 2\pi) = \hat{I}$ 是必然的, 以及为何量子物理允许 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, 2\pi) = -\hat{I}$.
- 掌握 $SU(2)$ 的定义与三参数结构, 理解 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的二对一满同态及其核.
- 掌握 $\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$ 的同构: 结构常数相同, 指数参数空间是 $SO(3)$ 的两倍.
- 理解 2π 与 4π: 在 $SU(2)$ 中转 4π 才回到单位元.

6

一个重要问题: 这种表示是否已经包含所有量子旋转

到目前为止, 本篇建立的图景是: 空间旋转 $R \in SO(3)$ 通过普通幺正表示 ρ 实现为旋转算符 $\hat{U}(\boldsymbol{R})$. 一个自然的问题是: 这样的普通表示是否已经穷尽量子力学中一切允许的旋转结构?

普通表示有一个必然推论: 转 2π 的旋转算符恒为恒等算符. 因为经典中 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n}, 2\pi) = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{n}, 0) = \boldsymbol{I}$ (第一篇: 转角加 2π 给出同一个旋转), 由表示条件,

$$\hat{U}(\boldsymbol{n}, 2\pi) = \hat{U}\Big(\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n}, 2\pi)\Big) = \hat{U}(\boldsymbol{I}) = \hat{I}.$$

这是普通表示无法绕过的: 只要 $\hat{U}$ 是 $SO(3)$ 上的单值函数, 2π 旋转就必须回到恒等算符.

但量子物理并没有理由要求 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, 2\pi) = \hat{I}$. 关键在于量子态由射线描述: 右矢 $|\psi\rangle$ 与 $-|\psi\rangle$ 代表同一个物理状态, 一切测量概率 $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ 在整体符号下不变. 因此, 一个满足下列条件的连续幺正族

$$\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta)\hat{U}(\boldsymbol{n}, \varphi) = \hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta + \varphi) \quad (\text{局部}), \qquad \hat{U}(\boldsymbol{n}, 0) = \hat{I}, \qquad \hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta + 2\pi) = -\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta)$$

在物理上完全自洽: 它给出绕轴 $\boldsymbol{n}$ 旋转的全部内容, 转 2π 后算符差一个整体符号, 而整体符号不影响任何可观测量. 这样的族与 $SO(3)$ 的旋转在无穷小层面不可区分 (局部结构相同), 却不可能来自 $SO(3)$ 的普通表示 – 因为在普通表示中 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, 2\pi)$ 恒等于 $\hat{I}$.

问题

某些允许的量子旋转结构不能作为 $SO(3)$ 的普通单值表示出现: 转 2π 时它们给出 $-\hat{I}$ 而不是 $\hat{I}$. 于是自然提出: 是否存在一个与 $SO(3)$ 局部结构相同、但全局结构不同的群, 使这些表示能够作为普通表示出现?

直觉上的困难在于 2π: 要让 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, 2\pi) = -\hat{I} \neq \hat{U}(\boldsymbol{n}, 0)$ 与群乘法自洽, " 转角参数" 必须在一个 4π 才闭合的空间中取值: θ 与 $\theta + 4\pi$ 给出同一个群元, 而 $\theta + 2\pi$ 给出另一个群元 (符号相反). 也就是说, 需要的群其" 转角空间" 是 $SO(3)$ 的两倍: 局部与 $SO(3)$ 相同 (无穷小层面不可区分), 全局把 $SO(3)$ 的一个旋转展开成两个群元. 满足这些条件的群正是 $SU(2)$, 下一节构造它并验证它确实具有这些性质. 第 8 节的二维表示将提供一个具体实例: 它的 2π 旋转正是 $-\hat{I}$.

7

SU(2) 与 SO(3)

7.1 SU(2) 的定义

Def. 1 $SU(2)$

集合

$$SU(2)=\{\boldsymbol{U}\in\mathbb{C}^{2\times 2}\ \text{s.t.}\ \boldsymbol{U}^{\dagger}\boldsymbol{U}=\boldsymbol{I},\ \det\boldsymbol{U}=1\}$$

在矩阵乘法下构成群, 称为特殊幺正群 (special unitary group). 它是全体行列式为 1 的 2×2 幺正矩阵.

Prop. 1 一般形式与参数个数

每个 $\boldsymbol{U}\in SU(2)$ 可以唯一地写成

$$\boldsymbol{U}=\begin{pmatrix} a & b \\ -b^{*} & a^{*}\end{pmatrix},\qquad |a|^{2}+|b|^{2}=1,$$

因而由三个实参数标记: 复参数 a,b 各两个实参数, 受约束 $|a|^{2}+|b|^{2}=1$ 减一个. $SU(2)$ 是非 Abel 群.

Pf 由 $\det\boldsymbol{U}=1$, $\boldsymbol{U}^{-1}$ 是 $\boldsymbol{U}$ 的伴随矩阵: $\boldsymbol{U}^{-1}=\begin{pmatrix} u_{22} & -u_{12} \\ -u_{21} & u_{11}\end{pmatrix}$; 又 $\boldsymbol{U}^{-1}=\boldsymbol{U}^{\dagger}$ (幺正), 比较矩阵元: $\overline{u_{11}}=u_{22}$, $\overline{u_{12}}=-u_{21}$, 即得一般形式, 其中 $|a|^{2}+|b|^{2}=\det\boldsymbol{U}=1$. 非 Abel: 例如 $\boldsymbol{U}_{1}=\begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i}\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{U}_{2}=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0\end{pmatrix}$ 都满足幺正与行列式条件, 但 $\boldsymbol{U}_{1}\boldsymbol{U}_{2}=\begin{pmatrix} 0 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{U}_{2}\boldsymbol{U}_{1}=\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ -\mathrm{i} & 0\end{pmatrix}$ 不等. □

$SU(2)$ 与 $SO(3)$ 一样, 是连续依赖三个参数的 Lie 群. 下一小节将证明两者在无穷小层面有相同的结构; 这里先注意一个初步迹象: 三个实参数, 且同为由矩阵条件定义的连续群.

7.2 SU(2) 与 SO(3) 的联系

现在构造 $SU(2)\to SO(3)$ 的映射. 需要三个 2×2 Hermitian 矩阵 (其性质第 8 节系统研究):

$$\hat\sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \hat\sigma_2=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}&0\end{pmatrix},\qquad \hat\sigma_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

对实向量 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$, 记 $\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}=a_1\hat\sigma_1+a_2\hat\sigma_2+a_3\hat\sigma_3$. 每个 $\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}$ 都是 Hermitian 无迹矩阵; 反之每个 2×2 Hermitian 无迹矩阵都唯一地写成这个形式 (三个实分量).

Prop. 2　双覆盖映射的存在

对 $\boldsymbol{U}\in SU(2)$ 与任意 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^3$, 矩阵 $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})\boldsymbol{U}^\dagger$ 仍是 Hermitian 无迹矩阵, 故存在唯一的实矩阵 $\pi(\boldsymbol{U})\in\mathbb{R}^{3\times 3}$ 使

$$\boldsymbol{U}(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})\boldsymbol{U}^\dagger=(\pi(\boldsymbol{U})\boldsymbol{a})\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}\qquad \text{对一切}\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^3. \tag{7.1}$$

映射 $\pi:\ SU(2)\to\mathbb{R}^{3\times 3}$ 取值于 $SO(3)$, 是满的群同态, 且核为 $\ker\pi=\{\pm\boldsymbol{I}\}$: 它是二对一映射. 因此

$$SO(3)\cong SU(2)/\{\pm\boldsymbol{I}\}.$$

Pf　分四步. 第一步 (像仍在同一空间): $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})\boldsymbol{U}^\dagger$ 的 Hermitian 性由 $(\boldsymbol{AB})^\dagger=\boldsymbol{B}^\dagger\boldsymbol{A}^\dagger$ 与 $\hat\sigma_i^\dagger=\hat\sigma_i$ 直接得到; 无迹性由 $\mathrm{Tr}\big(\boldsymbol{U}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}^\dagger\big)=\mathrm{Tr}\,\boldsymbol{A}=0$ 得到. 故它等于某个 $(\boldsymbol{R}\boldsymbol{a})\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, 定义 $\pi(\boldsymbol{U})\boldsymbol{a}=\boldsymbol{R}\boldsymbol{a}$; 由展开的唯一性, $\pi(\boldsymbol{U})$ 是良定义的线性映射. 第二步 (正交性): 取行列式, 用 $\det(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})=-|\boldsymbol{a}|^2$ (直接计算: $\det(a_1\hat\sigma_1+a_2\hat\sigma_2+a_3\hat\sigma_3)=-(a_1^2+a_2^2+a_3^2)$): $|\pi(\boldsymbol{U})\boldsymbol{a}|^2=|\boldsymbol{a}|^2$ 对一切 $\boldsymbol{a}$ 成立, 故 $\pi(\boldsymbol{U})$ 正交. 第三步 (行列式): 任何 $\boldsymbol{U}\in SU(2)$ 都可以连续连接到 $\boldsymbol{I}$ (沿一般形式中的参数 a,b 连续变化到 $a=1,b=0$), 于是 $\pi(\boldsymbol{U})$ 连续地连接到 $\pi(\boldsymbol{I})=\boldsymbol{I}$; 而 $\det\pi(\boldsymbol{U})$ 连续且只取 ±1, 故恒为 1: $\pi(\boldsymbol{U})\in SO(3)$. 第四步 (同态与核): 同态性由 $\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{U}_2(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{U}_2)^\dagger=\boldsymbol{U}_1\big(\pi(\boldsymbol{U}_2)\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}\big)\boldsymbol{U}_1^\dagger$ 逐项读出; 核: 若 $\pi(\boldsymbol{U})=\boldsymbol{I}$, 则

$\boldsymbol{U}$ 与三个 $\hat{\sigma}_i$ 都交换, 代入一般形式 $\boldsymbol{U}=\begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix}$ 与 $\hat{\sigma}_1$ 的交换条件解得 $b=0$ 且 a 为实数, $|a|^2=1$, 故 $\boldsymbol{U}=\pm\boldsymbol{I}$. 满射性: 下一命题给出 π 的显式像覆盖一切旋转. □

Prop. 3　指数的对应

对单位向量 $\boldsymbol{n}$ 与 $\theta\in\mathbb{R}$, 令

$$\boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta):=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}/2}\in SU(2).$$

则

$$\pi\Big(\boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta)\Big)=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta),$$

即 $SU(2)$ 中转角为 θ 的元素在 π 下的像, 正是 $SO(3)$ 中绕同一轴转同一角的旋转矩阵. 由于每个 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$ 都由此给出, π 是满射.

Pf　用恒等式 $(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{b}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{I}+\mathrm{i}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}$ (第 8.2 节给出完整证明; 这里由 $\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_j=\delta_{ij}\boldsymbol{I}+\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k$ 直接展开). 取 $\boldsymbol{U}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}/2}$, 由 $(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})^2=\boldsymbol{I}$ 把指数展开为 $\boldsymbol{U}=\cos(\theta/2)\boldsymbol{I}-\mathrm{i}\sin(\theta/2)\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}$. 记 $c=\cos(\theta/2)$, $s=\sin(\theta/2)$, 计算共轭:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{U}(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})\boldsymbol{U}^\dagger&=(c\boldsymbol{I}-\mathrm{i}s\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(c\boldsymbol{I}+\mathrm{i}s\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})\\&=c^2(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})+\mathrm{i}cs\Big[(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})-(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})\Big]+s^2(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}).\end{aligned}$$

第二项: 由乘法恒等式, 方括号内 $=2\mathrm{i}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{n})\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, 故该项 $=\sin\theta\,(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{a})\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}$. 第三项: 先算 $(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})=(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{I}+\mathrm{i}(\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{a})\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, 再与 $(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})$ 相乘 (同样用恒等式), 得

$$(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})=2(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a})(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})-(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}).$$

合并三项, $\hat{\boldsymbol{\sigma}}$ 的线性部分为

$$\Big(\cos\theta\,\boldsymbol{a}+(1-\cos\theta)(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{n}+\sin\theta\,\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{a}\Big)\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}},$$

由第一篇的 Rodrigues 公式, 括号内正是 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)\boldsymbol{a}$; 由展开的唯一性得 $\pi(\boldsymbol{U})=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$. □

综合两个命题: 每个 $SO(3)$ 旋转对应 $SU(2)$ 中恰好两个元素, 它们相差一个符号:

$$\boxed{\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta) \;\longleftrightarrow\; \pm \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}/2}} \tag{7.2}$$

这是因为 $\pi(\boldsymbol{U}) = \pi(-\boldsymbol{U})$ (共轭作用中符号相消), 且核只有 $\{\pm\boldsymbol{I}\}$. $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 是不同构的两个群: 一个 $SO(3)$ 旋转对应两个 $SU(2)$ 群元; 但下一小节将看到, 它们在无穷小层面具有相同的 Lie 代数结构. 这就是" 局部相同, 全局不同" 的精确内容.




图 2: 双覆盖: $SU(2)$ 的两个群元 $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta)$ 与 $-\boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta)$ 经 π 映为同一个旋转 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$; 每个 $SO(3)$ 旋转恰好有两个 $SU(2)$ 原像, 相差一个符号.

7.3 su(2) 与 so(3)

$SU(2)$ 的 Lie 代数由单位元处的无穷小生成元组成. 由 $\boldsymbol{U}^\dagger\boldsymbol{U} = \boldsymbol{I}$ 与 $\det\boldsymbol{U} = 1$, 经过单位元的曲线 $\boldsymbol{U}(t)$ 满足 $\dot{\boldsymbol{U}}(0)^\dagger = -\dot{\boldsymbol{U}}(0)$ 且 $\mathrm{Tr}\,\dot{\boldsymbol{U}}(0) = 0$ (与第一篇正交条件的求导完全平行): 生成元是反 Hermitian 无迹矩阵. 三维实向量空间

$$\mathfrak{su}(2) = \{\boldsymbol{X} \in \mathbb{C}^{2\times 2} \text{ s.t. } \boldsymbol{X}^\dagger = -\boldsymbol{X},\ \mathrm{Tr}\,\boldsymbol{X} = 0\}$$

以 $\boldsymbol{T}_i := -\dfrac{\mathrm{i}}{2}\hat{\sigma}_i$ $(i = 1,2,3)$ 为基: 每个 $\boldsymbol{T}_i$ 反 Hermitian 无迹, 且三个线性无关 ($\hat{\sigma}_i$ 线性无关). 关键在于结构常数:

Prop. 4 $\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$

基 $\boldsymbol{T}_i = -\frac{\mathrm{i}}{2}\hat{\sigma}_i$ 满足

$$[\boldsymbol{T}_i, \boldsymbol{T}_j] = \varepsilon_{ijk}\boldsymbol{T}_k,$$

与 $\mathfrak{so}(3)$ 的基 $\boldsymbol{G}_i$ 满足同一组对易关系 $[\boldsymbol{G}_i, \boldsymbol{G}_j] = \varepsilon_{ijk}\boldsymbol{G}_k$ (第一篇). 因此线性映射 $\boldsymbol{T}_i \mapsto \boldsymbol{G}_i$ 是 Lie 代数同构:

$$\boxed{\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)}$$

Pf 由显式矩阵直接计算 $\hat{\sigma}_1\hat{\sigma}_2 = \mathrm{i}\hat{\sigma}_3$ (以及循环情形; $\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_j = -\hat{\sigma}_j\hat{\sigma}_i$ 对 $i \neq j$), 故 $[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k$; 于是

$$[\boldsymbol{T}_i, \boldsymbol{T}_j] = \left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\right)^2 [\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = -\frac{1}{4}\cdot 2\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k = \varepsilon_{ijk}\left(-\frac{\mathrm{i}}{2}\hat{\sigma}_k\right) = \varepsilon_{ijk}\boldsymbol{T}_k.$$

两边取 $\boldsymbol{T}_k \mapsto \boldsymbol{G}_k$ 的线性映射, 对易关系形式不变, 故它是同构. □

$$\boxed{\mathrm{e}^{\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{T}} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}/2} = \boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta) \xrightarrow{\pi} \boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta) = \mathrm{e}^{\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}}} \tag{7.3}$$

(7.3) 是双覆盖在指数层面的完整对应: 两个群有同构的生成元代数, 生成元的指数在 $SU(2)$ 中给出 $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta)$, 在 $SO(3)$ 中给出 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$; π 把前者映为后者. 这就解释了为什么 $SU(2)$ 能够描述空间旋转的无穷小结构: 无穷小层面只有对易关系 $[\boldsymbol{T}_i, \boldsymbol{T}_j] = \varepsilon_{ijk}\boldsymbol{T}_k$ 与 $[\boldsymbol{G}_i, \boldsymbol{G}_j] = \varepsilon_{ijk}\boldsymbol{G}_k$, 两者完全相同; 两个群的差别只在全局: 指数参数空间的大小.

7.4 2π 与 4π

由 $(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})^2 = \boldsymbol{I}$, 指数可以精确求和 (第 8.2 节将系统证明):

$$\boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}/2} = \cos\frac{\theta}{2}\boldsymbol{I} - \mathrm{i}\sin\frac{\theta}{2}\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}.$$

代入 $\theta + 2\pi$:

$$\cos\frac{\theta+2\pi}{2} = \cos\left(\frac{\theta}{2}+\pi\right) = -\cos\frac{\theta}{2}, \qquad \sin\frac{\theta+2\pi}{2} = -\sin\frac{\theta}{2},$$

故

$$\boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta+2\pi)=-\boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta),\qquad \boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta+4\pi)=\boldsymbol{U}(\boldsymbol{n},\theta). \tag{7.4}$$

在 $SO(3)$ 中, $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta+2\pi)=\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$ (第一篇: 转角周期为 2π); 在 $SU(2)$ 中, 转角周期是 4π: 转 2π 到达 $-\boldsymbol{I}$ (对径点), 再转 2π 才回到 $\boldsymbol{I}$. 这正是" 双覆盖" 的直观内容: $SU(2)$ 的转角空间是 $SO(3)$ 的转角空间的两倍, 前者把后者的每个旋转展开成两个对径的群元.




图 3: 2π 与 4π: $SU(2)$ 的转角参数在 $[0,4\pi)$ 上取值, 覆盖 $SO(3)$ 的转角参数 $[0,2\pi)$ 两次; 转 2π 时 $SU(2)$ 到达 $-\boldsymbol{I}$ (对径点), 转 4π 才回到 $\boldsymbol{I}$, 而 $SO(3)$ 中 2π 已回到恒等旋转.

对量子旋转算符, (7.4) 回答第 6 节的问题: 若旋转由 $SU(2)$ 的普通表示实现, 则 $\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta+2\pi)=\pm\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta)$ 是可能的 – 对 $\theta=0$ 来说, 转 2π 的算符可以是 $-\hat{I}$ 而不是 $\hat{I}$, 这正是一个普通表示中无法出现的结构. 具体的符号由表示决定: 若表示把 $-\boldsymbol{I}\in SU(2)$ 映为 $+\hat{I}$ (整数型), 则 2π 回到恒等; 若映为 $-\hat{I}$ (半整数型), 则出现符号. 下一节的二维表示属于第二种类型.

Part IV

SU(2) 的二维表示: Pauli 矩阵与 S 型生成元

本部分从一般表示转入最重要的特殊情况: 二维表示. 先说明 $SU(2)$ 如何作用在二维复向量空间上, 再系统研究 Pauli 矩阵的纯数学性质 (Hermitian 性, 平方关系, 对易与反对易关系, 迹与行列式), 说明 Pauli 矩阵与 $\mathfrak{su}(2)$ 的关系, 并按量子旋转生成元的统一规范定义 S 型生成元; 最后讨论一般表示与二维表示的关系.

内容概要

- 掌握 $SU(2)$ 在 $\mathbb{C}^2$ 上的二维幺正表示及其不可约性.
- 会完整推导 Pauli 矩阵的代数性质: $\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_j = \delta_{ij}\boldsymbol{I} + \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k$, 对易, 反对易, 迹与行列式.
- 理解 Pauli 矩阵是 $\mathfrak{su}(2)$ 的生成元 (基 $\boldsymbol{T}_i = -\mathrm{i}\hat{\sigma}_i/2$), 而不是 $SU(2)$ 的群元.
- 掌握 S 型生成元 $\hat{S}_i = \hbar\hat{\sigma}_i/2$ 满足 $[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{S}_k$, 与一般旋转生成元代数结构相同.

8

SU(2) 的特殊二维表示

8.1 二维表示空间

$SU(2)$ 的元素是 2×2 矩阵, 它们自然地作用在二维复向量空间 $\mathbb{C}^2$ 上: 对列向量 $|\chi\rangle \in \mathbb{C}^2$, 定义

$$\rho_2(\boldsymbol{U})\,|\chi\rangle := \boldsymbol{U}\,|\chi\rangle\,,$$

即矩阵乘法. $\mathbb{C}^2$ 配标准内积 $\langle\phi|\chi\rangle = \sum_a \overline{\phi_a}\chi_a$ 成为二维 Hilbert 空间. 由于 $\boldsymbol{U}^\dagger\boldsymbol{U} = \boldsymbol{I}$, 内积被保持: $\langle\boldsymbol{U}\phi|\boldsymbol{U}\chi\rangle = \langle\phi|\chi\rangle$, 故 ρ_2 是幺正表示. 它显然保持乘法 $(\rho_2(\boldsymbol{U}_1)\rho_2(\boldsymbol{U}_2) = \rho_2(\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{U}_2))$, 且是忠实的: 若 $\boldsymbol{U}\,|\chi\rangle = |\chi\rangle$ 对一切 $|\chi\rangle$ 成立, 则 $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{I}$. 表示空间维数为 2, 这是" 二维表示" 一词的来源.

$\mathbb{C}^2$ 中的向量是抽象的二分量复向量; 本篇不赋予它们任何物理解释 (例如" 自旋向上/向下"), 只是把 $\mathbb{C}^2$ 当作 $SU(2)$ 作用的表示空间.

8.2 Pauli 矩阵

Def. 1 Pauli 矩阵

三个 2×2 矩阵

$$\hat{\sigma}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \hat{\sigma}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \hat{\sigma}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

称为 Pauli 矩阵. 对向量 $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$, 记 $\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}} = a_1\hat{\sigma}_1 + a_2\hat{\sigma}_2 + a_3\hat{\sigma}_3$.

Prop. 1 Pauli 矩阵的代数性质

Pauli 矩阵满足: (a) Hermitian 性: $\hat{\sigma}_i^\dagger = \hat{\sigma}_i$; (b) 平方关系: $\hat{\sigma}_i^2 = \boldsymbol{I}$, 本征值为 ± 1; (c) 乘积公式: $\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_j = \delta_{ij}\boldsymbol{I} + \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k$, 由此

$$[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k, \qquad \{\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j\} = 2\delta_{ij}\boldsymbol{I}$$

(对易与反对易关系); (d) 迹与行列式: $\operatorname{Tr}\hat{\sigma}_i = 0$, $\det\hat{\sigma}_i = -1$; (e) 点乘公式: $(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})(\boldsymbol{b}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}) = (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{I} + \mathrm{i}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, 特别地 $(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})^2 = \boldsymbol{I}$ 对单位向量 $\boldsymbol{n}$ 成立; (f) 基定理: $\{\boldsymbol{I}, \hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2, \hat{\sigma}_3\}$ 构成 $\mathbb{C}^{2\times 2}$ 的基, 且 $\operatorname{Tr}(\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_j) = 2\delta_{ij}$.

Pf (a) 逐项取共轭转置即得. (b) 直接平方: $\hat{\sigma}_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 其余同理; 由 $\hat{\sigma}_i^2 = \boldsymbol{I}$ 且 $\operatorname{Tr}\hat{\sigma}_i = 0$ (见 (d)), 本征值 λ 满足 $\lambda^2 = 1$ 与 $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$, 故为 ± 1. (c) 先算非对角情形, 例如 $\hat{\sigma}_1\hat{\sigma}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix} = \mathrm{i}\hat{\sigma}_3$; 循环置换得其余两组. 对角情形由 (b) 给出: $\hat{\sigma}_i^2 = \boldsymbol{I} = \delta_{ii}\boldsymbol{I}$. 合起来就是乘积公式; 对 $i \neq j$ 由 $\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_j = \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k = -\hat{\sigma}_j\hat{\sigma}_i$ 相加减得对易与反对易; 对 $i = j$ 由 $\hat{\sigma}_i^2 = \boldsymbol{I}$ 得 $[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_i] = 0$, $\{\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_i\} = 2\boldsymbol{I}$. (d) 逐项读出行列式与迹. (e) 由 (c) 展开双线性组合: $\sum_{ij} a_i b_j(\delta_{ij}\boldsymbol{I} + \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k) = (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{I} + \mathrm{i}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}$. (f) 四个矩阵线性无关 (由 (d) 的迹与对角结构直接看出), 而 $\mathbb{C}^{2\times 2}$ 是四维复空间, 故成基; 迹公式由 (c) 取迹: $\operatorname{Tr}(\hat{\sigma}_i\hat{\sigma}_j) = \delta_{ij}\operatorname{Tr}\boldsymbol{I} + \mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\operatorname{Tr}\hat{\sigma}_k = 2\delta_{ij}$. □

Eg. 1 Pauli 矩阵的显式计算

由 (c) 立即得到 $\hat{\sigma}_1\hat{\sigma}_2 = \mathrm{i}\hat{\sigma}_3$, $\hat{\sigma}_2\hat{\sigma}_3 = \mathrm{i}\hat{\sigma}_1$, $\hat{\sigma}_3\hat{\sigma}_1 = \mathrm{i}\hat{\sigma}_2$ (循环), 以及 $[\hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2] = 2\mathrm{i}\hat{\sigma}_3$ 等; 而 $(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})^2 = \boldsymbol{I}$ 是第 7.4 节指数求和的依据.

性质 (f) 说明 Pauli 矩阵是 2×2 矩阵世界中的标准基: 任何 2×2 复矩阵都唯一地写成 $x_0\boldsymbol{I} + \boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}$, 其中 $x_0 = \operatorname{Tr}\boldsymbol{A}/2$, $a_i = \operatorname{Tr}(\hat{\sigma}_i\boldsymbol{A})/2$. 这些性质在后面将反复使用, 它们是二维表示的全部代数内容.

8.3 Pauli 矩阵与 su(2)

Pauli 矩阵与 $\mathfrak{su}(2)$ 的关系需要精确表述. 一方面, Pauli 矩阵本身不是 $SU(2)$ 的元素: $SU(2)$ 的元素幺正且行列式为 1, 而 $\det\hat{\sigma}_i = -1$. 另一方面, 它们也不是 $\mathfrak{su}(2)$ 的元素:

$\mathfrak{su}(2)$ 由反 Hermitian 无迹矩阵组成, 而 $\hat{\sigma}_i$ 是 Hermitian 的. 真正属于 $\mathfrak{su}(2)$ 的基是第 7.3 节的

$$\boldsymbol{T}_i = -\frac{\mathrm{i}}{2}\hat{\sigma}_i, \qquad \boldsymbol{T}_i^\dagger = -\boldsymbol{T}_i, \quad \operatorname{Tr}\boldsymbol{T}_i = 0, \qquad [\boldsymbol{T}_i, \boldsymbol{T}_j] = \varepsilon_{ijk}\boldsymbol{T}_k.$$

因此严格的说法是: Pauli 矩阵 (差一个常数因子 $-\mathrm{i}/2$) 生成 $\mathfrak{su}(2)$, 是 $\mathfrak{su}(2)$ 的生成元; 由它们经指数映射得到 $SU(2)$ 的群元 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}/2} \in SU(2)$.

生成元属于 Lie 代数

生成元属于 Lie 代数, 不属于 Lie 群本身: $\boldsymbol{T}_i \in \mathfrak{su}(2)$ 经指数映射生成 $\mathrm{e}^{\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{T}} \in SU(2)$. 物理文献常说"$SU(2)$ 的生成元是 $\hat{\sigma}_i/2$", 这是省略了" 无穷小" 的简写: $\hat{\sigma}_i/2$ 通过 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\hat{\sigma}_i/2}$ 决定群元, 因而是 $SU(2)$ 旋转的无穷小生成元. 与第一篇对照: $\boldsymbol{G}_i$ 是 $\mathfrak{so}(3)$ 的生成元, $\mathrm{e}^{\theta\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}}$ 是 $SO(3)$ 的群元; 两层结构完全平行.

8.4 定义 S 型生成元

按照量子旋转生成元的统一规范 (第 3.3 节: 自伴生成元 $\hat{J}_i$, 指数形式 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}/\hbar}$), 把 Pauli 矩阵重新归一化:

Def. 2 S 型生成元

定义

$$\hat{S}_i := \frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_i, \qquad i = 1, 2, 3,$$

组成三元组 $\hat{\boldsymbol{S}} = (\hat{S}_1, \hat{S}_2, \hat{S}_3)$.

Prop. 2 S 型生成元的代数

$\hat{S}_i$ 是自伴算符 ($\hat{S}_i^\dagger = \hat{S}_i$), 满足

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = \mathrm{i}\hbar\,\varepsilon_{ijk}\hat{S}_k,$$

与一般旋转生成元 $\hat{\boldsymbol{J}}$ 的对易代数(4.1) 结构完全相同. 因此二维表示中的旋转算符写成统一规范的形式:

$$\hat{U}(\boldsymbol{n}, \theta) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}/\hbar} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}/2},$$

且 $\hat{U}(\boldsymbol{n}, 2\pi) = -\boldsymbol{I}$: 转 2π 得到负恒等算符.

Pf 自伴性: $\hat{S}_i^\dagger = (\hbar/2)\hat{\sigma}_i^\dagger = \hat{S}_i$. 对易关系:

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = \frac{\hbar^2}{4}[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = \frac{\hbar^2}{4} \cdot 2\mathrm{i}\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k = \mathrm{i}\hbar\, \varepsilon_{ijk}\frac{\hbar}{2}\hat{\sigma}_k = \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{S}_k.$$

归一化因子 $\hbar/2$ 正是为了使指数形式与一般旋转生成元统一: $\hat{\boldsymbol{S}}/\hbar = \hat{\boldsymbol{\sigma}}/2$, 故 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\, \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{S}}/\hbar} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\, \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}/2}$. 2π 行为: $\hat{U}(\boldsymbol{n}, 2\pi) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\, \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}} = \cos\pi\, \boldsymbol{I} - \mathrm{i}\sin\pi\, \boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}} = -\boldsymbol{I}$ (用 $(\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})^2 = \boldsymbol{I}$ 求和指数级数). □

本篇的立场

这是一组 $SU(2)$ 二维表示中的旋转生成元. 它们的全部内容: $\hat{\boldsymbol{S}}$ 满足与 $\hat{\boldsymbol{J}}$ 相同的代数, 指数给出二维表示中的旋转算符, 且 2π 旋转给出 $-\boldsymbol{I}$ – 正是第 6 节所说" 不能作为 $SO(3)$ 普通表示出现" 的结构的一个具体实例. 本篇不说它代表任何物理对象, 也不讨论测量; 这些是第三篇的主题.

9

一般表示与二维表示的关系

9.1 同一个旋转群可以有不同表示

群表示理论的基本观点是:群元没有变, 变的是它作用的表示空间以及对应的表示矩阵. 同一个旋转 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$ 可以在不同的空间中用不同维数的矩阵实现. 例如:

- 在 $\mathbb{R}^3$ 上: $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$ 本身是 3×3 矩阵 (第一篇, $SO(3)$ 的定义表示);
- 在 $\mathbb{C}$ 上: 每个旋转映为 1×1 矩阵 1 (平凡表示: 一切群元映为单位数);
- 在 $\mathbb{C}^2$ 上 (经 $SU(2)$): 旋转 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$ 的两个原像给出 2×2 矩阵 $\pm \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}/2}$.

这三个例子中," 旋转 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$" 始终是同一个几何对象; 变化的是表示空间 (三维实空间, 一维平凡空间, 二维复空间) 与表示矩阵 (3×3, 1×1, 2×2). 表示理论研究的正是同一群的全部这些" 化身" 以及它们之间的关系.

9.2 不同维数的表示

Def. 1 不可约表示

设 (ρ, V) 是群 G 的表示. 若 V 存在非平凡的不变子空间 W (即对一切 $g\in G$, $\rho(g)W\subseteq W$, 且 $W\neq\{0\}, V$), 则称表示可约; 否则称为不可约表示 (irreducible representation). 不可约表示是表示论的" 原子": 更复杂的表示由它们拼装而成.

$SU(2)$ 存在各个维数的不可约表示: 一维平凡表示, 二维表示 (第 8 节), 三维表示 (由双覆盖映射 π 给出: 把 $\pm\boldsymbol{U}$ 都映为 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta)$, 得到 $SU(2)$ 的三维不可约表示), 以及更高维的表示族. 这些表示的具体构造, 维数与量子数的对应, 是第三篇的内容; 本篇只需要存在性, 并指出二维表示是其中最简单的一个非平凡成员.

Prop. 1 二维表示不可约

$\mathbb{C}^2$ 上的二维表示 ρ_2 是不可约的.

Pf　反证. 若可约, 则存在一维不变子空间 $\mathrm{Span}\{|\chi\rangle\}$: 对一切 $\boldsymbol{U}\in SU(2)$, $\boldsymbol{U}|\chi\rangle\propto|\chi\rangle$, 即 $|\chi\rangle$ 是每个 $\boldsymbol{U}$ 的本征向量. 特别地取 $\boldsymbol{U}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\hat{\sigma}_1/2}$: $|\chi\rangle$ 必须是 $\hat{\sigma}_1$ 的本征向量 (对一切 θ 成立); 再取 $\boldsymbol{U}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\hat{\sigma}_2/2}$: $|\chi\rangle$ 又必须是 $\hat{\sigma}_2$ 的本征向量. 但 $\hat{\sigma}_1$ 与 $\hat{\sigma}_2$ 没有共同本征向量 ($\hat{\sigma}_1$ 的本征向量是 $(1,\pm1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$, $\hat{\sigma}_2$ 的本征向量是 $(1,\pm\mathrm{i})^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$, 方向不同), 矛盾. □

9.3　二维表示为什么特殊

二维表示的特殊性在于它是 $SU(2)$ 的最小非平凡表示: 一维表示只有平凡的相位结构, 二维表示是第一个能承载完整代数结构的表示, 而它承载的正是 Pauli 矩阵与 S 型生成元 (第 8.4 节). 从 2π 行为看, 二维表示的旋转算符满足 $\hat{U}(\boldsymbol{n},2\pi)=-\boldsymbol{I}$: 它属于第 6 节所说的" 半整数型" 结构, 是这种结构最具体的数学载体. 本篇只建立其数学上的可存在性: 这样的表示空间、这样的生成元代数、这样的 2π 符号, 全部由 $SU(2)$ 的群结构自然给出. 至于各种不可约表示的量子数、本征值、升降算符与它们的物理意义, 是第三篇的系统理论.

10

第二篇总结

本讲建立了两个平行映射.第一个在有限层面: 群表示把 $SO(3)$ 的每个旋转映为 Hilbert 空间中的幺正旋转算符,

$$\boxed{SO(3) \longrightarrow U(\mathscr{H})}: \qquad \boldsymbol{R} \longmapsto \hat{U}(\boldsymbol{R}), \qquad \hat{U}(\boldsymbol{R}_1)\hat{U}(\boldsymbol{R}_2) = \hat{U}(\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{R}_2),$$

把有限空间旋转变成 Hilbert 空间旋转算符. 第二个在无穷小层面: 表示诱导 Lie 代数表示, 把经典旋转生成元变成量子旋转生成元,

$$\boxed{\mathfrak{so}(3) \longrightarrow \text{旋转生成元代数}}: \qquad \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G} \longmapsto -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}, \qquad [\hat{J}_i, \hat{J}_j] = \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{J}_k,$$

对易结构被完整保持: 量子层面的角动量型对易关系不是假设, 而是 $SO(3)$ 的 Lie 代数结构通过表示进入 Hilbert 空间的结果. 两个层面由指数映射沟通: $\hat{U}(\boldsymbol{n},\theta) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{J}}/\hbar}$, 与经典的 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{n},\theta) = \mathrm{e}^{\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{G}}$ 逐字平行.

随后, $SO(3)$ 的全局结构引出 $SU(2)$: 普通表示中 2π 旋转恒为恒等, 而量子物理允许 $\hat{U}(2\pi) = -\hat{I}$ 的结构; $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 有相同的 Lie 代数 ($\mathfrak{su}(2) \cong \mathfrak{so}(3)$) 但全局不同 (二对一双覆盖, 转角空间是两倍, 4π 才闭合), 使这类结构能够作为普通表示出现. $SU(2)$ 的二维表示给出 Pauli 矩阵与 S 型生成元: 由 $\hat{S}_i = \hbar\hat{\sigma}_i/2$ 满足 $[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = \mathrm{i}\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{S}_k$, 指数给出二维旋转算符 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}/2}$.

整篇的逻辑链可以压缩为:

$$\boxed{SO(3) \longrightarrow \text{群表示} \longrightarrow \hat{U} \longrightarrow \text{无穷小生成元} \longrightarrow \text{Lie 代数表示} \longrightarrow SU(2) \longrightarrow \text{二维表示} \longrightarrow \text{Pauli 矩阵与 } S} \tag{10.1}$$

第三篇将回答(10.1) 的下一步: 这些目前只是" 旋转表示生成元" 的算符, 为什么在物理上会分别成为轨道角动量、自旋角动量和总角动量?