

Ingeniería de Sonido

Guía práctica de Física 1

Primera edición (v20230313)

Docentes a cargo:

Escobar, Margarita R.
mescobar@untref.edu.ar

Altamirano, Cecilia
semproaltamirano@gmail.com

Docentes adscriptos:

Malvicino, Maximiliano R.
malvicino32646@estudiantes.untref.edu.ar

Veiga, Ignacio
ignacioveigagiusti@mail.com

Introducción

Los ejercicios están clasificados con diferentes colores de la siguiente manera.

Ejercicio conceptual

Requieren un razonamiento que suele ser de carácter principalmente cualitativo. Ponen a prueba los conocimientos que son intuitivos contrastándolos con aquellos que no lo son.

Ejercicio fácil

Generalmente usados como ejemplos para introducir los temas o incorporar métodos de resolución.

Ejercicio intermedio

Diseñados para afianzar temas más complejos o profundizar un razonamiento analítico.

Ejercicio difícil

Abarcan varios temas, requieren conocer herramientas matemáticas determinadas y suelen ser usados como modelos de examen.

La versión más reciente de este texto puede ser descargada de:

https://github.com/RosarioEs/guias_fisica_1

<https://www.overleaf.com/read/ztdnzsbyvxb>

Para más información, visitar el sitio web de la materia:

<https://sites.google.com/site/untrefisica1sonido>

Índice general

1. Cinemática	1
1.1. Sistemas y marcos de referencia	1
1.2. Movimiento rectilíneo	4
1.2.1. Movimiento rectilíneo uniforme	4
1.2.2. Movimiento rectilíneo uniformemente variado	6
1.2.3. Movimiento rectilíneo genérico	14
1.3. Movimiento curvilíneo en el plano	15
1.3.1. Tiro parabólico	15
1.3.2. Movimiento circular	17
2. Dinámica	23
2.1. Generalidades del modelo de Newton	23
2.2. Pares de acción y reacción	24
2.3. Sistemas de un solo cuerpo	25
2.4. Sistemas de cuerpos vinculados	27
2.5. Dinámica circular	31
2.6. Fuerza de rozamiento	34
2.7. Fuerza elástica	37
2.8. Oscilaciones	38
3. Cantidad de movimiento y energía	43
3.1. Conservación de la cantidad de movimiento lineal	43
3.2. Trabajo	47
3.3. Conservación de la energía	50
A. Conocimientos previos de matemática	53
A.1. Trigonometría	53
A.2. Vectores	57
A.3. Derivadas e integrales	59

Capítulo 1

Cinemática

1.1. Sistemas y marcos de referencia

En física existen dos conceptos similares pero diferenciados para denominar al contexto de observación: marco de referencia (MR) y sistema de referencia (SR). La ciencia es una actividad humana que consiste en la observación e interpretación de fenómenos de la realidad. Ese observador interpreta la realidad tomando en cuenta el contexto de los eventos y todas las variables que puedan intervenir en el movimiento o cambio de ese fenómeno a la luz de su conciencia, en un contexto determinado históricamente.

Ejercicio 1.1

Marcos y sistemas de referencia

(a) Clasificá las afirmaciones a continuación y decidí si refiere a un MR o a un SR o a ambos. Ubicalas en la tabla abajo.

1. El lugar físico en donde se analizan los fenómenos, en particular, el movimiento.
2. Cada punto de él representa una posición.
3. Puede ser fijo o móvil respecto de otra cosa.
4. Su movimiento o no es relativo sólo puede definirse en relación a otro.
5. Se halla fijo respecto del observador dentro de él.
6. Contienen información sobre las características del espacio en el que ocurre el movimiento: si es cilíndrico, esférico plano, o euclídeo.
7. Pueden ser un tren, un departamento, un avión, un laboratorio, una plaza o un asiento en una montaña rusa.
8. El conocimiento científico es el análisis y la interpretación de aquello que se mide en él.
9. Un conjunto de coordenadas que representan el espacio.
10. El espacio representado a través de un conjunto de coordenadas.

SR	MR

(b) Ahora que ya ordenaste las definiciones. ¿Podés decir con tus palabras cuál es la diferencia entre un sistema de referencia y un marco de referencia?

Sistema de referencia:

Marco de referencia:

Ejercicio 1.2

Vectores posición, desplazamiento, velocidad y aceleración

Un insecto pasa caminando por el punto $\vec{K} = 2 \text{ cm } \hat{i} + 8 \text{ cm } \hat{j}$. Tres segundos más tarde pasa por el punto $\vec{L} = 11 \text{ cm } \hat{i} - 4 \text{ cm } \hat{j}$.

1. VECTOR POSICIÓN

- Marcá en una hoja los dos puntos.
- Dibujale un marco de referencia posible.
- Completar:
“El punto del sistema de referencia indica la ubicación del”
- Indicá en el dibujo un sistema de referencia y dibujá el vector posición del insecto en cada uno de los puntos.
- En el sistema de referencia anterior, dibujá una posible trayectoria para el insecto.
- ¿Cuántas trayectorias posibles existen?
- Completar:
“La trayectoria es la curva que representa”

2. VECTOR DESPLAZAMIENTO

- Dibujar el vector desplazamiento del insecto en el esquema del ejercicio anterior con un color diferente al del vector posición.
- Marcar las opciones correctas. El vector desplazamiento del insecto anterior se expresa como:
 - $\vec{K} - \vec{L} = -9 \text{ cm } \hat{i} + 12 \text{ cm } \hat{j}$

2) $\vec{L} - \vec{K} = 9 \text{ cm } \hat{i} - 12 \text{ cm } \hat{j}$

3) $\Delta\vec{r} = 9 \text{ cm } \hat{i} - 12 \text{ cm } \hat{j}$

4) $\Delta\vec{r} = 9 \text{ cm } \hat{i} + 4 \text{ cm } \hat{j}$

5) $\Delta\vec{r} = (9, -12, 0)$

6) $\Delta\vec{r} = (-9, 12)$

7) $\Delta\vec{r} = (9, -12)$

3. VELOCIDAD MEDIA E INSTANTÁNEA: DETERMINAR VERDADERO O FALSO O ELEGIR LA OPCIÓN CORRECTA SEGÚN CORRESPONDA.

- a) La velocidad media/instantánea es la pendiente de la recta tangente a la trayectoria en un punto.
- b) La velocidad media/instantánea es la pendiente de la recta tangente a la posición en función del tiempo.
- c) La velocidad media es igual al cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo transcurrido.
- d) La dirección y sentido de la velocidad media coincide con la dirección y sentido del vector desplazamiento.
- e) No se puede conocer la velocidad media del insecto del ejercicio anterior.
- f) Los vectores de velocidad se pueden dibujar en un espacio cartesiano que representa el espacio.
- g) Si la velocidad media del insecto es nula, significa que no se movió.
- h) Si la velocidad instantánea del insecto es nula, significa que el insecto no se mueve.
- i) No se puede conocer la velocidad media del insecto del ejercicio anterior.
- j) La velocidad media del insecto anterior es $\vec{v}_m = -3 \text{ cm/s } \hat{i} + 4 \text{ cm/s } \hat{j}$
- k) La velocidad media del insecto anterior es 5 m/s
- l) La única manera de conocer la velocidad instantánea del insecto es derivando la posición en función del tiempo.

4. ACELERACIÓN MEDIA E INSTANTÁNEA: DETERMINAR VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA.

- a) La aceleración es un vector que representa el cambio de la velocidad.
- b) Un cuerpo puede acelerarse sin la acción de otro cuerpo.
- c) La aceleración media coincide con la aceleración instantánea.
- d) La aceleración es un vector paralelo a la velocidad.
- e) Si la aceleración media de un insecto es cero, significa que el insecto no se trasladó.
- f) La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad instantánea.
- g) La aceleración media es el cociente entre la velocidad media entre dos puntos y el tiempo transcurrido en llegar de un punto al otro.
- h) Para conocer la aceleración, es necesario conocer antes la función velocidad.

Ejercicio 1.3

La población A de nuestra provincia de Buenos Aires está situada 160 km al este y 120 km al norte, con respecto a la ciudad M . La población B se sitúa 90 km al este y 120 km al sur, también con respecto a M .

1. Determiná el vector posición de las tres localidades.
2. Una avioneta sale de A a las 7 h, y llega a B a las 9 h. Escribí su vector desplazamiento.
3. En un esquema del lugar, dibujá dos trayectorias posibles diferentes, para cumplir el mismo viaje. ¿Cuántas hay?
4. Encontrá el vector velocidad media de la avioneta en su viaje de A hasta B , y calculá su módulo.
5. A las 9 : 30 h la avioneta despegue de B , y aterriza en M a las 11 h. Carga mercaderías y combustible y parte a las 15 h, para llegar a la población A a las 16 : 40 h. Encontrá el vector velocidad media de la avioneta en cada uno de los intervalos indicados, y también para todo el viaje (desde las 7 h hasta las 16 : 40 h).
6. Escribir la dirección de los vectores velocidad media calculados en el ítem anterior.

1.2. Movimiento rectilíneo**1.2.1. Movimiento rectilíneo uniforme****Ejercicio 1.4**

Un automóvil se desplaza con velocidad constante por una sección recta de la Ruta Provincial número 4, yendo desde la ciudad de Laboulaye a la estación Fray Cayetano Rodríguez.

1. Dibuje un sistema de referencia apropiado.
2. ¿Cuál es su velocidad media si recorre el trayecto de 15 km en 10 minutos?
3. A 7 kilómetros de Laboulaye, pasa por un lago. ¿Cuánto tiempo le tomó llegar al mismo?
4. ¿Cuál es su velocidad instantánea al momento de pasar por el lago?

Ejercicio 1.5

Una cuadrilla de empleados del ferrocarril viaja en una zorra por una vía rectilínea. En un instante dado, por la misma vía y a 180 m por detrás, ven venir un tren que viaja con una velocidad constante de 36 km/h.

1. ¿A qué velocidad mínima y constante deberá moverse la zorra para poder llegar a un desvío, que en ese instante está 120 m más adelante, para evitar el choque?
2. Graficar velocidad y posición en función del tiempo, para ambos móviles

3. Resolver ahora, considerando que se requieren 10 segundos para accionar el cambio de vía.







Ejercicio 1.6

Un cuerpo, que en el instante $t = 0$ s se encuentra en un punto A , viaja en línea recta con velocidad constante de módulo desconocido v . Cuando transcurre un tiempo T el móvil pasa por un punto B que está a distancia D de A .

1. Hallá v .
2. Escribí dos expresiones para la posición del cuerpo en función del tiempo, una considerando un sistema de coordenadas con origen en A y otra considerando un sistema de coordenadas con origen en B .
3. Graficá las funciones definidas para el ítem anterior.

Ejercicio 1.7

En cada uno de los gráficos se encuentra representado el movimiento de dos móviles.



1. Escribir las ecuaciones horarias correspondientes a los cinco primeros gráficos. Dar en cada caso las condiciones iniciales y, si corresponde, determinar cuándo se produce el encuentro.
2. ¿Se pueden escribir las ecuaciones de posición en función del tiempo para ambos móviles en el sexto gráfico? ¿Se necesita algún dato adicional? ¿Se puede saber dónde se encuentran?

Ejercicio 1.8

Un móvil, situado a una cierta distancia de otro, sale al encuentro de éste con velocidad uniforme. Un instante después, el segundo móvil arranca con velocidad también constante.

1. Establecé un sistema de referencia.
2. ¿Se van a encontrar los móviles?
3. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que se encuentren? Determinar las hipótesis necesarias y escribir esta condición matemáticamente.
4. Suponiendo que en algún momento alguno de los dos autos tiene que doblar en una esquina, dibujá los vectores velocidad y aceleración en este caso.

Ejercicio 1.9

Dos automóviles desean encontrarse en una ciudad que se encuentra entre sus posiciones actuales. Los dos viajarán por la misma ruta hacia la ciudad, la cual se encuentra en el kilómetro 45 de la ruta. Uno de los automóviles se encuentra en el kilómetro 10, y el otro en el kilómetro 60.

1. Dibuje un sistema de referencia apropiado.
2. ¿Cuánto les tomará llegar a destino si ambos conducen con una velocidad constante de 80 km/h? ¿Alguno llegará primero?
3. ¿Cuál debería ser la velocidad del segundo automóvil para que lleguen a destino al mismo tiempo, considerando que el primero mantiene su velocidad de 80 km/h?
4. Si es el segundo auto el que conduce a 80 km/h, ¿Cuál debería ser la velocidad del primero para que se encuentren en el mismo instante?
5. Si la velocidad máxima permitida es de 110 km/h, hay algún caso de los mencionados anteriormente en el que puedan ser detenidos por exceso de velocidad?

1.2.2. Movimiento rectilíneo uniformemente variado

El movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV) se caracteriza por una trayectoria en línea recta con aceleración constante y distinta de cero. Por esta razón, la velocidad en este movimiento cambia uniformemente dependiendo de la dirección de la aceleración. Para poder identificar un MRUV es necesario conocer los parámetros que lo caracterizan:

- Su trayectoria es una recta, lo que significa que es un movimiento en una dimensión.

- Su aceleración es distinta de cero
- Su velocidad varía en forma constante como consecuencia de esa aceleración.

En un MRUV la aceleración es constante, nunca va a cambiar, siempre es la misma. ¡Pero mucha atención! Lo que es constante es la aceleración, no la velocidad. A tener muy en cuenta:

- La gráfica de la posición en función del tiempo es una parábola.
- La gráfica de la velocidad en función del tiempo es una recta cuya pendiente es la aceleración.
- Los signos tanto de la velocidad como de la aceleración dependen del sistema de referencia tomado. Esto quiere decir que la velocidad y la aceleración pueden ser positivas o negativas, e incluso nula en el caso de la velocidad, y esto solo va a depender del sistema de referencia elegido.
- Para poder determinar si un móvil está acelerando o frenando basta con examinar los signos de la velocidad y la aceleración en un instante dado. Si los signos de ambas magnitudes son opuestos, el móvil está desacelerando.

Es muy importante escribir las ecuaciones de movimiento para poder ir registrando los datos que se tienen y los datos que faltan. Atención al establecer las condiciones iniciales y sobre todo, no olvidar el sistema de referencia.

Ejercicio 1.10

Un cohete parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en 30 s una velocidad de 588 m/s.

1. Calcular la aceleración del cohete.
2. ¿Qué espacio recorrió en esos 30 s?

Ejercicio 1.11

Un motociclista parte del reposo y tarda 10 s en recorrer 20 m. ¿Qué tiempo necesitará para alcanzar 40 km/h?

Ejercicio 1.12

Un móvil parte del reposo con una aceleración de 20 m/s^2 constante.

1. ¿Qué velocidad tendrá después de 15 s?
2. ¿Qué espacio recorrió en esos 15 s?

Ejercicio 1.13

Un móvil que se desplaza con velocidad constante aplica los frenos durante 25 s y recorre 400 m hasta detenerse.

1. ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de aplicar los frenos?
2. ¿Qué desaceleración produjeron los frenos?


Ejercicio 1.14

Un automóvil cuya velocidad es 90 km/h pasa ante un puesto caminero. En ese instante sale en su persecución un patrullero que parte del reposo y acelera uniformemente durante todo el recorrido. Sabiendo que el patrullero alcanza una velocidad de 90 km/h en 10 s, hallar:

1. El tiempo que dura la persecución.
2. La posición en que el patrullero alcanza el automóvil.
3. La velocidad del patrullero en dicho punto.
4. Graficar, para ambos móviles, la velocidad en función del tiempo y relacionar dicho gráfico con las respuestas a las preguntas anteriores.

Ejercicio 1.15

Analizar el gráfico dado, que corresponde a un movimiento rectilíneo en varias etapas.



Suponiendo que en $t = 0$ es $x = 0$, se pide:

1. Trazar los gráficos de aceleración y de posición en función del tiempo, determinando los valores correspondientes a los tiempos indicados.
2. Calcular la velocidad media del móvil, entre 0 s y 25 s. Prestar mucha atención a la definición de la magnitud que se está pidiendo.
3. Desde la mecánica newtoniana, ¿qué implica que un cuerpo esté acelerado?


Ejercicio 1.16

Un automóvil viaja en línea recta desde A hasta C , con velocidad constante, pasando por B . Se sabe que por A pasa a las 12 h, por B a las 13 h y por C a las 15 h. Se sabe que $\overline{AB} = 50$ km pero \overline{BC} es desconocido.

1. Elegir un origen de tiempo y un sistema de referencia.
2. Elegir un instante t_0 . ¿Cuánto vale x_0 ? Escribir la ecuación de movimiento.
3. Elegir otro instante t_0 . ¿Cuánto vale x_0 ?
4. Escribir la ecuación de movimiento.
5. Calcular la velocidad del auto y la distancia \overline{BC} .

Ejercicio 1.17

Observar detenidamente los gráficos de posición (x) en función del tiempo (t) que están a continuación.



1. Sin usar valores numéricos, determinar los signos de la posición, la aceleración y la velocidad en $t = 0$ s. Para cada caso, graficar la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
2. Suponer para los gráficos superiores $|x(t = 0)| = 1$ m y $|v(t = 0)| = 2$ m/s a menos que sea nula. Para los gráficos inferiores suponer $|x(t = 0)| = 3$ m y $|v(t = 0)| = 4$ m/s a menos que sea nula y escribir explícitamente las ecuaciones de posición considerando en todos los casos que $|a| = 6$ m/s².


Ejercicio 1.18

Un auto viaja por una ruta recta a 20 m/s y un perro se cruza frente a éste 50 m adelante.

1. ¿Cómo deben ser los sentidos de los vectores aceleración y velocidad para que el auto frene?
2. ¿Cuál es la desaceleración mínima que debe imprimirse al automóvil para no chocar al perro?
3. ¿Cuál es la desaceleración mínima que debe imprimirse al automóvil para no chocar al perro, teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta del chofer es $0,3\text{ s}$?
4. Mostrar simultáneamente ambas situaciones en un gráfico de x en función de t .

Ejercicio 1.19


Un automovilista se da cuenta al sobrepasar a un motociclista que se trata de un amigo e instantáneamente aplica los frenos. Se desprecia el tiempo de reacción. El siguiente gráfico de $v(t)$ representa el comportamiento de cada vehículo, en el que se ha cronometrado la velocidad en el instante en que el auto sobrepasa la moto.



1. ¿Qué vehículo va adelante 4 s después que el auto pasa la moto? ¿O van juntos?
2. ¿Cuándo y dónde vuelven a encontrarse?
3. ¿Cuál es la velocidad del auto en ese momento?
4. Graficar $x(t)$ para ambos móviles.

Ejercicio 1.20

El siguiente gráfico representa la velocidad en función del tiempo para un automóvil que se desplaza en línea recta.



Suponiendo que el automóvil parte en $t = 0$ de $x = 0$ se pide:

1. Definir las ecuaciones horarias del cuerpo.
2. Realizar el gráfico que representa la posición del cuerpo en función del tiempo.
3. Indicar el valor de la posición a los 12 s.

Caída libre y tiro vertical

Ambos movimientos son casos particulares de MRUV, por lo tanto van a tener una aceleración constante: la de la gravedad. El vector \vec{g} siempre apunta hacia el centro de la Tierra, lo cual no quiere decir que tenga necesariamente signo positivo o negativo. El signo de \vec{g} al igual que el de cualquier vector, dependerá del sistema de referencia adoptado. Es muy importante escribir las ecuaciones horarias al principio del ejercicio, para poder ir registrando los datos que se tienen y los datos que faltan. Prestar especial atención al establecer las condiciones iniciales y sobre todo, no olvidar el sistema de referencia. La velocidad y la aceleración tendrán el mismo signo en una caída libre, y signo contrario en un tiro vertical, independientemente del sistema de referencia elegido, sin necesidad de cambiar el sistema de referencia para un caso u otro. Es decir, si se lanza un objeto verticalmente, no hace falta dividir el problema en dos tramos, pues si las ecuaciones están bien escritas, ellas mismas determinarán el signo de la velocidad.

Ejercicio 1.21

Un cuerpo cae libremente desde el reposo. Calcular:

1. La distancia recorrida en 3 s.
2. La velocidad después de haber recorrido 100 m.
3. El tiempo necesario para alcanzar una velocidad de 25 m/s.
4. El tiempo necesario para recorrer 300 m, desde que cae.

Ejercicio 1.22

Horacio decide lanzar una manzana desde su balcón hacia la cabeza de su compañero de trabajo que justo pasa por la vereda en ese instante. Si la manzana llega a la cabeza del compañero en 5 s:

1. ¿En qué piso vive Horacio, si cada piso mide 3 m?
2. ¿Con qué velocidad llega?

Ejercicio 1.23

Con el propósito de pedir un deseo, el señor Amilcar Bonifacini deja caer una piedra en un pozo. Al cabo de 10 segundos oye el choque contra el fondo. El señor Amilcar sabe que la velocidad del sonido es de 330 m/s y utiliza este dato para conocer la profundidad del pozo. ¿Cuál es la profundidad del pozo de los deseos calculada por el señor Bonifacini?

Ejercicio 1.24

Una bala se dispara verticalmente hacia arriba, y adquiere una velocidad inicial de 200 m/s. Determinar si al cabo de 20 s, la bala está subiendo o está descendiendo, y a qué altura se encuentra la misma.

Ejercicio 1.25

Raquel no tiene nada mejor que hacer que ponerle un velocímetro a un cascote que se encontró en la estación de Villa Bosch. Decide tirar el cascote desde una altura solo conocida por ella y partiendo siempre desde el reposo. ¿Cuál será la lectura del velocímetro a los 4, 5, 8 y 100 segundos?

Ejercicio 1.26

Un colectivo de la línea 180 choca a 60 km/h contra el paredón de la cancha de Nueva Chicago. Un hincha que observó el siniestro se preguntó lo siguiente: ¿Desde qué altura habría que dejar caer al colectivo para producir el mismo efecto?

Ejercicio 1.27

Se lanza un objeto desde una cierta altura del suelo sobre la superficie de la Tierra. Suponiendo que no hay rozamiento:

1. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?
2. ¿Con qué velocidad llega al suelo?
3. Realizar el gráfico de posición en función del tiempo y de la velocidad en función del tiempo del móvil.

Ejercicio 1.28

Un cuerpo se deja caer desde un globo aerostático que desciende con velocidad igual a 12 m/s

1. Elegí un sistema de referencia y escribí las ecuaciones que describen el movimiento del cuerpo.
2. Calcular la velocidad y la distancia recorrida por el cuerpo al cabo de 10 s .
3. Resolver los incisos anteriores considerando que el globo asciende a 12 m/s .
4. ¿Es físicamente posible que el globo pueda descender a velocidad constante? ¿Por qué?

Ejercicio 1.29

Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 100 m/s . Luego de 4 s de efectuado el lanzamiento su velocidad es de 60 m/s .

1. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada?
2. ¿En qué tiempo recorre el móvil esa distancia?
3. ¿Cuánto tarda en volver al punto de partida desde que se lo lanzo?
4. ¿Cuánto tarda en alcanzar alturas de 300 m y 600 m ?

Ejercicio 1.30

Una pelota de tenis es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 80 km/h . Determinar la altura máxima alcanzada, la velocidad que posee al cabo de 4 y 30 segundos, la altura alcanzada a los 8 segundos y el tiempo total que se encuentra en el aire.

Ejercicio 1.31

Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 250 m/s , determinar:

1. ¿Cuál es la velocidad a los 4 s ?
2. ¿Qué altura alcanzó en esos 4 s ?
3. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar la altura máxima?

Ejercicio 1.32

Desde una terraza a 40 m del suelo se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con velocidad de 15 m/s . Despreciando el rozamiento con el aire:

1. Calcular los vectores posición, velocidad y aceleración en el instante $t = 3 \text{ s}$
2. ¿Cuándo llega al suelo?


3. ¿Cuándo y dónde se encuentra con una piedra arrojada desde el suelo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 55 m/s y que parte desde el suelo en el mismo instante que la anterior?
4. Representar gráficamente (para ambas piedras) la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.

Ejercicio 1.33

¿Con qué velocidad debe pasar un objeto por un punto P , moviéndose verticalmente, para que alcance un punto situado a una altura h del mismo, a los 3 y a los 7 segundos después de haber pasado por P , respectivamente?

Ejercicio 1.34

Observar el siguiente gráfico que representa la velocidad de un cuerpo en función del tiempo.



¿A cuál de las siguientes situaciones corresponde el gráfico?

1. Un auto que frena hasta detenerse y luego comienza a acelerar en el mismo sentido que venía.
2. Un objeto en tiro vertical cerca de la Tierra, que alcanza la altura máxima y cae.
3. Un objeto en caída libre que rebota y vuelve a subir.
4. Un auto que viaja frenando en sentido negativo al eje de referencia y luego cambia de sentido aumentando su velocidad.
5. Un auto que acelera en sentido negativo al eje de referencia y luego cambia el sentido del viaje.
6. Ninguna de las anteriores.

1.2.3. Movimiento rectilíneo genérico

Ejercicio 1.35

Un cuerpo se mueve a lo largo de una línea recta de acuerdo a la ecuación $x = -k t^3 + b t^2$ con $k, b \geq 0$ constantes.

1. Calculá la velocidad y la aceleración del cuerpo en función del tiempo, y graficalas.
2. Hallá el instante de tiempo, y la correspondiente posición, en el cual el cuerpo tendrá velocidad nula.
3. Describí cualitativamente el movimiento indicando en qué intervalos de tiempo el movimiento es acelerado y en cuáles desacelerado.

Las constantes en las ecuaciones horarias tienen las unidades correspondientes para que x se exprese en metros y v en metros por segundo, cuando t se expresa en segundos.

1.3. Movimiento curvilíneo en el plano

Esta sección aborda problemas de movimiento en el plano, en particular, movimiento parabólico y movimiento circular. En ambos casos particulares, el vector posición se obtiene analíticamente de una manera sencilla, teniendo las condiciones iniciales de posición y velocidad iniciales. Para que el movimiento sea curvilíneo, la velocidad y la aceleración no tienen que estar en la misma dirección, por lo tanto, la velocidad no sólo cambia en módulo, sino también en dirección y sentido. El vector posición y por lo tanto, el vector velocidad, se escribe en dos coordenadas, y el vector aceleración que representa el cambio de la velocidad en función del tiempo puede estar en una o en ambas coordenadas.

1.3.1. Tiro parabólico

Ejercicio 1.36

Queda poco tiempo para el All Valley Tournament y los Miyagis intercambian sensei con los Eagle Fan. Pero ni Samantha ni el resto están dispuestos a ir tan lejos con el entrenamiento de Johnny Lawrence ^a.

1. ¿Qué habilidades físicas querrá JL que sus estudiantes entrenen? ¿Por qué?
2. ¿Con qué variables cinemáticas se asocian esas habilidades?
3. ¿Qué cálculos previos tendrías que hacer para asegurarte de no caer al vacío? Desarrollalos por escrito usando tus conocimientos de cinemática.

^aVer <https://drive.google.com/file/d/1PRBHa9eAYcsvM3J5nzo3rrrN0vbr4PIQ/view?usp=sharing>

Ejercicio 1.37

En un bar local, un cliente desliza sobre la barra una jarra de cerveza vacía para que la vuelvan a llenar. El bartender está momentáneamente distraído y no ve la jarra que cae al suelo a una distancia D de la base de la barra. La altura de la barra al suelo es H .

1. Establecer un sistema de referencia, indicando ejes, cero y la dirección de \vec{g} respecto de él.
2. Hacer un esquema aproximado de la trayectoria de la jarra hasta que toca el suelo, indicando allí los datos de posición del problema.
3. Escribir las ecuaciones de posición y velocidad de la jarra para cada coordenada.
4. ¿Qué velocidad tenía la jarra en el punto en el que abandona la barra? Ayuda: esta velocidad sólo puede conocerse con los datos de posición final.
5. ¿Qué dirección tiene la velocidad de la jarra cuando toca el suelo? Ayuda: la dirección se expresa como un ángulo.
6. Analizá los resultados obtenidos. ¿Tienen sentido?

Ejercicio 1.38

Un arquero dispara desde el piso una flecha cuya velocidad de salida es de 50 m/s y forma un ángulo de 37° con la horizontal. Considerando despreciable el rozamiento con el aire, calcular:

1. El tiempo que la flecha está en el aire.
2. La altura máxima.
3. El alcance.
4. El vector velocidad a los 5 segundos.
5. El vector velocidad final.
6. Los vectores desplazamiento, velocidad media y aceleración media en los intervalos comprendidos entre los instantes $t = 0$ s y $t = t_{hmax}$ y entre $t = 0$ s y $t = t_{alcance}$.
7. Graficar posición y velocidad en función del tiempo para cada coordenada.


Ejercicio 1.39

Un cuerpo es lanzado desde el piso en tiro oblicuo y toca el piso al cabo de 8 s a 80 m del lugar de lanzamiento. Su altura máxima y su velocidad en dicha altura son:

- A. 80 m y 10 m/s
- B. 40 m y 10 m/s
- C. 80 m y 40 m/s
- D. 40 m y 40 m/s
- E. Ninguna de las anteriores.

Ejercicio 1.40

Un esquiador deja una rampa y se desliza en la dirección horizontal con una rapidez de 25 m/s , como se muestra en la figura. El plano de aterrizaje bajo él, cae con una pendiente de 35° . ¿En qué punto del plano aterrizará?



Ayuda: conviene que el sistema de referencia sea tal que la gravedad quede totalmente contenida en la coordenada vertical.

Ejercicio 1.41

Un helicóptero se encuentra suspendido en la posición $x = L$, $y = H$. En $t = 0$ el helicóptero comienza a descender con aceleración vertical constante. En el origen de coordenadas hay un cañón que forma un ángulo α con la horizontal y dispara proyectiles con velocidad de salida v_0 .

1. Encontrar la trayectoria $y(x)$ del proyectil.
2. Graficar las trayectorias $y(x)$ del proyectil y del helicóptero.
3. ¿Para qué valores de v_0 la trayectoria del proyectil y la del helicóptero se intersectan?
4. Si v_0 es alguno de los valores hallados en 2, diga en qué instante debe efectuarse el disparo para que el proyectil haga impacto sobre el helicóptero.

1.3.2. Movimiento circular

El movimiento circular se caracteriza por una trayectoria en la que cada punto se encuentra equidistante a un centro o eje de giro. Dado que se trata de un movimiento curvilíneo, **siempre está acelerado**. Al menos una de las componentes de la aceleración, denominada centrípeta, apunta hacia el centro de giro y puede o no tener otra componente **tangencial**, es decir, paralela a la dirección de la velocidad. En el caso en el que la aceleración sólo tiene componente centrípeta, se habla de **movimiento circular uniforme** (MCU). En

este caso el **módulo** de la velocidad es constante y su frecuencia de giro o angular también lo es. En el caso en el que además exista una componente de la aceleración en la dirección tangencial, se habla de **movimiento circular acelerado**. El **módulo de la velocidad en este caso ya no es constante y la frecuencia de giro tampoco**. Dada la simetría del movimiento, se utilizan **coordenadas polares cilíndricas** para describirlo de una manera más sencilla.

Movimiento circular uniforme

Ejercicio 1.42

Procedimiento para pasar de coordenadas cartesianas a cilíndricas

Se tiene un disco de radio R que gira con movimiento circular uniforme.

1. Realizar un esquema de la situación, indicando un sistema de referencia con origen en el centro de giro.
2. Escribir el vector posición $\vec{r}(t)$ en función del ángulo θ . La dependencia del vector posición con el tiempo está contenida en este ángulo, por lo tanto, $\theta = \theta(t)$.
3. Calcular el vector velocidad como la derivada del vector posición. Demostrar que ambos vectores son ortogonales.
4. Identificar la velocidad angular.
5. Dado que la posición y la velocidad son ortogonales, se pueden escribir en términos de una nueva base vectorial, diferente de la cartesiana, en donde los nuevos versores son \hat{r} y $\hat{\theta}$. Indicar estos versores.
6. Escribir la posición y la velocidad en esta nueva base vectorial (cilíndrica).
7. ¿Cuál será la expresión de la aceleración en coordenadas cilíndricas?
8. Demostrar que en el caso de MCU, la velocidad angular es igual a $2\pi/T$.
9. ¿Cómo se escribirán la velocidad y la aceleración en el caso en el que el radio del movimiento curvilíneo no fuese constante?

Ejercicio 1.43

Un disco de radio de 6 cm, gira a 2500 rpm.


1. Calcular el módulo de la velocidad angular en radianes por segundo.
2. Calcular el módulo de la velocidad tangencial de un punto sobre su borde.
3. Calcular la frecuencia en Hertz.

Ejercicio 1.44

Calcular la velocidad angular y la frecuencia con que debe girar una rueda, para que los puntos situados a 50 cm de su eje estén sometidos a una aceleración que sea 500 veces la de la gravedad.

Ejercicio 1.45

Se tiene una rueda a la cual se le dibujan 2 círculos en una de sus caras. Ambos círculos son concéntricos con respecto a la rueda, uno se dibuja siguiendo el borde de la misma (tiene el mismo radio), mientras que el otro se dibuja a la mitad de la distancia desde el centro de la circunferencia que el otro.



1. Si cubro el exterior de la rueda con pintura, la apoyo sobre una superficie plana y la hago rodar hasta que de una vuelta completa de 360 grados, ¿Cuál será la longitud pintada en función al radio de la rueda?
2. Si sobre la rueda anterior, usando un eje común desde el centro de la misma, insertamos otra rueda sobre una de sus caras que tenga el radio del otro círculo dibujado, y ahora pintamos el borde de esta rueda y la hacemos rodar una revolución completa (sin apoyar la rueda más grande, solo la de menor radio), ¿Cuánto pintará esta rueda ahora, en relación al radio de la rueda mayor?
3. Si diseñamos un escalón de forma tal que se puedan apoyar ambas ruedas al mismo tiempo, ¿Qué distancia pintarán al momento de rodarlas? Este problema se conoce como la paradoja de la rueda de Aristóteles, por qué es una paradoja? ¿Qué cree que va a ocurrir en la práctica? Plantee las hipótesis del problema. ¿Qué inconsistencia en las hipótesis lleva a la paradoja?

Ejercicio 1.46

Un automóvil, cuyo velocímetro indica en todo instante 72 km/h, recorre el perímetro de una pista circular en un minuto. Determinar el radio de ésta. Si el automóvil tiene aceleración en algún instante, determinar su módulo, dirección y sentido.

Ejercicio 1.47


La Estación Espacial Internacional gira con velocidad angular constante alrededor de la Tierra cada 90 minutos en una órbita a 300 km de altura sobre la superficie terrestre (por tanto, el radio de la órbita es de 6670 km).

1. Calcular el módulo de la velocidad angular.
2. Calcular el módulo de la velocidad tangencial.
3. ¿Tiene aceleración? En caso afirmativo, indicar sus características y, en caso negativo indicar por qué crees que no está acelerada.

Ejercicio 1.48

La Tierra gira alrededor del Sol en 365,25 días y el radio de giro medio es de $1,5 \times 10^{11}$ m. Suponiendo que la Tierra gira realizando un movimiento circular uniforme, calcular:

1. El módulo de la velocidad angular en rad/día.
2. El módulo de la velocidad tangencial.
3. El ángulo que recorrerá en 30 días.
4. El módulo de la aceleración centrípeta.
5. ¿Cómo describirías un movimiento en espiral ascendente? Escribí todas las hipótesis necesarias.

Ejercicio 1.49

1. Calcular el módulo de la velocidad de un punto situado sobre el ecuador en la Tierra.
2. Calcular el módulo de la velocidad de un punto ubicado en los trópicos, sabiendo que el ángulo que forman con el ecuador terrestre es $\alpha = 23^\circ 27'$ (latitud).
3. ¿Cuál es la velocidad de un punto ubicado en los polos?


Ejercicio 1.50

Se hace girar un cilindro hueco de cartulina alrededor de su eje, a 3.000 rpm. Se dispara un perdigón de modo que su trayectoria atraviesa al cilindro, pasando por su eje. Al desplegar la cartulina como muestra el dibujo, puede medirse la distancia entre orificios. Hallar la velocidad del proyectil, suponiendo que el cilindro no dio más de media vuelta mientras era atravesado.

Ejercicio 1.51**Transmisión de bicicleta**

Dos ruedas dentadas, cuyos ejes A y B se encuentran a una distancia fija, se vinculan mediante una cadena para formar un mecanismo de transmisión similar al que puede

observarse en una bicicleta. Sus radios son $r_A = 3\text{ cm}$ y $r_B = 9\text{ cm}$ respectivamente. Se hace girar a la rueda A con velocidad angular constante en el sentido indicado, a 100 rpm. Considerando el pasaje de un eslabón sucesivamente por los puntos X , Y y Z , determinar:



1. El módulo de su velocidad, en cada punto.
2. La frecuencia con que gira la rueda B .
3. La aceleración que experimenta el eslabón en cada punto.

Ejercicio 1.52


Las ruedas de un automóvil tienen 60 cm de diámetro. Calcular con qué velocidad angular giran, cuando el automóvil marcha a 72 km/h en un camino rectilíneo, sin que resbalen.

Movimiento circular uniformemente variado

Ejercicio 1.53


La figura representa la aceleración total de una partícula que se mueve en el sentido de las manecillas del reloj en un círculo de 2,5 m de radio en cierto instante de tiempo. Si $\theta = 30^\circ$ y $a = 15\text{ m/s}^2$, calcular para **este** instante:

1. La aceleración radial.
2. La rapidez de la partícula.
3. Su aceleración tangencial.



Ejercicio 1.54

Un auto azul parte del reposo desde el punto O en el instante $t = 0$ y describe una trayectoria circular de radio R con una aceleración angular γ . Pasado un tiempo de 3 s desde la partida del auto azul, parte del reposo desde O un auto rojo que se mueve en línea recta hacia el punto P con aceleración constante. ¿Qué aceleración debe tener el auto rojo para encontrarse con el azul en P ?

**Ejercicio 1.55**

Un tren frena mientras entra a una curva horizontal cerrada, disminuyendo su rapidez de 90 km/h a 50 km/h en los 15 s que tarda en cubrir la curva. El radio de la curva es de 150 m. Calcular el vector aceleración en el momento en que la rapidez del tren alcanza 50 km/h. Suponer que continúa frenando en este tiempo con la misma relación.

Capítulo 2

Dinámica

2.1. Generalidades del modelo de Newton

Esta unidad aborda problemas en donde los datos de posición, velocidad y aceleración se obtienen a través del análisis de la **dinámica** de los sistemas de cuerpos, según el **modelo de mecánica clásica de Newton**. Los sistemas son un conjunto acotado de cuerpos que interactúan con otros cuerpos. Estas interacciones se miden en términos de **fuerzas**, las cuales pueden ser **internas** (con cuerpos del mismo sistema) como **externas** (con cuerpos por fuera del sistema). Las interacciones se cuantifican siguiendo el método del diagrama de cuerpo libre. Se plantean las **ecuaciones de Newton** cuyo conjunto de soluciones brinda información acerca del movimiento del sistema en cuestión.

Ejercicio 2.1

Verdadero o falso

Decir si las siguientes afirmaciones generales sobre el movimiento de los cuerpos son verdaderas (V) o falsas (F).

1. Un cuerpo no puede desplazarse sin que una fuerza actúe sobre él.
2. Toda variación de la velocidad de un cuerpo exige la existencia de una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo.
3. Un par de acción y reacción es una dupla de fuerzas de igual módulo, pero de dirección y sentido opuesto, aplicadas sobre un mismo cuerpo.
4. Es posible que un objeto tenga movimiento en ausencia de fuerzas.
5. Un cuerpo está en reposo cuando no hay fuerzas aplicadas sobre él.
6. Los cuerpos están en equilibrio cuando la suma de fuerzas aplicadas sobre éstos es nula.
7. El equilibrio es el estado en el que los cuerpos tienen velocidad nula.
8. Si el módulo de la velocidad de un cuerpo permanece constante, se puede afirmar que el mismo se encuentra en equilibrio.
9. Si no existe una fuerza aplicada sobre un cuerpo en movimiento, éste se detiene.

2.2. Pares de acción y reacción

Ejercicio 2.2

Patinaje sobre hielo

Un hombre grande y un niño están de pie, uno frente al otro sobre hielo, sin fricción. Juntan sus manos y se empujan mutuamente de modo que se separan.

1. Hacer un esquema o dibujo de la situación.
2. Elegir un sistema de análisis. ¿Qué cuerpos lo conforman?
3. Establecer un sistema de referencia. Para cada cuerpo por separado indicar el sentido y la dirección de las fuerzas que actúan.
4. ¿Cómo es la fuerza que le ejerce el niño al hombre respecto de la que le ejerce el hombre al niño? ¿Por qué?
5. ¿Cuál es el valor de la fuerza resultante sobre el sistema?
6. Mostrar que la velocidad del niño al separarse es igual al producto entre la velocidad del hombre y el cociente entre la masa del hombre y la masa del niño.

Ejercicio 2.3

Sistema mano - pelota


Una persona sostiene una pelota de tenis en su mano.

1. Indicar en un diagrama de cuerpo libre (DCL) todas las fuerzas que actúan sobre la pelota y todas las fuerzas que actúan sobre la mano.
2. Indicar los pares de acción y reacción.
3. Indicar cuáles son fuerzas internas del sistema mano - pelota y cuáles son fuerzas externas.
4. Indicar las fuerzas que actúan sobre la pelota si se la deja caer.

Ejercicio 2.4


Bloques

Los bloques de la figura se encuentran en equilibrio, apoyados sobre el piso. Dibujar todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos, indicando cuáles son pares de interacción.



Ejercicio 2.5 Semáforos


Indicar en un dcl las fuerzas que actúan en cada semáforo.




2.3. Sistemas de un solo cuerpo

Ejercicio 2.6 Balde en grúa


Un balde con mezcla cuelga del cable de una grúa. Analizar las interacciones presentes y hacer el diagrama de cuerpo libre del balde en cada caso. Comparar las intensidades de las fuerzas en un caso y otro. ¿Será cierto que se necesita una aceleración mayor a g para elevar el balde? Discutir.




Caso A
Permanece en reposo



Caso B
Acelera hacia arriba



Caso C
Acelera hacia abajo




Caso D
Cae libremente

Ejercicio 2.7**Balanza en ascensor**


Una persona se sube a una balanza dentro de un ascensor. ¿Marcará lo mismo la balanza si el ascensor sube o baja acelerando o frenando? ¿Y si se desplaza con velocidad constante? Plantear todas las hipótesis necesarias.

Ejercicio 2.8


Un carrito de montaña rusa ejecuta un rizo y se encuentra en la posición que indica la figura. ¿Cuál de todos los vectores dibujados representa la fuerza neta que actúa sobre el carrito en ese instante?

**Ejercicio 2.9****Palangana**

Un cuerpo oscila dentro de una palangana como indica la figura. Dibujá la fuerza resultante que actúa en los puntos A , B , C , D , y E en un camino de ida y en un camino de vuelta (se desprecia el rozamiento).

**Ejercicio 2.10**

Seis proyectiles se mueven en el vacío (se desprecia el rozamiento con el aire) como se muestra en la figura. A una dada altura, sus velocidades son las indicadas.



1. ¿Qué diferencias existen entre los DCL de cada cuerpo?
2. ¿Cómo se explica que un mismo DCL represente distintos movimientos?

Ejercicio 2.11 Plano inclinado

Dibujá el diagrama de cuerpo libre de un bloque que se desliza hacia abajo por un plano inclinado. Hacé todas las hipótesis necesarias. Te pedimos que encuentres analíticamente:

1. La aceleración del bloque.
2. La rapidez cuando llega al pie del plano inclinado.

2.4. Sistemas de cuerpos vinculados

Definición 2.1 Vínculos del sistema

Se define a las **fuerzas de vínculo**, como aquellas interacciones que imponen restricciones al movimiento del sistema. De manera general, las fuerzas de vínculo se presentan como tensiones y fuerzas normales que limitan los **grados de libertad** del sistema. Un cuerpo sometido a la fuerza normal de una superficie, sólo puede moverse en el plano (2-D); Dos cuerpos unidos por una soga se hallan condicionados al movimiento del otro. Estas restricciones se expresan como ecuaciones que se incluyen en el análisis en términos de la teoría de Newton. Se llaman **vínculos** a los objetos o cuerpos con los que interactúan los elementos del sistema, por ejemplo, las sogas, varillas o superficies. En general se deberán considerar adicionalmente hipótesis sobre sus propiedades: superficies sin rozamiento, o sogas inextensibles y de masa despreciable. Las hipótesis suman ecuaciones extra al problema.

Ejercicio 2.12 Vagones de tren

Los vagones de tren se conectan mediante enganches que están bajo tensión conforme la locomotora tira el tren. Imaginar que se está sobre un tren que aumenta su rapidez con

aceleración constante. A medida que se mueve a lo largo del tren, desde la locomotora hacia el último vagón, va midiendo la tensión en cada conjunto de enganches.

1. ¿La tensión aumenta, disminuye o se mantiene igual?
2. Cuando se aplican los frenos, los enganches están bajo compresión. ¿Cómo varía la fuerza de compresión desde la locomotora hasta el último vagón?


Ejercicio 2.13

La masa m_2 se encuentra unida a la masa m_1 y se encuentra apoyada sobre un plano que forma un ángulo θ respecto del piso, sin fricción.

1. Dibujá diagrama de cuerpo libre para ambas masas.
2. Calcular las aceleraciones de ambas masas y la tensión en la cuerda.
3. ¿Bajo qué hipótesis podemos decir que la aceleración es igual para ambos cuerpos?
4. ¿Bajo qué hipótesis podemos decir que la tensión es la misma a ambos lados de la cuerda?
5. Calcular la rapidez de cada objeto a t_0 luego de liberarse desde el reposo.

Ejercicio 2.14

El sistema de la figura asciende por un plano inclinado 30° , que presenta rozamiento despreciable. Las masas de los cuerpos son m_1 y m_2 .




Hacer los diagramas de cuerpo libre en cada caso y determinar:

1. La intensidad de la fuerza F necesaria para que se mueva con velocidad constante.
2. La fuerza que ejerce la cuerda, en ese caso.
3. La fuerza que soporta la cuerda, la aceleración y el sentido del movimiento, un instante después de suprimir F .

Ejercicio 2.15

En los tres sistemas que se muestran a continuación, puede despreciarse el rozamiento con el plano y en la polea, y las masas de las cuerdas y la polea. La intensidad de la fuerza


aplicada es igual al peso del cuerpo 2.



1. Comparando los sistemas *A* y *B*, analizar cualitativamente (sin hacer cálculos) cuál se mueve con mayor aceleración.
2. Repetir el análisis anterior, comparando ahora *B* con *C*.
3. Dale un valor cualquiera a la fuerza y a la masa del cuerpo 1. Calculá las respectivas aceleraciones y verificá las predicciones antes hechas.

Ejercicio 2.16


En el sistema de la figura, un objeto de masa m_1 sobre una mesa horizontal sin fricción se conecta a un objeto de masa m_2 por medio de una polea muy ligera P_1 y a una polea fija ligera P_2 , como se muestra en la figura.



1. Si a_1 y a_2 son las aceleraciones de m_1 y m_2 , respectivamente, ¿cuál es la relación entre dichas aceleraciones?
2. Exprese las tensiones en las cuerdas.
3. Exprese las aceleraciones en términos de las masas m_1 y m_2 .

Ejercicio 2.17

Un niño quiere alcanzar una manzana pendiente en un árbol sin escalar, sentado en una silla unida a una soga que pasa por una polea sin fricción (ver figura). El niño tira sobre el extremo suelto de la soga con tal fuerza que la balanza de resorte lee 250 N. El verdadero peso del niño es 320 N y la silla pesa 160 N.



1. Dibujar diagramas de cuerpo libre para el niño y para la silla considerada como sistemas separados y otro diagrama para el niño y la silla considerados como un sistema.
2. Mostrar que la aceleración del sistema es hacia arriba y encontrar su magnitud en función del peso del niño.
3. Encontrar la fuerza que el niño ejerce sobre la silla.


Ejercicio 2.18

Un objeto de masa M se mantiene en lugar mediante una fuerza aplicada \vec{F} a un sistema de poleas como se muestra en la figura. Las poleas no tienen masa ni fricción.

1. Encontrar la tensión en cada sección de cuerda.
2. Encontrar la magnitud de \vec{F} .

Ejercicio 2.19

El sistema de la figura utiliza dos contrapesos de masa m para levantar un cuerpo de masa M , que se halla inicialmente en reposo sobre el piso. Considerar que las sogas son inextensibles, y que sogas y poleas tienen masas despreciables.




1. Escribí las ecuaciones de Newton y de vínculo para los cuerpos que forman el sistema.

2. Calculá la aceleración de cada cuerpo en función de m , M , α y g .

2.5. Dinámica circular

Ejercicio 2.20

El sistema de dos cuerpos de la figura gira en una mesa horizontal con rozamiento despreciable, de modo que los cuerpos se hallan alineados con el centro. Determinar las intensidades de las fuerzas sobre cada cuerda en función de la velocidad angular del sistema. Suponer que cada tramo de cuerda mide lo mismo.



Ejercicio 2.21

El tambor de un lavarropas gira alrededor de un eje vertical.

1. Calcular la intensidad de la fuerza horizontal que sus paredes hacen sobre el botón suelto de una camisa.
2. Obtener un resultado dándole valores a los parámetros de los que depende la fuerza y suponiendo que el lavarropas gira a 600 rpm.
3. Comparar el resultado anterior con el peso del botón.

Ejercicio 2.22

La Ruta Nacional n° 7 entre las localidades de Chacabuco y Junín tiene un ancho de calzada de 7,20 m. Para que un automóvil pueda circular a 80 km/h por una curva de 600 m de radio sin experimentar esfuerzos laterales, la diferencia de nivel entre los bordes de la calzada debe ser:

1. 0,082 m
2. 4,7 m
3. 0,82 m
4. 0,59 m

5. 1,06 m

6. Falta la masa del automóvil.

Ejercicio 2.23

Un pescador revolea una plomada de 200 g, atada al extremo de una línea, de modo que gira en una circunferencia horizontal de 1 m de radio, y realiza 2 vueltas por segundo. Hallar con qué velocidad partirá la plomada, cuando suelte la línea. ¿Qué fuerza horizontal se requiere para mantener girando la plomada? Analizar si el hilo puede permanecer horizontal, y si la intensidad de la fuerza que ejerce es o no igual a la calculada.

Ejercicio 2.24

Cuando un ciclista toma una curva en bici sobre una pista horizontal (curva no peraltada).


1. La inclinación que debe adoptar ¿es tanto mayor cuanto mayor sea su peso?
2. ¿La inclinación depende de la velocidad?
3. ¿De dónde proviene la fuerza centrípeta que permite tomar la curva?

Ejercicio 2.25

A qué velocidad debe realizar un avión un loop (giro o vuelta en el aire) de 1 km de radio para que el piloto no experimente ninguna fuerza por parte del asiento o del cinturón de seguridad al encontrarse en la parte más alta del rulo? Esta situación es conocida como sensación de “ingravidez”.

Ejercicio 2.26

El cuerpo 1 gira sobre una mesa horizontal con rozamiento despreciable, mantenido por una cuerda que pasa por un orificio en su centro, de la que cuelga el cuerpo 2.



1. Si ambos cuerpos tienen masas iguales, hallar la frecuencia con que el cuerpo 1

describe una circunferencia de 0,4 m de radio.

2. Hallar el nuevo radio para duplicar la frecuencia anterior sin cambiar los cuerpos.
3. Hallar la relación de masas entre el cuerpo 2 y el 1, para que éste gire con la frecuencia calculada en el ítem 1 y con el radio del ítem 2.


Ejercicio 2.27

Considerar una bolita sujeta a una varilla rígida que le comunica un movimiento circular uniforme con velocidad angular de módulo ω en un plano vertical.

1. Escribir las ecuaciones de Newton para la bolita y las condiciones de vínculo a las que está sujeto el movimiento.
2. Calcular la fuerza ejercida por la barra en función del ángulo φ (analizar si tiene sentido físicamente).

Ejercicio 2.28


Un cuerpo de masa m se halla apoyado sobre una superficie cónica sin fricción, colgando del extremo de una cuerda inextensible de longitud L . En el instante inicial el cuerpo rota con velocidad angular de módulo ω .



1. Escribir las ecuaciones de Newton y las condiciones de vínculo para el cuerpo.
2. Calcular la aceleración del cuerpo.
3. Hallar el valor de la tensión de la cuerda y de la fuerza de interacción ejercida por la superficie.
4. Decir para qué valor de ω_0 esta última fuerza se anula.

Ejercicio 2.29

Una bolita de masa m se desliza sobre una semiesfera de radio R , carente de fricción, como se muestra en la figura.




1. Si inicialmente la bolita es apartada de $\theta = 0^\circ$ en un ángulo muy pequeño y su velocidad inicial es cero, calcular el ángulo θ para el cual se separa de la superficie esférica.
2. Si ahora la bolita se engarza en un riel semicircular sin fricción de radio R , hallar la velocidad con la que llega al suelo. ¿Qué aceleración tangencial tiene en ese instante?
3. Calcular la aceleración del cuerpo.

2.6. Fuerza de rozamiento

Ejercicio 2.30


¿Cuál es la falla del siguiente razonamiento acerca de un cuerpo apoyado sobre una pared al que se le ejerce una fuerza \vec{F} como se muestra a continuación?



“El cuerpo está en reposo porque su peso es equilibrado por la fuerza de rozamiento. Como la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal, podemos conseguir que el cuerpo ascienda aumentando el valor de \vec{F} .”

Ejercicio 2.31


El sistema de la figura está compuesto de dos bloques A y B de masas m_1 y m_2 , respectivamente.



La superficie horizontal no presenta fricción, pero sí hay rozamiento entre A y B . ¿Cuál es la mínima fuerza F que se debe aplicar a A para que B no caiga por acción de la gravedad?

Ejercicio 2.32


Un bloque de cierta masa m es empujado contra una pared mediante una fuerza F que forma un ángulo β con la horizontal. Hay rozamiento entre el bloque y la pared.



1. Determinar los valores posibles para la magnitud de F que permiten al bloque permanecer fijo y analizar de qué parámetros depende.
2. Describir qué sucede si F tiene un valor mayor y qué ocurre si es más pequeño.

Ejercicio 2.33

Dos bloques de masas m_1 y m_2 se hallan apoyados sobre sendos planos inclinados, de inclinaciones α y β , respectivamente, unidos entre sí por un hilo inextensible y de masa despreciable, tal como se indica en la figura. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre los bloques y las correspondientes superficies son $\mu_e = 0,3$ y $\mu_d = 0,25$, respectivamente.




1. Inicialmente se traba el sistema, de modo que esté en reposo. ¿Qué relaciones se deben cumplir entre las masas y los ángulos para que quede en reposo cuando se lo destrabe?
2. Si $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 2 \text{ kg}$, $\alpha = 60^\circ$ y $\beta = 30^\circ$, ¿se pondrá en movimiento el sistema?
3. Suponer ahora que inicialmente se le da al sistema cierta velocidad inicial y que los datos son los dados en el ítem anterior. Encontrar la aceleración y describir cómo será el movimiento del sistema teniendo en cuenta los dos sentidos posibles de dicha velocidad.

Ejercicio 2.34

Hallar la mínima distancia de frenado de un automóvil que marcha a 108 km/h , si los coeficientes de rozamiento entre los neumáticos y el pavimento son $\mu_e = 0,6$ y $\mu_d = 0,3$. ¿Qué sucederá si el conductor bloquea las ruedas?

Ejercicio 2.35

Un cuerpo de masa m_1 se apoya sobre otro de masa m_2 como indica la figura. No hay rozamiento entre la mesa y el cuerpo 2, pero sí entre los cuerpos 1 y 2, siendo μ_e el coeficiente de rozamiento estático entre ambos.



1. ¿Cuál es la fuerza máxima aplicada sobre el cuerpo 1 que acelera a ambos cuerpos, sin que deslice uno respecto del otro?
2. ¿Cuál es la aceleración del sistema?
3. Realizar el mismo análisis que en los ítems anteriores, pero si se aplica la fuerza sobre el cuerpo 2.
4. Se aplica ahora sobre la masa 2 una fuerza el doble de la calculada en el ítem anterior. ¿Cuál es la aceleración de m_1 y m_2 si el coeficiente de rozamiento dinámico es μ_d ?

5. Si la dimensión del cuerpo 2 es L y la del cuerpo 1 es l , siendo $l \ll L$ ¿Cuánto tardará en caer m_1 si inicialmente estaba apoyada en el centro de m_2 ?

2.7. Fuerza elástica

Definición 2.2

Ley de Hooke

La Ley o principio de Hooke caracteriza a los cuerpos elásticos. Establece que cualquier cuerpo elástico puede ser considerado como tal, si la fuerza necesaria para estirarlo o comprimirlo una cierta longitud $\Delta L = L_f - L_0$ es **proporcional** a ese estiramiento o compresión. En el caso de los resortes hay una sola dirección de estiramiento o compresión. Matemáticamente esto se expresa como


$$\vec{F}_{ela} = -k \Delta x \hat{i}$$

donde k es la **constante elástica**, propia de cada resorte, y L_0 es la longitud natural, es decir, la longitud en la cual el resorte no está comprimido ni estirado.

Los problemas que aquí se abordarán con resortes serán de dos tipos: **caso estático**, es decir, la longitud del resorte en un determinado sistema se mantiene fija u **oscilaciones**, en donde la longitud del resorte oscila entre dos extremos a lo largo del tiempo.

Ejercicio 2.36

Los carritos A y B de la figura, permanecen en reposo sobre un riel horizontal, por el cual pueden moverse con rozamiento despreciable. Ambos están vinculados por un resorte de masa despreciable. En un instante dado, se aplica una fuerza F horizontal sobre el carrito A .



Hallar la aceleración de cada carrito, cuando el resorte se comprima x .

Ejercicio 2.37


Un resorte de masa despreciable, cuya longitud es 40 cm cuando está descargado, tiene un extremo unido al techo a 2,4 m del piso, y en el otro está colgado un objeto que pesa 12 kgf.

1. Hallar la constante elástica del resorte, si al quedar en equilibrio su longitud es 60 cm.
2. Se eleva al cuerpo 5 cm desde la posición de equilibrio, y se lo suelta. Hallar con qué aceleración parte.
3. Determinar cuánto habría que desplazar el cuerpo hacia abajo, respecto de su posición de equilibrio, para que al soltarlo partiera con una aceleración de módulo igual a $|g|$.

4. Trazar los gráficos de la aceleración del cuerpo y de la fuerza que experimenta el techo, en función de la distancia al piso del extremo libre.

Ejercicio 2.38


Se utiliza un resorte para mantener en equilibrio a una caja sobre el plano inclinado del esquema.



1. Suponiendo despreciable el rozamiento, calcular qué longitud tendrá el resorte.
2. Si hubiese rozamiento, hallar la máxima longitud que podrá darse al resorte sin romper el equilibrio.
3. Hallar la mínima longitud del resorte que conserve el equilibrio.

Ejercicio 2.39

En el esquema de la figura, el cuerpo se mueve apoyado en una mesa horizontal con rozamiento despreciable, sujeto al extremo de un resorte.




1. ¿Cuál es la longitud del resorte, cuando el cuerpo gira dando n vueltas por segundo? Considerar que la trayectoria es una circunferencia y despreciar la masa del resorte.
2. Encontrar el rango de valores posibles de ω para que gire con movimiento circular uniforme.

2.8. Oscilaciones

Ejercicio 2.40

Se tiene una bolita de masa m unida al extremo de una barra rígida, de longitud L y masa despreciable.



La barra es libre de girar en el plano vertical alrededor de su otro extremo, fijo en un punto P . Se conoce la velocidad v_0 de la partícula cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria. Determinar, en función de v_0 , m , L y g :


1. Los valores del ángulo θ que pueden ser alcanzados durante el movimiento y el ángulo θ_v para el cual la velocidad de la bolita se anula.
2. El ángulo θ_f para el cual la fuerza que hace la barra sobre la bolita se anula. Observar que θ_f puede no existir.
3. ¿Bajo qué condiciones se puede reemplazar la barra por una cuerda inextensible sin modificar la cinemática de la partícula? Justificar.

Ejercicio 2.41

Considerar una partícula de masa m suspendida del techo por medio de un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 . Determinar cómo varía la posición con el tiempo, sabiendo que en $t = 0$ la partícula se halla a una distancia $2l_0$ del techo, con velocidad nula.

Ejercicio 2.42

El sistema de la figura, compuesto por dos cuerpos de masas m_1 y m_2 y un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 , se encuentra inicialmente en equilibrio.




Se lo pone en movimiento imprimiendo a la masa m_1 una velocidad v_0 hacia abajo. Considerar que no hay rozamiento entre los cuerpos y las superficies.

1. Plantear las ecuaciones de Newton y de vínculo para m_1 y m_2 .

- Decir cómo varía la posición de m_2 con el tiempo.

Ejercicio 2.43

Una bolita de masa m está enhebrada en un aro semicircular de radio R y sujeta a un resorte de constante elástica k y longitud natural $l_0 = \pi R/2$, como muestra la figura.




- Hallar la ecuación diferencial que rige el movimiento de la bolita.
- Encontrar posiciones de equilibrio y determinar, justificando, si son estables o inestables.

Ejercicio 2.44

Un péndulo con una longitud de 1 m se libera desde un ángulo inicial de 15° . Después de 1000 s, su amplitud se reduce por fricción a $5,5^\circ$. ¿Cuál es el valor de $b/2m$?

Ejercicio 2.45

En el sistema de la figura, el bloque tiene una masa de 1,52 kg y la constante de fuerza elástica es de 8,13 N/m.



La fuerza de fricción es proporcional a la velocidad ($|F_{roz}| = bv$), donde $b = 227$ g/s. Suponiendo que el bloque se aparta 12,5 cm respecto a su posición de equilibrio y luego se lo suelta:

- Calcular el intervalo de tiempo necesario para que la amplitud disminuya a $1/3$ de su valor inicial.
- ¿Cuántas oscilaciones efectuará el bloque en ese tiempo?

Ejercicio 2.46

¿Por qué la amplitud A en un sistema real nunca se va a infinito cuando el mismo es excitado con la frecuencia de resonancia?

Ejercicio 2.47

Un oscilador armónico amortiguado consta de un bloque ($m = 1,91 \text{ kg}$), un resorte ($k = 12,6 \text{ N/m}$), y una fuerza de amortiguamiento dada por $|F_{roz}| = b v$. Inicialmente, oscila con una amplitud de $26,2 \text{ cm}$. A causa del amortiguamiento, la amplitud disminuye a tres cuartas partes de este valor inicial después de cuatro ciclos completos. ¿Cuál es el valor de la constante de amortiguamiento?

Capítulo 3

Cantidad de movimiento y energía

3.1. Conservación de la cantidad de movimiento lineal

Ejercicio 3.1

Un hombre que pesa 100 kg se encuentra en reposo sobre un lago helado (considere rozamiento nulo). Para salir arroja horizontalmente una piedra que pesa 1 kgf con velocidad de 10 m/s en dirección contraria a la costa más cercana, que está a 20 m de distancia. ¿Cuánto tarda el hombre en llegar a la costa?

Ejercicio 3.2

Una bola de 1 kg que cae verticalmente, choca contra el piso con una velocidad de 25 m/s y rebota con una velocidad inicial de 10 m/s.

1. ¿Cuál es la variación de la cantidad de movimiento de la bola debido al choque?
2. Si la bola está en contacto con el piso 0,02 s, ¿cuál es la fuerza media que ejerce sobre el piso?

Ejercicio 3.3


Un tenista hace picar una pelota de tenis de 60 g, arrojándola verticalmente hacia el piso con una velocidad de 3 m/s desde 80 cm de altura, la que se detiene a la misma altura después del rebote. Determinar el impulso recibido por la pelota en el choque contra el piso. ¿Se conserva la cantidad de movimiento de la pelota en el choque? ¿Y la del sistema formado por el piso y la pelota? ¿Se conserva la energía mecánica de la pelota en su viaje de ida y vuelta? Si no se conserva, ¿qué ocurrió con la misma?

Ejercicio 3.4

Hallar la posición del centro de masa del sistema Tierra-Luna para un instante dado. La masa de la Tierra es unas 82 veces la de la Luna y la distancia entre los centros de la Tierra y de la Luna es de unos 60 radios terrestres. Expresar la respuesta en función de los radios terrestres.

Ejercicio 3.5


Dos cuerpos que se mueven sobre una mesa libre de rozamiento se acercan con las direcciones indicadas en la figura, con velocidades \vec{v}_1 y \vec{v}_2 . Después del choque permanecen unidos. Calcular la velocidad final de ambos.

**Ejercicio 3.6**

Un automóvil de 1000 kg llega a la bocacalle de un cruce, moviéndose a 2 m/s en dirección Norte-Sur, y también llega un camión de 3000 kg , moviéndose a $0,5 \text{ m/s}$ en dirección Oeste-Este. Determinar la cantidad de movimiento de cada uno, y la del sistema formado por ambos vehículos. Suponiendo que chocan y quedan enganchados, determinar con qué velocidad se moverán un instante después de chocar.

Ejercicio 3.7


Se tienen dos carritos A y B que pueden desplazarse con rozamiento despreciable sobre el riel horizontal de la figura. La masa del carrito A es 2 kg .



1. El carrito A es lanzado con una velocidad de 7 m/s contra el B, que está en reposo. Ambos experimentan un choque perfectamente elástico, y luego de separarse se observa que A retrocede moviéndose a 5 m/s . Determinar la masa del carrito B, y su velocidad luego del choque.
2. En otra experiencia, se lanza al carrito B contra el A, ahora en reposo, y se mide una velocidad $|\vec{v}_A| = 12 \text{ m/s}$ luego de separarse. Hallar las velocidades inicial y final de B.

Ejercicio 3.8

Dos astronautas, A y B, de 120 kg cada uno, se encuentran en reposo cerca de su cápsula, que constituye su sistema de referencia. A tiene en sus manos una muestra rocosa M de 30 kg, y se la envía a B para que la examine. La muestra es arrojada por A con una velocidad de 0,4 m/s respecto a la cápsula.



1. Determinar la velocidad que tendrá A luego de arrojar la muestra (en módulo y sentido) y la energía que se ha transformado en energía cinética en ese proceso.
2. Hallar la velocidad de B luego de recibir la muestra, y la energía cinética perdida en ese proceso.
3. Determinar los impulsos recibidos por M en el lanzamiento, y en su choque contra B.

Ejercicio 3.9

Una explosión hace estallar una piedra de 30 kg en tres partes: una de 10 kg que sale con una velocidad de 6 m/s, y otra de 8 kg que sale con una velocidad de 8 m/s y un ángulo de 70° con la dirección de la anterior. Desprecie la acción de la gravedad durante el proceso.

1. Demostrar que el vector velocidad del tercer trozo está contenido en el plano definido por los otros dos. ¿Por qué?
2. Averiguar la velocidad y la dirección con que se desprende dicho trozo.

Ejercicio 3.10


Una masa de 2,00 kg en reposo que contiene una pequeña carga explosiva de masa despreciable se desintegra en tres fragmentos. Dos de ellos tienen masas idénticas de 0,50 kg cada uno; el tercero tiene una masa de 1,00 kg. Las velocidades de los fragmentos de 0,50 kg forman un ángulo de 60° entre sí y la magnitud de dichas velocidades es de 100 m/s. Entonces el módulo de la velocidad del fragmento de 1,00 kg será:

1. $|\vec{v}_3| = 6,6 \text{ m/s}$
2. $|\vec{v}_3| = 86,6 \text{ m/s}$

3. $|\vec{v}_3| = 50,5 \text{ m/s}$
4. $|\vec{v}_3| = 22,2 \text{ m/s}$
5. $|\vec{v}_3| = 70,1 \text{ m/s}$
6. $|\vec{v}_3| = 100 \text{ m/s}$

Ejercicio 3.11

Una bala de 20 g choca y se incrusta contra un bloque de 180 g que está sujeto al extremo de una barra de masa despreciable, de 20 cm de longitud, que puede girar libremente en un plano horizontal. Despreciando rozamientos, y sabiendo que la barra resiste una fuerza máxima de 400 N sin romperse, determinar la máxima velocidad con que puede llegar a chocar la bala.



Ejercicio 3.12

Se recubre el borde de dos discos de hockey sobre hielo con una cinta VELCRO, de modo que los dos discos se adhieran al chocar. Inicialmente el disco 1 tiene una velocidad de 8 m/s en la dirección de las x positivas, y el disco 2 tiene una velocidad de 10 m/s formando un ángulo de 120° respecto a la dirección de las x positivas. Los dos discos chocan y se pegan. ¿Qué fracción de la energía cinética total inicial se disipa en la colisión?


1. 20 %
2. 40 %
3. 74 %
4. 99 %
5. 53 %
6. 9 %

Ejercicio 3.13

Un bloque de 40 kg es lanzado con velocidad inicial 100 m/s en una dirección que forma un ángulo de 30° con la horizontal. En el punto más alto de la trayectoria se divide en dos partes iguales. Una de ellas cae verticalmente, comenzando con una velocidad de 10 m/s hacia abajo. Calcule las distancias entre el punto de lanzamiento y cada uno de los puntos de impacto de los fragmentos con la superficie.

Ejercicio 3.14

Dos bolas de masas m_1 y m_2 están unidas por una barra de masa despreciable y longitud L . Inicialmente el sistema se halla en equilibrio inestable, estando la barra en posición vertical y m_2 en contacto con una superficie horizontal, libre de rozamiento (ver figura). Se aparta el sistema de la posición de equilibrio inclinando levemente la barra. El sistema evoluciona de modo que en el estado final las dos bolas están en contacto con la superficie.



Estado Inicial

1. Hallar la posición del centro de masa en el estado inicial.
2. Hallar la componente horizontal de la velocidad del centro de masa.
3. ¿A qué distancia de P quedará cada bola en el estado final?

3.2. Trabajo

Ejercicio 3.15

Claudia pesa 60 kgf, y viaja en un ascensor desde el piso 4 hasta la planta baja. Hallar el trabajo que realiza la fuerza que ejerce el piso del ascensor ("normal") sobre ella, en los siguientes tramos de 4 m de longitud cada uno:

1. Arranque con aceleración constante, de $0,5 \text{ m/s}^2$
2. Descenso con velocidad constante, de 2 m/s
3. Frenado con aceleración constante, de $0,5 \text{ m/s}^2$

Ejercicio 3.16

Un arquero tira hacia atrás la cuerda de su arco $0,4 \text{ m}$ al ejercer una fuerza que aumenta uniformemente de cero a 230 N .

1. ¿Cuál es la constante de resorte equivalente del arco?
2. ¿Cuánto trabajo realiza el arquero al estirar su arco?

Ejercicio 3.17

El bloque de 50 kg asciende por el plano inclinado de la figura y recorre 2 m sobre el mismo, con la fuerza horizontal constante F_1 aplicada de 600 N . También actúa una fuerza de rozamiento de 100 N . Hallar:

1. El trabajo que realiza F_1
2. El que realiza la fuerza de rozamiento.
3. El que realiza el peso del bloque.
4. El que realiza la fuerza de vínculo, normal al plano.
5. La fuerza resultante que actúa sobre el bloque, y su trabajo.
6. La velocidad del bloque luego de ascender los 2 m , si al comienzo tenía una velocidad de $0,6 \text{ m/s}$.
7. Las energías cinéticas inicial y final del bloque.

Ejercicio 3.18

Una partícula se somete a una fuerza F_x que varía con la posición, como se muestra en la figura. Encontrar sin hacer cuentas, el trabajo total invertido por la fuerza.

Ejercicio 3.19

Una fuerza $\vec{F} = (4x\hat{x} + 3y\hat{y}) \text{ N/m}$ actúa sobre un objeto mientras el objeto se mueve en la dirección x desde el origen hasta $x = 5 \text{ m}$. Hallar el trabajo invertido por la fuerza sobre el objeto.

Ejercicio 3.20

Se tiene un resorte cuya longitud sin carga es $0,8\text{ m}$, y su constante elástica es 500 N/m . Dejando fijo un extremo, se lo estira hasta que su longitud es el doble de la original (Posición A), para luego comprimirlo hasta la mitad de su longitud natural (Posición B). Se pide:

1. Graficar la componente de la fuerza que ejerce el resorte, en función de su elongación.
2. Determinar el trabajo que realiza la fuerza elástica, al estirarlo desde la posición inicial hasta A .
3. Hallar el trabajo realizado por la fuerza elástica entre las posiciones A y B .

Ejercicio 3.21

Un objeto de 3 kg tiene una velocidad de $(6\hat{x} - 2\hat{y})\text{ m/s}$.

1. ¿Cuál es su energía cinética en ese momento?
2. ¿Cuál es el trabajo neto invertido por el objeto si su velocidad cambia a $(8\hat{x} + 4\hat{y})\text{ m/s}$?

Ejercicio 3.22

Considerar un cuerpo de masa m que cuelga de una cuerda de longitud L y masa despreciable, cuyo otro extremo se halla fijo al punto O . Sobre el cuerpo actúa una fuerza $F = F_0 \cos \theta$ que produce su desplazamiento desde el punto A hasta el punto B (ver figura, θ es el ángulo con respecto a la dirección OA).

1. Calcular, utilizando coordenadas polares, el trabajo ejercido por la fuerza F para elevar la masa desde A hasta B , en los casos en que:
 - a) F es una fuerza horizontal.
 - b) F es una fuerza tangente a la trayectoria.
2. Repetir el cálculo en el caso de que la partícula recorra el camino en sentido inverso (desde B hasta A). Compare con el valor obtenido en el inciso anterior.

Ejercicio 3.23

El forzado Igor levanta una pesa de 200 kg por encima de su cabeza, desde el suelo hasta una altura de 2 m .

1. Hallar el trabajo que realiza la fuerza peso de la misma, en el ascenso.
2. ¿La fuerza que ejerce Igor es constante? Hallar el trabajo que realiza esta fuerza. (Sugerencia: tener en cuenta que la velocidad inicial y final de la pesa son nulas).
3. Calcular el trabajo que realiza Igor al mantener a la pesa en esa posición durante 10 segundos.
4. Desde la posición anterior, hace descender a la pesa hasta su pecho, quedando a $1,2\text{ m}$ sobre el suelo. Hallar el trabajo que realiza la fuerza peso de la misma, en el descenso.

5. ¿Qué trabajo habría realizado la fuerza peso, si Igor hubiera levantado la pesa desde el piso sólo hasta su pecho? Comparar con la suma de los trabajos hallados en 1 y en 4.

Ejercicio 3.24

Determinar el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento que actúa sobre un cuerpo de 20 kg, al desplazarlo desde el punto A hasta el B del esquema (vista desde arriba de las trayectorias) tirando de él con una cuerda paralelamente a la superficie horizontal donde está apoyado, si el coeficiente respectivo es $\mu_d = 0,4$.

1. Por el camino directo (1)
2. Pasando previamente por C (Camino 2)
3. Por la semicircunferencia ADB (Camino 3)
4. ¿Es conservativa la fuerza de rozamiento?
5. Hallar el trabajo que realiza la fuerza que ejerce la cuerda en cada caso, suponiendo que el objeto se desplaza con velocidad de módulo constante.

3.3. Conservación de la energía

Ejercicio 3.25

Una máquina eleva verticalmente una carga de 200 kg mediante una cuerda que se arrolla en un tambor de 20 cm de radio. Determinar la potencia desarrollada por la fuerza que ejerce el cable, cuando el tambor gira a 300 rpm, con velocidad angular constante.

Ejercicio 3.26

Una grúa iza verticalmente una caja de caudales de 400 kg, que parte del reposo con aceleración constante durante 2 s, hasta alcanzar una velocidad de 2 m/s; prosigue con ella durante 5 s, para frenar luego y detenerse en otros 2 s.

1. Graficar la velocidad de la caja en función del tiempo.
2. Graficar la fuerza que ejerce el cable, en función del tiempo.
3. Graficar la potencia que desarrolla la fuerza que ejerce el cable, en función del tiempo.
4. A partir de este último gráfico, determinar el trabajo que realiza dicha fuerza, y expresarlo en kWh. Comparar con el trabajo del peso.
5. Determinar la potencia media desarrollada por el cable.
6. Determinar la potencia máxima en todo el proceso.
7. ¿Cuál debería ser la potencia mínima del motor de la grúa? (formular las hipótesis necesarias).

Ejercicio 3.27

La potencia del motor de un vehículo le alcanza para subir por una pendiente de 60° con una velocidad de 10 km/h. Si subiera por otra pendiente de 30° , sin modificar la velocidad, ¿en qué porcentaje disminuiría la potencia?

1. 13 %
2. 30 %
3. 42 %
4. 50 %
5. 58 %
6. 87 %

Ejercicio 3.28

Sabiendo que la energía eléctrica cuesta \$0,08 kWh (8 centavos de pesos por cada kWh de energía), mantener encendida una bombita de 100 W durante todo el día un mes completo (30 días) cuesta:

1. \$57,6
2. \$12,8
3. \$5,76
4. \$1,28
5. Ninguno de los anteriores.

Apéndice A


Conocimientos previos de matemática

Esta guía introductoria contiene ejercicios y problemas con algunos contenidos de geometría, álgebra y análisis que serán de utilidad para encarar los problemas de Física que veremos a lo largo del curso. Notarán que aparecen ejercicios y situaciones problemáticas donde tendremos que hacer uso de nuestro conocimiento de trigonometría, resolución de ecuaciones de una o varias variables y de sistemas de ecuaciones lineales, así como operaciones sencillas con vectores y cálculo de derivadas e integrales de funciones.

A.1. Trigonometría


Ejercicio A.1

Un péndulo está formado por una pesa y un hilo que mide 2 m de longitud. En su máxima amplitud forma un ángulo de 60° con la vertical. Si está colgado en una viga a 4 m del suelo, te pedimos calcular a qué altura del piso se encuentra la pesa en ese instante.



Ejercicio A.2

Dos técnicos intentan grabar una explosión para usar como efecto especial en una producción cinematográfica. Por obvias cuestiones de seguridad intentan mantenerse lo más lejos posible de la explosión. Si se disponen a realizar dicha tarea según el diagrama que se muestra a continuación, ¿qué longitud debe tener el caño que sostiene al micrófono?



Ejercicio A.3

Para un triángulo ABC , donde las coordenadas de cada vértice son:

$$A = (3\sqrt{8}, 5\sqrt{8})$$

$$B = (3\sqrt{8}, \sqrt{8})$$


$$C = (-\sqrt{8}, \sqrt{8})$$

Calcular:

- La distancia entre vértices A y C . (Hipotenusa del triángulo).
- La distancia entre B y D , siendo D el punto medio entre A y C .

Ejercicio A.4

Hallar la distancia entre los puntos A y B (extremos del segmento), cuyas coordenadas en el sistema cartesiano están indicadas en el gráfico.




Ejercicio A.5

Dado un triángulo rectángulo de catetos $A = \log_2(x^2)$ y $B = \log_2(x)$ e hipotenusa $C = \sqrt{451}$, hallar el valor de x que verifica $x > 1$. Sugerencia: usar el teorema de Pitágoras.

Ejercicio A.6

El pullman del teatro Gran Rex, sector correspondiente al primer piso, está formado por 8 filas de asientos ubicados en 8 escalones (todos de igual longitud y altura). En base al gráfico que exhibe un corte lateral de dicho sector, te pedimos que determines el desnivel

h existente entre la octava fila (por donde se encuentra el acceso) y la primera (donde está la baranda que separa a las plateas de planta baja).




Ejercicio A.7

En la escuela media muy probablemente nos hayan definido el concepto de velocidad como la distancia que recorre un móvil en una unidad de tiempo. Posteriormente veremos que esta definición no es del todo completa y podría recibir diferentes críticas. No obstante, como una primera aproximación al concepto verdadero podríamos aceptarla con cierto cuidado si nuestro objetivo fuese, por ejemplo, estimar el tiempo que tarda en conectar dos puntos fijos un objeto o una señal que viaja en línea recta y siempre con la misma rapidez. En ese caso por argumentos trigonométricos podemos resolver situaciones sencillas como las que te presentamos a continuación.


Ejercicio A.8

Dos prestigiosos ingenieros de sonido egresados de la Untref, fueron vistos de vacaciones en San Martín de los Andes, disfrutando de la buena vida. Deciden poner a prueba sus conocimientos de Física del sonido y uno de ellos sube hasta la cima de una colina, mientras el otro permanece en la ladera. Extienden una fina sogá que lleva engarzada en cada uno de sus extremos una lata de tomates. Deciden comunicarse a través de este dispositivo primitivo, y para ello la estiran con fuerza utilizando una lata como micrófono y la otra como parlante. El desnivel entre la posición de estos muchachos es de 40 m formando un ángulo de 53° , como muestra la figura. Si la onda que viaja por la sogá demora 1,67 s en ir desde un extremo al otro, queremos que calcules a qué velocidad se propaga esta señal por este medio. ¿Es mayor o menor que la velocidad del sonido en el aire?



Ejercicio A.9

Se produce un relámpago entre dos nubes de tormenta ubicadas a 3000 m de altura. Esto genera un trueno que es percibido 10 s después en la estación Caseros. Si la estación Santos Lugares se encuentra 1400 m más alejado de la posición de la estación Caseros, tal como muestra el esquema, nos gustaría saber: ¿cuánto vale el ángulo α entre las nubes y la posición de la estación Santos Lugares? A saber: $v_s = 340$ m/s.


**Ejercicio A.10**

Usando identidades trigonométricas, hallar la expresión equivalente más reducida posible.

1. $\sin(\alpha) \left[\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) + \frac{1}{\tan(\alpha)} \right]$
2. $\left[\frac{3}{2} \cos(\alpha) + \frac{\sin(\alpha)}{2 \tan(\alpha)} \right]^2 - 2$

Ejercicio A.11

Elegí la opción correcta para el ángulo β de la figura.



1. $\beta = -(\theta - 90^\circ)$
2. $\beta = \theta$
3. $\beta = -(\theta - 180^\circ)$

4. $\beta = \theta - 90^\circ$
5. Ninguna de las anteriores.

A.2. Vectores

Ejercicio A.12

Graficar los vectores $\vec{v}_1 = (3, 2)$ y $\vec{v}_2 = (2, 4)$, efectuar las operaciones indicadas y graficar su resultante.

1. $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$
2. $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$
3. $\vec{v}_1 + \frac{1}{2}\vec{v}_2$
4. $\vec{v}_1 - 3\vec{v}_2$

Ejercicio A.13

Calculá la longitud de los siguientes vectores:

1. $\vec{v}_1 = (3, 0)$
2. $\vec{v}_2 = (2, 1)$
3. $\vec{v}_3 = (-3, -4)$
4. $\vec{v}_4 = \left(3^{\frac{1}{2}}, 3^{\frac{1}{2}}, 3^{\frac{1}{2}}\right)$
5. $\vec{v}_5 = (-2, 3, 0)$

Ejercicio A.14

Expresá en coordenadas polares los siguientes vectores:

1. $\vec{v}_1 = (4, 4)$
2. $\vec{v}_2 = (-3, 4)$
3. $\vec{v}_3 = (2, 3)$
4. $\vec{v}_4 = (-6, -3)$
5. $\vec{v}_5 = (2, -1)$

Ejercicio A.15

Dado un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ que forma con los ejes x e y ángulos de 60° y tiene módulo 4, calculá:

1. Sus componentes en coordenadas cartesianas.

2. El ángulo que forma con el eje z .

Ejercicio A.16

Dados los vectores $\vec{v}_1 = \frac{1}{7}(2, 3, 6)$, $\vec{v}_2 = \frac{1}{7}(3, -6, 2)$ y $\vec{v}_3 = \frac{1}{7}(6, 2, -3)$, demostrar que:

1. Sus respectivos módulos valen la unidad.
2. Son perpendiculares entre sí.
3. \vec{v}_3 es el producto vectorial entre \vec{v}_1 y \vec{v}_2 .

Ejercicio A.17

Si el producto vectorial entre dos vectores \vec{v}_1 y \vec{v}_2 da $(3, -6, 2)$ y sus respectivos módulos son 4 y $\sqrt{7}$, calcula su producto escalar.

Ejercicio A.18

Dados los vectores $\vec{v} = (3, 60^\circ)$ y $\vec{w} = (2, 150^\circ)$, determinar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta.

1. \vec{v} tiene módulo 3 y forma un ángulo de 30° con la horizontal.
2. \vec{v} forma un ángulo de 30° con la horizontal y es ortogonal a \vec{w} .
3. \vec{v} forma un ángulo de 30° con la horizontal y es paralelo a \vec{w} .
4. $\vec{v} = 3[\sin(60^\circ)\hat{i} + \cos(60^\circ)\hat{j}]$ y no es ortogonal a \vec{w}
5. Está mal escrito.

Ejercicio A.19

Dada la ecuación $2a^2\hat{i} + 3b\hat{j} - 6\hat{i} = 8b\hat{i} + 18\hat{j} - 9\hat{i}$ decir cuánto valen a y b .

Ejercicio A.20

Si $(2, x) \cdot (x, 1) = 10$

1. ¿Cuánto vale x ?
2. ¿Cuánto vale el ángulo que forman $(2, x)$ y $(x, 1)$?

Ejercicio A.21

¿Por qué $(2, 4, 6) \times (3, 6, 9)$ da como resultado el vector nulo?

A.3. Derivadas e integrales

Ejercicio A.22

Determinar en qué puntos se cortan las funciones

$$x_1(t) = \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right) + 9$$

$$x_2(t) = -2t^2 + \frac{3}{2}t + 10$$

Ejercicio A.23

Dado el vector $\vec{v} = A[\cos(\omega t) \ ; \ \sin(\omega t)]$ donde A y ω son parámetros constantes y t es una variable independiente, te pedimos:

1. Hallar su módulo y la derivada respecto a t de su módulo.
2. Hallar $\frac{d\vec{v}}{dt}$ y el módulo de esta derivada.
3. Verificar que \vec{v} y $\frac{d\vec{v}}{dt}$ son perpendiculares.

Ejercicio A.24

¿Cuál es la interpretación física de la derivada? Da tres ejemplos prácticos sobre la utilización de la derivada para modelar fenómenos físicos.

Ejercicio A.25

Calculá la derivada por definición de las siguientes funciones.

1. $y_1(x) = x^2 + 1$
2. $y_2(x) = 2x^3$

Ejercicio A.26

¿De dónde sale la ecuación de “derivada por definición”? Escribí la demostración de la derivada por definición.

Ejercicio A.27

Dados los vectores $\vec{v}_1 = [2t, \sin(t), 0]$ y $\vec{v}_2 = [0, 2\cos(t), t^2]$, realizar las siguientes operaciones y sacar conclusiones sobre la relación que hay entre los resultados.

1. $\frac{d}{dt}(\vec{v}_1 + \vec{v}_2)$
2. $\frac{d\vec{v}_1}{dt} + \frac{d\vec{v}_2}{dt}$

3. $\frac{d}{dt} \|\vec{v}_1 + \vec{v}_2\|$

4. $\frac{d}{dt} (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2)$

5. $dt \left[\frac{d}{dt} \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 \right]$

Ejercicio A.28

Dados los vectores $\vec{v}_1 = (t^2, t, 1)$ y $\vec{v}_2 = (1, t, t + 1)$, resolver las siguientes integrales.

1. $\int (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) dt$

2. $\int (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2) dt$

3. $\int (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2) dt$

Ejercicio A.29

Sea la función $3 \cos(\alpha t^2) - 6 \sin(\alpha t) + 10$.

1. Determinar la opción correcta:

- a) Tiene un mínimo en 1 y no tiene máximo.
- b) Falta conocer el valor de alfa para obtener mínimos y máximos de la función.
- c) Tiene un mínimo en $t = \tan(\alpha)$ y no está acotada.
- d) Tiene un mínimo en $t = \tan(\alpha)$ y no está acotada superiormente.
- e) La función está mal escrita, debería reemplazarse t por x para decir algo sobre ella.

2. Describí un método apropiado para hacer un gráfico de la función anterior.

Ejercicio A.30

Dada la función $x(t) = 6t^2 - at + b$.


- 1. ¿Cuánto tiene que valer b para que la función tenga un mínimo en $t = 2$?
- 2. ¿Cuánto tiene que valer b para que la imagen de $x(t)$ sea el conjunto $(-6, \infty)$?

Ejercicio A.31

Dadas las funciones $g(u)$ y $x(y)$. ¿Cuánto vale $\frac{d}{dy} g(x^2)$?

Ejercicio A.32

Considera la función de la figura y decí cuál de las afirmaciones a continuación es verdadera.



1. La función tiene derivada positiva en el intervalo $(0, 2) \cup (5, \infty)$.
2. La función tiene derivada negativa en el intervalo $(3; -1, 5)$.
3. La función tiene derivada nula en 3 y $-1,5$.
4. La función tiene derivada positiva en el intervalo $(0, 2) \cup (5, x)$ donde x es un valor mayor a 5.
5. La derivada segunda de la función es negativa en $-1,5$ y positiva en 2.

Ejercicio A.33

Sean r y \hat{r} funciones de t que pertenecen a $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Calcular la derivada $\vec{r} = r \hat{r}$.
2. Suponer ahora que $\hat{r} = \cos(\theta) \hat{i} + \sin(\theta) \hat{j}$ y, usando regla de la cadena, derivar \hat{r} y reemplazarla en el ítem anterior.
3. Reescribir la expresión que quedó, de manera que $\dot{\vec{r}} = \vec{r}(r, \dot{r}, \dot{\theta}, \hat{r}, \hat{\theta})$.

Ejercicio A.34

Considera el siguiente enunciado: “La rapidez de cambio de b a través del tiempo es proporcional a la variable c en función del tiempo”. Decí cuál es la ecuación que rige el comportamiento de b .

Ejercicio A.35

Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales.

1. $\ddot{y} - cy = 0$ con $\dot{y}(0) = 0 \wedge y(0) = 3$
2. $\ddot{y} + cy = 0$ con $\dot{y}(0) = 0 \wedge y(0) = 3$
3. $\ddot{y} - cy = 0$ con $\dot{y}(0) = 1 \wedge y(0) = 0$

4. $\ddot{y} - c y = d$ con $\dot{y}(0) = 0 \wedge y(0) = 3$

5. $\ddot{y} - c \dot{y} + d y = 0$ con $\dot{y}(0) = 0 \wedge y(0) = 3$