Kopier denne LATEX fil!

Arinbjörn, Benjamin & Mathias

12. oktober, 2015

Contents

1	Lister	2
	Ligninger2.1 Binomial Theorem2.2 Taylor Serier	2
3	Tabeller	2
4	Andre Matematiske Udtryk 4.1 Diverse	4

Abstract

Det her dokument indeholder en masse af de ting, som man normalt vil få brug for. Lav en ny LATEXfil og se om du kan få det til at se ud præcist som dette! Brug det udleverede cheat sheet, for der vil uden tvivl være nogle kommandoer du ikke kan huske udenad. Endvidere kan detexify.kirelabs.org benyttes til at finde koden for symboler man ikke kan huske. En skabelon til dette dokument kan findes på rotendahl.dk/skabelon.tex. Skabeloner til andre dokumenter du kunne finde på at lave, eksempelvis din SRP, kan findes på latextemplates.com.

 $\binom{i}{i}$

1 Lister

- 1. Første punkt (Fed skrift)
- 2. Andet punkt (I kursiv)
- 3. Tredje punkt (Stor skrift)
 - (a) Første underpunkt (Lille skrift)
 - (b) Andet underpunkt (Endnu mindre skrift)
 - (c) Tredje underpunkt (Kæmpe skrift)
- Bullet Point (Sans Serif)
- CIRCLE POINT (SMALL CAPS)

2 Ligninger

2.1 Binomial Theorem

[Binomial Theorem] For ethvert ikke-negativt heltal n, har vi at

$$(1+x)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i$$

2.2 Taylor Serier

Taylor¹-udvidelsen for funktionen e^x er givet ved

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots = \sum_{n \ge 0} \frac{x^n}{n!}$$

3 Tabeller

Lad os lave nogle tabeller!

venstrestillet	midterstillet	højrestillet
1	3.14159	5
2.4678	3	1234
3.4678	6.14159	1239

Mon man kan samle rækkerne i en tabel?

	Forsøg 1	Forsøg 2
Antal ramte	4	3
	5	5
	2	4

¹Der er her ikke tale om Taylor Swift. Læs mere på https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_series

Hvad med kolonnerne?

Country List				
Land/område	ISO ALPHA 2	ISO ALPHA 3		
Afghanistan	AF	AFG		
Aland Islands	AX	ALA		
Albania	AL	ALB		
Algeria	DZ	DZA		
American Samoa	AS	ASM		
Andorra	AD	AND		
Angola	AO	AGO		

Tabel 1: Det kunne man sørme godt!



Figure 1: Hjælp! En bjørn angriber min pdf!

4 Andre Matematiske Udtryk

Her er lidt ekstra matematiske udtryk

4.1 Diverse

$$a = (a+b) \left[1 - \frac{b}{a+b} \right],$$

$$\sqrt{|xy|} \le \left| \frac{x+y}{2} \right|,$$

$$\int_a^b u \frac{d^2v}{dx^2} dx = u \frac{dv}{dx} - \int_a^b \frac{du}{dx} \frac{dv}{dx} dx,$$

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{if } x \ge 0, \\ -x, & \text{if } x < 0. \end{cases}$$

4.2 Matricer

$$\begin{bmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + xy \\ y - 1 \end{bmatrix},$$

4.3 Funktioner

$$\exp(i\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$$
, $\sinh(\log x) = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right)$

Og så lidt mere komplicerede funktioner

$$\begin{split} \lim_{q \to \infty} \|f(x)\|_q &= \max_x |f(x)|, \\ e^x &= \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!} \quad \text{where } n! = \prod_{i=1}^n i\,, \\ \overline{U_\alpha} &= \bigcap_\alpha U_\alpha \,. \end{split}$$

Når man skriver inline matematik sørger LATEXselv for at det vertikale mellemrum passer som i følgende: $1/(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$.

4.4 Mængder

Theorem 1 For enhver mængde A, B og C, har vi at

$$(A \cup B) - (C - A) = A \cup (B - C)$$

Bevis:

$$(A \cup B) - (C - A) = (A \cup B) \cap (C - A)^{c}$$

$$= (A \cup B) \cap (C \cap A^{c})^{c}$$

$$= (A \cup B) \cap (C^{c} \cup A)$$

$$= A \cup (B \cap C^{c})$$

$$= A \cup (B - C)$$