

Colles - Semaine 8

Exercice 1

On considère l'espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ muni de sa base canonique $\mathcal{B} = (M_1, M_2, M_3, M_4)$ avec

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, M_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soit $f : \begin{cases} \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto & {}^t M \end{cases}$ et $g : \begin{cases} \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto & M + {}^t M \end{cases}$

1. Montrer que $f \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$ et $g \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$.
2. Déterminer la matrice A de f relativement à la base \mathcal{B} .
3. En déduire sans calcul supplémentaire la matrice de g relativement à la base \mathcal{B} .
4. Les applications f et g sont-elles des automorphismes ? Si oui, déterminer l'application réciproque.
5. Si a et b sont deux automorphismes, est-ce que $a + b$ est également un automorphisme ?

Exercice 2

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ dans la base canonique de \mathbb{R}^3 .

1. Montrer que $f \circ f = 0$.
2. Sans calcul, déterminer si f est bijectif.
3. Montrer que $\text{Im}(f)$ est inclus dans $\text{Ker}(f)$.
4. En déduire les dimensions de ces 2 espaces vectoriels.
5. Déterminer des bases de $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.
6. Soit $u \notin \text{Ker}(f)$ et $v \in \text{Ker}(f)$.
 - a) Montrer que la famille $(u, f(u))$ est libre dans \mathbb{R}^3 .
 - b) Montrer que la famille $(u, f(u), v)$ est une base de \mathbb{R}^3 .
 - c) Déterminer la matrice de f dans la base $(u, f(u), v)$.

Exercice 3

On note f l'application définie sur \mathbb{R}^3 par : $f((x, y, z)) = (y + z, y, x + y)$

1. Montrer que f est un endomorphisme de \mathbb{R}^3 .
2. Déterminer le noyau de f . En déduire le rang de f .
3. Déterminer l'image de f .
4. Montrer que f est un automorphisme de \mathbb{R}^3 .
5. Montrer que $H = \{u \in \mathbb{R}^3 / f(u) = u\}$ est un espace vectoriel réel.
Déterminer une base de H .
6. On note F l'ensemble défini par $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y = 0\}$.
Montrer que f stabilise F , i.e. $f(F) \subset F$.

Exercice 4

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

On dit qu'un endomorphisme f de E est un projecteur si $f \circ f = f$.

On considère p et q deux projecteurs de E .

1. Montrer que $p + q$ est un projecteur de E si et seulement si $p \circ q = q \circ p = 0$.

2. On suppose dans cette question que $p + q$ est un projecteur de E .

Montrer que

$$\text{Ker}(p + q) = \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$$

$$\text{Im}(p) \cap \text{Im}(q) = \{0\}$$

$$\text{Im}(p + q) = \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$$

(si A et B sont deux espaces vectoriels, on note $A + B = \{a + b \mid a \in A \text{ et } b \in B\}$)

Exercice 5

L'application f désigne un endomorphisme de \mathbb{R}^n . On munit \mathbb{R}^n d'une base (e_1, \dots, e_n) .

1. On suppose que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \exists \lambda_x \in \mathbb{R} \text{ tel que } f(x) = \lambda_x x$$

a) Écrire de deux manières différentes le vecteur $f(e_1 + \dots + e_n)$.

b) En déduire qu'il existe un réel λ tel que $f = \lambda \cdot \text{id}$.

2. Soit x un vecteur non nul de \mathbb{R}^n .

Justifier qu'il existe une base de \mathbb{R}^n de la forme $(x, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$.

On note alors p_x l'application de \mathbb{R}^n dans \mathbb{R}^n définie par :

$$\forall (a, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n, p_x \left(a \cdot x + \sum_{k=2}^n b_k \cdot \varepsilon_k \right) = a \cdot x$$

a) Montrer que p_x est un endomorphisme de \mathbb{R}^n .

b) Montrer que pour tout $z \in \mathbb{R}^n$, on a

$$p_x(z) = z \Leftrightarrow z \in \text{Vect}(x)$$

3. Montrer l'équivalence suivante :

$$\forall g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n), f \circ g = g \circ f \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, f = \lambda \cdot \text{id}$$