Manejo de Malezas





PAJA DE PATILLO

| Nombre común: | PAJA DE PATILLO |
|---|--|
| Sinónimos: | Paja de arroz, liendre de puerco |
| Nombre científico: | Echinochloa colona |
| Familia botánica: | Poaceae |
| Ciclo de vida (anual/perenne): | Anual |
| Descripción: | Raíz: Fibrosa y adventicias en de nudos basales Tallo: Algo decumbente, muy ramificado y morado en la base Hojas: Lanceoladas de tonalidad verde oscuro, sin lígula y aurícula Inflorescencia: Espiga Frutos: Cariópside |
| Propagación: | Por semillas |
| Importancia agrícola (efecto en el cultivo): | Esta especie infesta campos arroceros de zonas de secano y riego: Montalvo, Babahoyo, Quevedo, Samborondón, Daule, Santa Lucía. |
| | Cultural: Buena preparación de suelos, adecuada distancia y densidad de siembra, manejo óptimo del riego y la fertilización, mantener los muros limpios y completar con deshierbas manuales. |
| Manejo: | Químico: |
| | PRE-EMERGENTE |
| | Pendimetalin 2,5-3,0 lt/ha; Oxadiazón 2,0-2,5 lt/ha; Clomazone 1,0-1,2 lt/ha; Oxifluorfen 0,8-1,0 lt/ha; Butaclor 4,0-5,0 lt/ha; Bentiocarbo 2,5-3,0 lt/ha. |
| | POST-EMERGENTE |
| | Propanil 3,5-4,0 lt/ha; Cihalofop butyl 1,0-1,5 lt/ha; Fenoxaprop ethyl 0,85-1,25 lt/ha; Profoxidim 0,6-0,7 lt/ha; Bispiribac sodium 0,35 lt/ha; Penoxulam 1,3-1,4 lt/ha; Quinclorac 1,3-1,5 lt/ha. |
| Referencia bibliográfica: | Lorenzi, H. |
| Para mayor información: | luis.penaherrera@iniap.gob.ec |





Etapa vegetativa Etapa de floración