



Manejo de Enfermedades

Antracnosis

Nombre Científico: Colletotrichum gloeosporioides Penz

Fuentes de diseminación

Las pequeñas esporas de los hongo, son producidas en hojas y ramas muertas, se dispersan por el agua en temporada de lluvias.

Cuando se presenta?

- Temporadas Iluviosas
- Humedad relativa alta, mayor al 80%.

Síntomas

Ataca principalmente a los frutos, el hongo penetra por las lesiones dejadas por daños mecánicos o insectos y se presentan en forma de lesiones necróticas de forma circular, tornandosé de color café claro a negro y consistencia corchosa.

Las hojas viejas presentan manchas de color verde claro al principio y despues se tornan pardas levemente deprimidas y sin bordes definidos. Al centro de las lesiones aparecen pequeños granos color anaranjado - rojizo.



En las ramas el ataque suele presentarse en forma de manchas blanquecinas, la infección progresa lentamente y provoca la caida de frutos y hojas.





Control

Se comienza eliminando ramas enfermas, recolectar y eliminar frutos afectados. Con aplicaciones de oxicloruro de cobre en dosis de 100 g/100 L de agua o mancozeb a razón de 500 a 700 g/100 L de agua antes de iniciarse la floración, se repite el tratamiento dependiendo de la incidencia, en cuajamiento y desarrollo de frutos.

