Manejo de Malezas





CAMINADORA

| Nombre común: | CAMINADORA |
|---|--|
| Sinónimos: | Voladora |
| Nombre científico: | Rottboellia cochinchinensis |
| Familia botánica: | Poaceae |
| Ciclo de vida (anual/perenne): | Anual |
| Descripción: | Raíz: Fibrosa y adventicia en base de tallo Tallo: erecto, herbáceo, con pelos urticantes Hojas: Cortante, sin lígulas y aurículas Inflorescencia: Panícula Frutos: Cariópside |
| Propagación: | Por semillas |
| Importancia agrícola (efecto en el cultivo): | Esta especie infesta campos arroceros de secano como Babahoyo, Montalvo y Quevedo. |
| | Cultural: Buena preparación de suelos, adecuada distancia y densidad de siembra, manejo óptimo del riego y la fertilización, mantener los muros limpios y completar con deshierbas manuales. |
| Manejo: | Químico: PRE-EMERGENTE |
| | Pendimetalin 2,5-3,0 lt/ha; Oxadiazón 2,0-2,5 lt/ha; Clomazone 1,0-1,2 lt/ha; Oxifluorfen 0,8-1,0 lt/ha; |
| | POST-EMERGENTE |
| | Propanil 3,5-4,0 lt/ha; Cihalofop butyl 1,0-1,5 lt/ha; Fenoxaprop ethyl 0,85-1,25 lt/ha; Profoxidim 0,6-0,7 lt/ha. |
| Referencia bibliográfica: | Lorenzi, H. |
| Para mayor información: | luis.penaherrera@iniap.gob.ec |





Etapa vegetativa Etapa de floración