Manejo de Malezas





ARROCILLO

Nombre común:	ARROCILLO
Sinónimos:	Bigote de ratón
Nombre científico:	Fimbristillis miliacea
Familia botánica:	Cyperaceae
Ciclo de vida (anual/perenne):	Anual
Descripción:	 Raíz: Fibrosa Tallo: Base aplanada, herbáceo, áspero. Hojas: color verde oscuro originadas de la base del tallo. Inflorescencia: Umbela simple o compuesta. Frutos: Aquenios
Propagación:	Por semillas
Importancia agrícola (efecto en el cultivo):	Esta especie infesta campos arroceros de zonas de secano y especialmente de riego como Montalvo, Babahoyo, Samborondón, Daule, Santa Lucía, El Triunfo y Yaguachi.
Manejo:	Cultural: Buena preparación de suelos, adecuada distancia y densidad de siembra, manejo óptimo del riego y la fertilización, mantener los muros limpios y completar con deshierbas manuales. Químico: PRE-EMERGENTE Butaclor 4,0-5,0 lt/ha; Bentiocarbo 2,5-3,0 lt/ha.
	POST-EMERGENTE
	Propanil 3,5-4,0 lt/ha; Bispiribac sodium 0,35 lt/ha; Penoxulam 1,3-1,4 lt/ha; 2,4-D amina 0,5-0,7 lt/ha; MCPA 0,5-0,7 lt/ha; Pyrazosulfuron ethyl 0,25-0,30 Kg/ha.
Referencia bibliográfica:	Lorenzi, H.
Para mayor información:	luis.penaherrera@iniap.gob.ec





Etapa vegetativa Etapa de floración