

# Ejercicios de Análisis Matemático II

20 de abril de 2016

## Índice

<b>1. Sucesiones de funciones</b>	<b>2</b>
1.1. Sucesiones de funciones . . . . .	2
1.2. Series de potencias . . . . .	2
<b>2. Integral de Lebesgue</b>	<b>3</b>
2.1. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^N$ . . . . .	3
2.2. Integral de Lebesgue en $\mathbb{R}^N$ . . . . .	4
2.3. Teoremas de convergencia . . . . .	4
<b>3. Técnicas de integración</b>	<b>5</b>
3.1. Técnicas de integración en una variable . . . . .	5
3.2. Técnicas de integración en varias variables . . . . .	5

## 1. Sucesiones de funciones

### 1.1. Sucesiones de funciones

### 1.2. Series de potencias

## 2. Integral de Lebesgue

### 2.1. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^N$

**5. Probar que  $M$  es la mayor  $\sigma$ -álgebra que contiene los intervalos acotados y sobre la que  $\lambda^*$  es aditiva.**

Supongamos que existe otra  $\sigma$ -álgebra  $N$  que contiene los intervalos acotados y sobre la que  $\lambda^*$  es aditiva. Terminaremos demostrando que en ese caso  $N \subseteq M$ .

Recordemos que  $M = \{B \cup Z : B \in \mathfrak{B}, \lambda^*(Z) = 0\} \subseteq C_{\mathbb{R}, \lambda}$

La  $\sigma$ -subaditividad nos decía:

$$\lambda^*(A \cup B) \leq \lambda^*(A) + \lambda^*(B)$$

Llamaremos  $\lambda' = \lambda^*/N$

Por ser una  $\sigma$ -álgebra  $\Omega \in N$ , al estar hablando de intervalos  $\Omega = \mathbb{R}$

Sea  $E \subseteq \mathbb{R}$ , cogemos un conjunto arbitrario  $A \subseteq \mathbb{R}$ . Sabemos, en virtud de la propiedad de regularidad de la medida exterior (Prop. 2.1.10), que existe un boreliano  $B$

$$B : A \subseteq B, \lambda'(A) = \lambda'(B)$$

$\lambda'(A) = \lambda'(B)$ , usando la propiedad de que  $N$  contiene los intervalos acotados podemos usar la  $\sigma$ -aditividad.  $B \cap E, B \cap E^c \in N$

$$\lambda'(B) = \lambda'((B \cap E) \cup (B \cap E^c)) \geq \lambda'(A \cap E) + \lambda'(A \cap E^c) \geq \lambda'(A)$$

Por tanto  $E \in C_{\mathbb{R}, \lambda'}$  lo que es equivalente a  $E \in M \implies N \subseteq M$

### 7. Existencia de conjuntos no medibles

a) Probar que la familia  $\{x + \mathbb{Q} : x \in \mathbb{R}\}$  es una partición de  $\mathbb{R}$ .

Sea  $x \in \mathbb{R}$ . Entonces  $x \in x + \mathbb{Q}$  dado que  $x = x + 0$ . Por ello,  $\bigcup_{x \in \mathbb{R}} \{x + \mathbb{Q}\} = \mathbb{R}$ .

Sean  $x, y, t \in \mathbb{R} : t \in x + \mathbb{Q}$  y  $t \in y + \mathbb{Q}$ . Entonces  $\exists q_1, q_2 \in \mathbb{Q} : t = x + q_1 = y + q_2$ . Así,  $x = y + q_2 - q_1$ , y, como  $q_2 - q_1 \in \mathbb{Q}$ ,  $x \in y + \mathbb{Q}$  y  $x + \mathbb{Q} = y + \mathbb{Q}$ .

Así, esta familia está formada por conjuntos disjuntos (si un elemento está en dos elementos de la familia, estos son el mismo) cuya unión es  $\mathbb{R}$ : es una partición de  $\mathbb{R}$ .

b) Pongamos  $\{x + \mathbb{Q} : x \in \mathbb{R}\} = \{A_i : i \in I\}$  ( $A_i \neq A_j$  para  $i \neq j$ ) y, para cada  $i \in I$ , sea  $x_i \in A_i \cap ]0, 1]$ . Probar que el conjunto  $E = \{x_i : i \in I\}$  no es medible.

Sea  $\{q_n : n \in \mathbb{N}\}$  una numeración de  $] -1, 1] \cap \mathbb{Q}$ .

Supongamos que  $E$  es medible. En tal caso,  $\lambda(E) = \lambda(E + k) \forall k \in \mathbb{R}$  dado que  $\lambda$  es invariante por traslación. Debido a la  $\sigma$ -aditividad de  $\lambda$  y a que los conjuntos  $q_n + E$  son disjuntos entre sí [proof needed], resulta que:

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} (q_n + E)\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lambda(q_n + E) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lambda(E)$$

Como  $]0, 1] \subseteq \bigcup_{n=1}^{+\infty} (q_n + E) \subseteq ] -1, 2]$  [proof needed], también tendremos que  $\lambda(]0, 1]) = 1 \leq$

$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} (q_n + E)\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lambda(E) \leq \lambda(] -1, 2]) = 3$ . Como esto es imposible tanto si  $\lambda(E) = 0$  (en cuyo

caso  $\sum_{n=1}^{+\infty} \lambda(E) = 0 \not\leq 1$ ) como si  $\lambda(E) \in \mathbb{R}^+$  (en cuyo caso  $\sum_{n=1}^{+\infty} \lambda(E) = +\infty \not\leq 3$ ), la suposición de que  $E$  es medible resulta haber sido incorrecta, y  $E$  no es medible.

c) Probar que cualquier subconjunto medible de  $E$  tiene medida cero.

Los conjuntos  $q_n + A$  son, de nuevo, disjuntos. Por ello, vuelve a ocurrir que  $\lambda(\bigcup_{n=1}^{+\infty} (q_n + A)) = \sum_{n=1}^{+\infty} \lambda(A)$ . De nuevo,  $\bigcup_{n=1}^{+\infty} (q_n + A) \subseteq ]-1, 2]$  y por ello  $\sum_{n=1}^{+\infty} \lambda(A) \leq \lambda(]-1, 2]) = 3$ . La única posibilidad es que  $\lambda(A) = 0$ .

d) Sea  $M \subseteq \mathbb{R}$  con  $\lambda^*(M) > 0$ . Probar que  $M$  contiene un subconjunto no medible.

Si  $M$  no es medible, el enunciado es trivial ( $M$  sería un subconjunto no medible de  $M$ ). Sea  $M$  medible, es decir,  $\lambda(M) = \lambda^*(M)$ . Se observa que  $M = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} M \cap (q + E)$  [proof needed].

Supongamos que  $M \cap (q + E)$  es medible para todo  $q \in \mathbb{Q}$ . En ese caso: (aparece un  $\leq$  porque la unión no es disjunta)

$$\lambda(M) = \lambda\left(\bigcup_{q \in \mathbb{Q}} M \cap (q + E)\right) \leq \sum_{q \in \mathbb{Q}} \lambda(M \cap (q + E)) = \sum_{q \in \mathbb{Q}} \lambda((M - q) \cap E)$$

Que es igual a 0 por ser la suma de las medidas de subconjuntos de  $E$  medibles (porque suponemos que todos son medibles), las cuales son 0 por lo probado en c). Contradicción (hemos obtenido que  $\lambda(M) \leq 0$ ), por lo cual alguno de los  $M \cap (q + E)$  no será medible.

## 2.2. Integral de Lebesgue en $\mathbb{R}^N$

## 2.3. Teoremas de convergencia

### 3. Técnicas de integración

#### 3.1. Técnicas de integración en una variable

#### 3.2. Técnicas de integración en varias variables