Diz osteoartritinde denetimli egzersiz programının ağrı ve işlev üzerine etkisi

Özet

Bu çalışmada diz osteoartriti tanısı almış yetişkinlerde on iki haftalık denetimli egzersiz programının ağrı, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Program, kuvvetlendirme, denge ve aerobik egzersizleri bir araya getirmiştir. Katılımcılar egzersiz grubu ve yalnızca eğitim alan kontrol grubu olarak rastgele iki gruba ayrılmıştır.

Giriş

Diz osteoartriti, orta ve ileri yaştaki yetişkinlerde ağrının ve hareket kısıtlılığının en sık nedenlerinden biridir. Hastalık ilerledikçe kişiler merdiven çıkmak, uzun süre yürümek ve yerden kalkmak gibi günlük işlerde zorlanır. Klinik kılavuzlar egzersizi tedavinin temel taşı olarak önerse de hangi egzersiz bileşeninin ne kadar katkı sağladığı tartışmalıdır. Özellikle kuadriseps kas kuvveti ile ağrı arasındaki ilişki, programların tasarımında belirleyici bir rol oynar. Bu çalışmanın amacı, kuvvetlendirme ağırlıklı denetimli bir programın ağrı ve işlev üzerindeki etkisini ölçmek ve bu etkinin kas kuvvetindeki değişimle ne ölçüde açıklanabildiğini incelemektir.

Yöntem

Çalışmaya 50 ile 75 yaş arasında, en az altı aydır diz ağrısı yaşayan 64 gönüllü katılmıştır. Egzersiz grubu (n = 32) haftada üç gün, fizyoterapist gözetiminde 45 dakikalık seanslara katılmıştır. Seanslar ısınma, kuadriseps ve kalça abdüktör kuvvetlendirmesi, tek ayak üzerinde denge çalışması ve düşük yoğunluklu bisiklet

egzersizinden oluşmuştur. Kontrol grubu (n = 32) hastalık hakkında iki eğitim oturumuna katılmış ve günlük yaşamına devam etmiştir. Ağrı görsel analog skala ile, fonksiyonel kapasite otur-kalk testi ve altı dakika yürüme testi ile, kas kuvveti ise el dinamometresi ile ölçülmüştür. Değerlendirmeler başlangıçta ve on ikinci haftanın sonunda, grup ataması bilinmeyen bir değerlendirici tarafından yapılmıştır.

Bulgular

On iki haftanın sonunda egzersiz grubunda ağrı skoru ortalama 6,8'den 3,9'a düşmüş, kontrol grubunda ise 6,6'dan 6,1'e gerilemiştir (p < 0.001). Altı dakika yürüme mesafesi egzersiz grubunda ortalama 58 metre artarken kontrol grubunda anlamlı bir değişim görülmemiştir. Kuadriseps kas kuvvetindeki artış egzersiz grubunda yüzde 21 olarak ölçülmüş ve ağrıdaki azalmanın yaklaşık üçte birini açıklamıştır (r = 0.46). Tablo 2'de görüldüğü gibi otur-kalk testi süresi de egzersiz grubunda belirgin biçimde kısalmıştır. Programa devam oranı yüzde 88 olmuş, ciddi bir yan etki bildirilmemiştir.

Tartışma

Bulgular, denetimli ve kuvvetlendirme ağırlıklı bir egzersiz programının diz osteoartritinde ağrıyı azaltıp işlevi artırdığını göstermektedir. Kas kuvvetindeki artışın etkinin yalnızca bir bölümünü açıklaması, denge çalışmalarının ve düzenli fiziksel aktivitenin de katkı sağladığını düşündürmektedir. Yüksek devam oranı, fizyoterapist gözetiminin programa bağlılığı desteklediğine işaret eder. Çalışmanın sınırlılıkları arasında izlem süresinin kısa olması ve katılımcıların tek bir merkezden seçilmesi sayılabilir.

Sonuç

On iki haftalık denetimli egzersiz programı, diz osteoartriti olan yetişkinlerde ağrıyı anlamlı ölçüde azaltmış ve yürüme kapasitesini artırmıştır. Kuvvetlendirme, denge ve aerobik bileşenlerin birlikte uygulanması önerilir; uzun dönem etkilerin daha geniş örneklemlerle araştırılması gereklidir.

Kaynaklar

Kaya A, Demir B. Diz osteoartritinde egzersiz yaklaşımları. Kurgusal Derg. 2021;2:10-18.

Yıldız C. Kas kuvveti ve ağrı ilişkisi. Kurgusal Fizyoter Arş. 2022;5:44-52.

Aydın D, Şahin E. Denetimli programlarda devamlılık. Kurgusal Rehabil. 2023;7:3-9.

Öztürk F. Fonksiyonel testlerin güvenirliği. Kurgusal Ölçüm Derg. 2020;1:21-30.