

Universidad del Valle de Guatemala  
Departamento de Matemática  
Licenciatura en Matemática Aplicada

**Estudiante:** Rudik Roberto Rompich  
**E-mail:** [rom19857@uvg.edu.gt](mailto:rom19857@uvg.edu.gt)  
**Carné:** 19857

MM2036 - Estadística Matemática - Catedrático: Paulo Mejía  
21 de mayo de 2021

---

## Parcial 4

Instrucciones: Resuelva los siguientes problema. Favor hacer la solución en latex y cargar el archivo latex y pdf en la tarea de Canvas. Para la resolución de los problemas, se utilizará el libro de Wackerly et al. (2014).

### 1. Problema 1

Sea  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  una muestra aleatoria de una distribución normal con media  $\mu$  y varianza 1.

1. a) Demuestre que  $\bar{Y}$  es un estimador suficiente para  $\mu$ .

*Solución.* content...

□

2. b) ¿Cuál es la distribución de  $\bar{Y}$  con sus parámetros? (Incluya la justificación).
3. c) Encuentre la función generadora de momentos de  $\bar{Y}$  (Incluya la justificación).
4. d) Calcule  $E(\bar{Y}^2)$  y  $E(\bar{Y}^4)$ , utilizando la función generadora de momentos del inciso de  $\bar{Y}$
5. e) Demuestre que el MUEV (estimador insesgado de varianza mínima) de  $\mu^2$  es  $\hat{\mu}^2 = \bar{Y}^2 - \frac{1}{n}$
6. f) Obtenga la  $VAR(\hat{\mu}^2)$ , utilizando el resultado en d ). (Valor 25 puntos).

### 2. Problema 2

Los estimadores de máxima verosimilitud tienen propiedades interesantes cuando se trabaja con muestras grandes. Suponga que  $t(\theta)$  es una función derivable en  $\theta$ . Por la propiedad de invarianza, se tiene que si  $\hat{\theta}$  es el MLE de  $\theta$ , entonces el MLE de  $t(\theta)$  está dada por

$t(\hat{\theta})$ . En algunas condiciones de regularidad que se cumplen para las distribuciones que se consideren,  $t(\hat{\theta})$  es un estimador consistente para  $t(\theta)$ . Además, para tamaño de muestras grandes,

$$Z = \frac{t(\hat{\theta}) - t(\theta)}{\sqrt{\left[\frac{\partial t(\theta)}{\partial \theta}\right]^2 / n E \left[-\frac{\partial^2 \ln[f(Y|\theta)]}{\partial \theta^2}\right]}}$$

tiene aproximadamente una distribución normal estándar, donde  $f(Y | \theta)$  es la función densidad correspondiente a la distribución continua de interés, evaluada en el valor aleatorio  $Y$ . En el caso discreto, el resultado análogo se cumple con la función de probabilidad evaluada en el valor aleatorio  $Y$ ,  $p(Y | \theta)$ , se sustituye por la densidad  $f(Y | \theta)$ . En el caso particular, para una variable aleatoria con distribución de Bernoulli,  $p(y | p) = p^y(1-p)^{1-y}$ , donde  $y = 0, 1$ . Si  $Y_1, \dots, Y_n$  es una muestra aleatoria de tamaño  $n$  de dicha distribución.

1. a) Encuentre el MLE para el parámetro  $p$ .

*Solución.* content...

□

2. b) Encuentre el MLE para la expresión  $p(1-p)$ .
3. c) Construya un intervalo de confianza de  $100(1 - \alpha)\%$  para  $p(1 - p)$ , la varianza de dicha distribución (suponga una muestra grande).

(Valor 25 puntos).

### 3. Problema 3

Suponga que  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  es una muestra aleatoria de la distribución de Poisson con media  $\lambda > 0$ .

1. a) Encuentre el estimador del método de momentos para  $\lambda$ .
2. b) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud (MLE)  $\hat{\lambda}$  para  $\lambda$ . (Valor 25 puntos).

### 4. Problema 4

Sea  $Y$  una variable aleatoria que representa el número de éxitos en  $n$  intentos independientes con probabilidad  $p$  de éxito en cada intento. Además,

$$Y = \sum_{i=1}^n Y_i$$

donde

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{si el } i\text{-ésimo intento resulta en éxito} \\ 0, & \text{en el otro caso} \end{cases}$$

para  $i = 1, \dots, n$

1. a) Demuestre que  $\hat{p}_n = \frac{Y}{n}$  es un estimador insesgado de  $p$ .
2. b) Demuestre que  $\hat{p}_n$  es un estimador consistente de  $p$ .
3. c) Cuando  $n$  es grande, demuestre que la distribución de  $\frac{\hat{p}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}$  converge a una distribución normal estándar.
4. d) Cuando  $n$  es grande, demuestre que la distribución de  $\frac{\hat{p}_n - p}{\sqrt{\hat{p}_n(1-\hat{p}_n)/n}}$  converge a una distribución normal estándar.

(Valor 25 puntos)

## Referencias

Wackerly, D., Mendenhall, W., and Scheaffer, R. L. (2014). *Mathematical statistics with applications*. Cengage Learning.