
(A) Proteome size
S. pilosum
S. natans
S. tridacnidorum
S. linucheae
S. necroappetens
S. microadriaticum
B. minutum
23,249
23,335
34,375
35,270
41,779
45,474
32,002
32,053
35,566
35,671
42,915
43,403
45,245
47,014
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
Protein number
Whole proteome
Non-redundant (CD-HIT 99%)
(B) BUSCO assessment
C: 56.6%
(S: 55.6%, D: 1.0%)
C: 70.7%
(S: 63.6%, D: 7.1%)
C: 71.7%
(S: 67.7%, D: 4.0%)
C: 79.8%
(S: 77.8%, D: 2.0%)
C: 69.7%
(S: 68.7%, D: 1.0%)
C: 75.7%
(S: 71.7%, D: 4.0%)
C: 64.6%
(S: 50.5%, D: 14.1%)
0
20
40
60
80
100
BUSCO (%)
Complete (single-copy)
Complete (duplicated)
Fragmented
Missing
(C) Predicted secretome
406
115
2.24%
983
274
3.66%
1066
277
3.21%
807
191
3.12%
782
199
2.76%
599
192
1.84%
752
232
2.17%
0
1
2
3
4
5
% of non-redundant proteome
SP +
SP -