

(A)
n = 30,844
135
27,764
2,945
Percentage of orthogroups
Orthogroups
Secretome only
Non-secretome only
Mixed
(B)
n = 3,080
n = 30,709
n = 30,844
5,361
1,119
11,486
915
11,828
5,755
1,198
11,253
886
11,752
2,395
335
335
Secretome
Non-secretome
Non-redundant proteome
All seven strains
All six Symbiodinium only
Subset of Symbiodinium only
Breviolum only
Subset of Symbiodinium + Breviolum
(C)
0.162
S. microadriaticum
0.127
0.044
S. necroappetens
0.094
0.073
S. linucheae
0.133
0.074
S. tridacnidorum
0.144
0.183
S. natans
0.242
0.250
S. pilosum
0.242
B. minutum
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25
Genetic distance (substitutions/site)
Genus-restricted fraction
86.2% 37.4% 27.9%
85.9% 37.7% 29.5%
82.0% 34.2% 29.0%
86.4% 35.7% 30.1%
80.0% 31.6% 27.6%
89.7% 34.7% 28.8%
44.8% 5.1% 1.6%
Secretome only
Non-secretome only
Mixed
Strain-specific composition
0 5 10
% strain-specific orthogroups
Secretome only
Non-secretome only
Mixed
Not genus-restricted