

(A)
Secretome Orthogroup Presence Pattern
(clustered, combined secretome set)
Orthogroups (n=3080)
S. pilosum
S. natans
S. tridacnidorum
S. linucheae
S. necroappetens
S. microadriaticum
B. minutum
Absent
Non-secreted
Secreted
(B)
Strain-Pairwise Orthogroup Sharing
(Jaccard Similarity)
Secretome only
S. pilosum 1.00 0.22 0.22 0.11 0.23 0.21 0.06
S. natans 0.22 1.00 0.27 0.19 0.14 0.16 0.14
S. tridacnidorum 0.22 0.27 1.00 0.36 0.40 0.22 0.10
S. linucheae 0.11 0.19 0.36 1.00 0.39 0.18 0.13
S. necroappetens 0.23 0.14 0.40 0.39 1.00 0.33 0.11
S. microadriaticum 0.21 0.16 0.22 0.18 0.33 1.00 0.07
B. minutum 0.06 0.14 0.10 0.13 0.11 0.07 1.00
Non-secretome only
S. pilosum 1.00 0.53 0.52 0.51 0.55 0.46 0.49
S. natans 0.53 1.00 0.57 0.54 0.53 0.50 0.51
S. tridacnidorum 0.52 0.57 1.00 0.60 0.59 0.57 0.50
S. linucheae 0.51 0.54 0.60 1.00 0.58 0.54 0.49
S. necroappetens 0.55 0.53 0.59 0.58 1.00 0.58 0.48
S. microadriaticum 0.46 0.50 0.57 0.54 0.58 1.00 0.48
B. minutum 0.49 0.51 0.50 0.49 0.48 0.48 1.00
Mixed
S. pilosum 1.00 0.66 0.65 0.65 0.67 0.60 0.59
S. natans 0.66 1.00 0.71 0.70 0.70 0.67 0.63
S. tridacnidorum 0.65 0.71 1.00 0.76 0.76 0.73 0.62
S. linucheae 0.65 0.70 0.76 1.00 0.75 0.71 0.62
S. necroappetens 0.67 0.70 0.76 0.75 1.00 0.72 0.62
S. microadriaticum 0.60 0.67 0.73 0.71 0.72 1.00 0.61
B. minutum 0.59 0.63 0.62 0.62 0.62 0.61 1.00
S. pilosum
S. natans
S. tridacnidorum
S. linucheae
S. necroappetens
S. microadriaticum
B. minutum
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Jaccard similarity