

## Rules for integrands of the form $(a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n$

1.  $\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx$  when  $b c + a d = 0 \wedge a^2 + b^2 = 0$

**1:**  $\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx$  when  $b c + a d = 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge m \in \mathbb{Z}$

Derivation: Algebraic simplification

Basis: If  $b c + a d = 0 \wedge a^2 + b^2 = 0$ , then  $(a + b \tan[z]) (c + d \tan[z]) = a c \sec[z]^2$

Rule: If  $b c + a d = 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge m \in \mathbb{Z}$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow a^m c^m \int \sec[e + f x]^{2m} (c + d \tan[e + f x])^{n-m} dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_.*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a^m*c^m*Int[Sec[e+f*x]^(2*m)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-m),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,n},x] && EqQ[b*c+a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && IntegerQ[m] && Not[IGtQ[n,0] && (LtQ[m,0] || GtQ[m,n])]
```

**2:**  $\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx$  when  $b c + a d == 0 \wedge a^2 + b^2 == 0$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If  $b c + a d == 0 \wedge a^2 + b^2 == 0$ , then

$$(a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n ==$$

$$\frac{a c}{f} \text{Subst}\left[(a + b x)^{m-1} (c + d x)^{n-1}, x, \tan[e + f x]\right] \partial_x \tan[e + f x]$$

Rule: If  $b c + a d == 0 \wedge a^2 + b^2 == 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{a c}{f} \text{Subst}\left[\int (a + b x)^{m-1} (c + d x)^{n-1} dx, x, \tan[e + f x]\right]$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a*c/f*Subst[Int[(a+b*x)^(m-1)*(c+d*x)^(n-1),x],x,Tan[e+f*x]] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n},x] && EqQ[b*c+a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0]
```

$$2. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) dx \text{ when } b c - a d \neq 0$$

$$1. \int (a + b \tan[e + f x]) (c + d \tan[e + f x]) dx \text{ when } b c - a d \neq 0$$

$$1: \int (a + b \tan[e + f x]) (c + d \tan[e + f x]) dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge b c + a d = 0$$

Derivation: Tangent recurrence 2b with  $A \rightarrow a^2$ ,  $B \rightarrow 2 a b$ ,  $C \rightarrow b^2$ ,  $m \rightarrow -1$ ,  $n \rightarrow 1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge b c + a d = 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x]) (c + d \tan[e + f x]) dx \rightarrow (a c - b d) x + \frac{b d \tan[e + f x]}{f}$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.**tan[e_+f_.**x_])*(c_+d_.**tan[e_+f_.**x_]),x_Symbol] :=
  (a*c-b*d)*x + b*d*Tan[e+f*x]/f /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[b*c+a*d,0]
```

**2:**  $\int (a + b \tan[e + f x]) (c + d \tan[e + f x]) dx$  when  $b c - a d \neq 0 \wedge b c + a d \neq 0$

Derivation: Tangent recurrence 2b with  $A \rightarrow a^2$ ,  $B \rightarrow 2 a b$ ,  $C \rightarrow b^2$ ,  $m \rightarrow -1$ ,  $n \rightarrow 1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge b c + a d \neq 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x]) (c + d \tan[e + f x]) dx \rightarrow (a c - b d) x + \frac{b d \tan[e + f x]}{f} + (b c + a d) \int \tan[e + f x] dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*tan[e_.+f_.*x_])*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  (a*c-b*d)*x + b*d*Tan[e+f*x]/f + (b*c+a*d)*Int[Tan[e+f*x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[b*c+a*d,0]
```

$$2. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$$

$$1: \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge m < 0$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $n \rightarrow 0$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge m < 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) dx \rightarrow -\frac{(b c - a d) (a + b \tan[e + f x])^m}{2 a f m} + \frac{b c + a d}{2 a b} \int (a + b \tan[e + f x])^{m+1} dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  -(b*c-a*d)*(a+b*Tan[e+f*x])^m/(2*a*f*m) +
  (b*c+a*d)/(2*a*b)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && LtQ[m,0]
```

$$\mathbf{2:} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) \, dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge m \neq 0$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 3a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $n \rightarrow 0$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge m \neq 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) \, dx \rightarrow \frac{d (a + b \tan[e + f x])^m}{f m} + \frac{b c + a d}{b} \int (a + b \tan[e + f x])^m \, dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  d*(a+b*Tan[e+f*x])^m/(f*m) + (b*c+a*d)/b*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && Not[LtQ[m,0]]
```

$$3. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) \, dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$$

$$1: \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) \, dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge m > 0$$

Derivation: Tangent recurrence 2a with  $A \rightarrow 0$ ,  $B \rightarrow A$ ,  $C \rightarrow B$ ,  $n \rightarrow -1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge m > 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) \, dx \rightarrow \frac{d (a + b \tan[e + f x])^m}{f m} + \int (a + b \tan[e + f x])^{m-1} (a c - b d + (b c + a d) \tan[e + f x]) \, dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  d*(a+b*Tan[e+f*x])^m/(f*m) +
  Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m-1)*Simp[a*c-b*d+(b*c+a*d)*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && GtQ[m,0]
```

$$2: \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge m < -1$$

Derivation: Tangent recurrence 1b with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow 0$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge m < -1$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) dx \rightarrow \frac{(b c - a d) (a + b \tan[e + f x])^{m+1}}{f (m+1) (a^2 + b^2)} + \frac{1}{a^2 + b^2} \int (a + b \tan[e + f x])^{m+1} (a c + b d - (b c - a d) \tan[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  (b*c-a*d)*(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)/(f*(m+1)*(a^2+b^2)) +
  1/(a^2+b^2)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*Simp[a*c+b*d-(b*c-a*d)*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && LtQ[m,-1]
```



$$3. \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{a + b \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$$

$$1: \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{a + b \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge a c + b d = 0$$

Derivation: Algebraic expansion and reciprocal for integration

Basis: If  $a c + b d = 0$ , then  $\frac{c+d \tan[z]}{a+b \tan[z]} = \frac{c (b \cos[z] - a \sin[z])}{b (a \cos[z] + b \sin[z])}$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge a c + b d = 0$ , then

$$\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{a + b \tan[e + f x]} dx \rightarrow \frac{c}{b} \int \frac{b \cos[e + f x] - a \sin[e + f x]}{a \cos[e + f x] + b \sin[e + f x]} dx \rightarrow \frac{c}{b f} \text{Log}[a \cos[e + f x] + b \sin[e + f x]]$$

Program code:

```
Int[(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])/(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  c/(b*f)*Log[RemoveContent[a*cos[e+f*x]+b*sin[e+f*x],x]] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && EqQ[a*c+b*d,0]
```

$$\text{2: } \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{a + b \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge a c + b d \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \frac{c+d z}{a+b z} = \frac{a c+b d}{a^2+b^2} + \frac{(b c-a d)(b-a z)}{(a^2+b^2)(a+b z)}$$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge a c + b d \neq 0$ , then

$$\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{a + b \tan[e + f x]} dx \rightarrow \frac{(a c + b d) x}{a^2 + b^2} + \frac{b c - a d}{a^2 + b^2} \int \frac{b - a \tan[e + f x]}{a + b \tan[e + f x]} dx$$

Program code:

```
Int[(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])/(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  (a*c+b*d)*x/(a^2+b^2) + (b*c-a*d)/(a^2+b^2)*Int[(b-a*Tan[e+f*x])/(a+b*Tan[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[a*c+b*d,0]
```

$$4. \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{a + b \tan[e + f x]}} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$$

$$1. \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx$$

$$\text{1: } \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \text{ when } c^2 - d^2 = 0$$

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: If } c^2 - d^2 = 0, \text{ then } \frac{c+d \tan[e+f x]}{\sqrt{b \tan[e+f x]}} = -\frac{2 c^2}{f} \text{Subst}\left[\frac{1}{2 c d+b x^2}, x, \frac{c-d \tan[e+f x]}{\sqrt{b \tan[e+f x]}}\right] \partial_x \frac{c-d \tan[e+f x]}{\sqrt{b \tan[e+f x]}}$$

Rule: If  $c^2 - d^2 = 0$ , then

$$\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \rightarrow -\frac{2 d^2}{f} \text{Subst}\left[\int \frac{1}{2 c d + b x^2} dx, x, \frac{c - d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}}\right]$$

Program code:

```
Int[(c_+d_.tan[e_+f_.x_])/Sqrt[b_.tan[e_+f_.x_]],x_Symbol] :=
  -2*d^2/f*Subst[Int[1/(2*c*d+b*x^2),x],x,(c-d*Tan[e+f*x])/Sqrt[b*Tan[e+f*x]]] /;
FreeQ[{b,c,d,e,f},x] && EqQ[c^2-d^2,0]
```

$$2. \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \text{ when } c^2 - d^2 \neq 0$$

**x:**  $\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \text{ when } c^2 - d^2 \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } c + d z = \frac{(c+d)(1+z)}{2} + \frac{(c-d)(1-z)}{2}$$

Rule: If  $c^2 - d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \rightarrow \frac{c + d}{2} \int \frac{1 + \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx + \frac{c - d}{2} \int \frac{1 - \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx$$

Program code:

```
(* Int[(c_+d_.tan[e_+f_.x_])/Sqrt[b_.tan[e_+f_.x_]],x_Symbol] :=
  (c+d)/2*Int[(1+Tan[e+f*x])/Sqrt[b*Tan[e+f*x]],x] +
  (c-d)/2*Int[(1-Tan[e+f*x])/Sqrt[b*Tan[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{b,c,d,e,f},x] && NeQ[c^2+d^2,0] && NeQ[c^2-d^2,0] *)
```

$$1: \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \text{ when } c^2 + d^2 = 0$$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If  $c^2 + d^2 = 0$ , then  $\frac{c+d \tan[e+fx]}{\sqrt{b \tan[e+fx]}} = \frac{2c^2}{f} \text{Subst}\left[\frac{1}{b c - d x^2}, x, \sqrt{b \tan[e + f x]}\right] \partial_x \sqrt{b \tan[e + f x]}$

Note: This is just a special case of the following rule, but it saves two steps by canceling out the gcd.

Rule: If  $c^2 + d^2 = 0$ , then

$$\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \rightarrow \frac{2c^2}{f} \text{Subst}\left[\int \frac{1}{b c - d x^2} dx, x, \sqrt{b \tan[e + f x]}\right]$$

Program code:

```
Int[(c_+d_.*tan[e_+f_*x_])/Sqrt[b_.*tan[e_+f_*x_]],x_Symbol] :=
  2*c^2/f*Subst[Int[1/(b*c-d*x^2),x],x,Sqrt[b*Tan[e+f*x]]] /;
FreeQ[{b,c,d,e,f},x] && EqQ[c^2+d^2,0]
```

$$\text{R: } \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \text{ when } c^2 - d^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } c + d z = \frac{(c + i d)}{2} (1 - i z) + \frac{(c - i d)}{2} (1 + i z)$$

Note: Introduces the imaginary unit.

Rule: If  $c^2 - d^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \rightarrow \frac{(c + i d)}{2} \int \frac{1 - i \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx + \frac{(c - i d)}{2} \int \frac{1 + i \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx$$

Program code:

```
(* Int[(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])/Sqrt[b_.*tan[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  (c+I*d)/2*Int[(1-I*Tan[e+f*x])/Sqrt[b*Tan[e+f*x]],x] + (c-I*d)/2*Int[(1+I*Tan[e+f*x])/Sqrt[b*Tan[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{b,c,d,e,f},x] && NeQ[c^2-d^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] *)
```

$$\mathbf{2:} \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \text{ when } c^2 - d^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: } \frac{c+d \tan[e+fx]}{\sqrt{b \tan[e+fx]}} = \frac{2}{f} \text{Subst}\left[\frac{b c + d x^2}{b^2 + x^4}, x, \sqrt{b \tan[e + f x]}\right] \partial_x \sqrt{b \tan[e + f x]}$$

Rule: If  $c^2 - d^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{b \tan[e + f x]}} dx \rightarrow \frac{2}{f} \text{Subst}\left[\int \frac{b c + d x^2}{b^2 + x^4} dx, x, \sqrt{b \tan[e + f x]}\right]$$

Program code:

```
Int[(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])/Sqrt[b_.*tan[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  2/f*Subst[Int[(b*c+d*x^2)/(b^2+x^4),x],x,Sqrt[b*Tan[e+f*x]]] /;
FreeQ[{b,c,d,e,f},x] && NeQ[c^2-d^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

$$\mathbf{2.} \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{a + b \tan[e + f x]}} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

$$\mathbf{1:} \int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{a + b \tan[e + f x]}} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge 2 a c d - b (c^2 - d^2) = 0$$

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: If } 2 a c d - b (c^2 - d^2) = 0, \text{ then } \frac{c+d \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}} = -\frac{2 d^2}{f} \text{Subst}\left[\frac{1}{2 b c d - 4 a d^2 + x^2}, x, \frac{b c - 2 a d - b d \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}\right] \partial_x \frac{b c - 2 a d - b d \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}$$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge 2 a c d - b (c^2 - d^2) = 0$ , then

$$\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{a + b \tan[e + f x]}} dx \rightarrow -\frac{2 d^2}{f} \text{Subst}\left[\int \frac{1}{2 b c d - 4 a d^2 + x^2} dx, x, \frac{b c - 2 a d - b d \tan[e + f x]}{\sqrt{a + b \tan[e + f x]}}\right]$$

Program code:

```
Int[(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])/Sqrt[a_+b_.*tan[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  -2*d^2/f*Subst[Int[1/(2*b*c*d-4*a*d^2+x^2),x],x,(b*c-2*a*d-b*d*Tan[e+f*x])/Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]]] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && EqQ[2*a*c*d-b*(c^2-d^2),0]
```

2:  $\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{a + b \tan[e + f x]}} dx$  when  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge 2 a c d - b (c^2 - d^2) \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

Note: The resulting integrands are of the form required by the above rule.

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge 2 a c d - b (c^2 - d^2) \neq 0$ , let  $q = \sqrt{a^2 + b^2}$ , then

$$\int \frac{c + d \tan[e + f x]}{\sqrt{a + b \tan[e + f x]}} dx \rightarrow \frac{1}{2 q} \int \frac{a c + b d + c q + (b c - a d + d q) \tan[e + f x]}{\sqrt{a + b \tan[e + f x]}} dx - \frac{1}{2 q} \int \frac{a c + b d - c q + (b c - a d - d q) \tan[e + f x]}{\sqrt{a + b \tan[e + f x]}} dx$$

Program code:

```
Int[(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])/Sqrt[a_+b_.*tan[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  With[{q=Rt[a^2+b^2,2]},
    1/(2*q)*Int[(a*c+b*d+c*q+(b*c-a*d+d*q)*Tan[e+f*x])/Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]],x] -
    1/(2*q)*Int[(a*c+b*d-c*q+(b*c-a*d-d*q)*Tan[e+f*x])/Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && NeQ[2*a*c*d-b*(c^2-d^2),0] &&
  (PerfectSquareQ[a^2+b^2] || RationalQ[a,b,c,d])
```

$$\text{5: } \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 = 0$$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If  $c^2 + d^2 = 0$ , then

$$(a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) = \frac{c d}{f} \text{Subst} \left[ \frac{(a + \frac{b x}{d})^m}{d^2 + c x}, x, d \tan[e + f x] \right] \partial_x (d \tan[e + f x])$$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 = 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) dx \rightarrow \frac{c d}{f} \text{Subst} \left[ \int \frac{(a + \frac{b x}{d})^m}{d^2 + c x} dx, x, d \tan[e + f x] \right]$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  c*d/f*Subst[Int[(a+b/d*x)^m/(d^2+c*x),x],x,d*Tan[e+f*x]] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && EqQ[c^2+d^2,0]
```



$$6. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) \, dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

$$1: \int (b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) \, dx \text{ when } c^2 + d^2 \neq 0 \wedge 2m \notin \mathbb{Z}$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } (b z)^m (c + d z) = c (b z)^m + \frac{d}{b} (b z)^{m+1}$$

Rule: If  $c^2 + d^2 \neq 0 \wedge 2m \notin \mathbb{Z}$ , then

$$\int (b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) \, dx \rightarrow c \int (b \tan[e + f x])^m \, dx + \frac{d}{b} \int (b \tan[e + f x])^{m+1} \, dx$$

Program code:

```
Int[(b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  c*Int[(b*Tan[e+f*x])^m,x] + d/b*Int[(b*Tan[e+f*x])^(m+1),x] /;
FreeQ[{b,c,d,e,f,m},x] && NeQ[c^2+d^2,0] && Not[IntegerQ[2*m]]
```

$$\mathbf{2:} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) \, dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m \notin \mathbb{Z}$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } c + d z = \frac{(c + i d)}{2} (1 - i z) + \frac{(c - i d)}{2} (1 + i z)$$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m \notin \mathbb{Z}$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x]) \, dx \rightarrow \frac{(c + i d)}{2} \int (a + b \tan[e + f x])^m (1 - i \tan[e + f x]) \, dx + \frac{(c - i d)}{2} \int (a + b \tan[e + f x])^m (1 + i \tan[e + f x]) \, dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  (c+I*d)/2*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m*(1-I*Tan[e+f*x]),x] +
  (c-I*d)/2*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m*(1+I*Tan[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && Not[IntegerQ[m]]
```

$$3. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^2 dx \text{ when } b c - a d \neq 0$$

$$1. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^2 dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge m \leq -1$$

$$1: \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^2 dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge m \leq -1 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge m \leq -1 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^2 dx \rightarrow -\frac{b (a c + b d)^2 (a + b \tan[e + f x])^m}{2 a^3 f m} + \frac{1}{2 a^2} \int (a + b \tan[e + f x])^{m+1} (a c^2 - 2 b c d + a d^2 - 2 b d^2 \tan[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^2,x_Symbol] :=
  -b*(a*c+b*d)^2*(a+b*Tan[e+f*x])^m/(2*a^3*f*m) +
  1/(2*a^2)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*Simp[a*c^2-2*b*c*d+a*d^2-2*b*d^2*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && LeQ[m,-1] && EqQ[a^2+b^2,0]
```

$$2. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^2 dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge m \leq -1 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$$

$$1: \int \frac{(c + d \tan[e + f x])^2}{a + b \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \frac{(c+dz)^2}{a+bz} = \frac{d(2bc-ad)}{b^2} + \frac{d^2z}{b} + \frac{(bc-ad)^2}{b^2(a+bz)}$$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{(c + d \tan[e + f x])^2}{a + b \tan[e + f x]} dx \rightarrow \frac{d(2bc - ad)x}{b^2} + \frac{d^2}{b} \int \tan[e + f x] dx + \frac{(bc - ad)^2}{b^2} \int \frac{1}{a + b \tan[e + f x]} dx$$

Program code:

```
Int[(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^2/(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  d*(2*b*c-a*d)*x/b^2 + d^2/b*Int[Tan[e+f*x],x] + (b*c-a*d)^2/b^2*Int[1/(a+b*Tan[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0]
```

$$\mathbf{2:} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^2 dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge m < -1 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$$

Derivation: Tangent recurrence 1b with  $A \rightarrow c^2$ ,  $B \rightarrow 2 c d$ ,  $C \rightarrow d^2$ ,  $n \rightarrow 0$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge m < -1 \wedge a^2 + b^2 \neq 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^2 dx \rightarrow \frac{(b c - a d)^2 (a + b \tan[e + f x])^{m+1}}{b f (m+1) (a^2 + b^2)} + \frac{1}{a^2 + b^2} \int (a + b \tan[e + f x])^{m+1} (a c^2 + 2 b c d - a d^2 - (b c^2 - 2 a c d - b d^2) \tan[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^2,x_Symbol] :=
  (b*c-a*d)^2*(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)/(b*f*(m+1)*(a^2+b^2)) +
  1/(a^2+b^2)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*Simp[a*c^2+2*b*c*d-a*d^2-(b*c^2-2*a*c*d-b*d^2)*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && LtQ[m,-1] && NeQ[a^2+b^2,0]
```

**2:**  $\int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^2 dx$  when  $bc - ad \neq 0 \wedge m \neq -1$

Derivation: Tangent recurrence 2b with  $A \rightarrow c^2$ ,  $B \rightarrow 2cd$ ,  $C \rightarrow d^2$ ,  $n \rightarrow 0$

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge m \neq -1$ , then

$$\int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^2 dx \rightarrow \frac{d^2 (a+b \tan[e+fx])^{m+1}}{bf(m+1)} + \int (a+b \tan[e+fx])^m (c^2 - d^2 + 2cd \tan[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^2,x_Symbol] :=
  d^2*(a+b*Tan[e+fx])^(m+1)/(b*f*(m+1)) +
  Int[(a+b*Tan[e+fx])^m*Simp[c^2-d^2+2*c*d*Tan[e+fx],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && Not[LeQ[m,-1]] && Not[EqQ[m,2] && EqQ[a,0]]
```

4.  $\int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx$  when  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$

1.  $\int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx$  when  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m+n = 0$

1.  $\int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx$  when  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m+n = 0 \wedge m \geq \frac{1}{2}$

**1:**  $\int \frac{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}} dx$  when  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If  $a^2 + b^2 = 0$ , then  $\frac{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}} = -\frac{2ab}{f} \text{Subst}\left[\frac{1}{ac-bd-2a^2x^2}, x, \frac{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}}{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}\right] \partial_x \frac{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}}{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}$

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}} dx \rightarrow -\frac{2ab}{f} \text{Subst}\left[\int \frac{1}{ac-bd-2a^2x^2} dx, x, \frac{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}}{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}\right]$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a_+b_.*tan[e_+f_.*x_]]/Sqrt[c_+d_.*tan[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  -2*a*b/f*Subst[Int[1/(a*c-b*d-2*a^2*x^2),x],x,Sqrt[c+d*Tan[e+f*x]]/Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]]] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

**2:**  $\int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx$  when  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m+n = 0 \wedge m > \frac{1}{2}$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 1a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow -m$

Note: If  $a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then  $a c - b d \neq 0$ .

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m+n = 0 \wedge m > \frac{1}{2}$ , then

$$\int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx \rightarrow \frac{ab (a+b \tan[e+fx])^{m-1} (c+d \tan[e+fx])^{n+1}}{f (m-1) (ac-bd)} + \frac{2a^2}{ac-bd} \int (a+b \tan[e+fx])^{m-1} (c+d \tan[e+fx])^{n+1} dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a*b*(a+b*Tan[e+f*x])^(m-1)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(f*(m-1)*(a*c-b*d)) +
  2*a^2/(a*c-b*d)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m-1)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && EqQ[m+n,0] && GtQ[m,1/2]
```

$$\mathbf{2:} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m + n = 0 \wedge m \leq -\frac{1}{2}$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2b with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $n \rightarrow -m - 1$

Note: If  $a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then  $a c - b d \neq 0$ .

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m + n = 0 \wedge m \leq -\frac{1}{2}$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{a (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n}{2 b f m} - \frac{a c - b d}{2 b^2} \int (a + b \tan[e + f x])^{m+1} (c + d \tan[e + f x])^{n-1} dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])^n,x_Symbol] :=
  a*(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c+d*Tan[e+f*x])^n/(2*b*f*m) -
  (a*c-b*d)/(2*b^2)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-1),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && EqQ[m+n,0] && LeQ[m,-1/2]
```



$$2. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m + n + 1 \neq 0$$

$$1: \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m + n + 1 \neq 0 \wedge m < -1$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow -m - 1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m + n + 1 \neq 0 \wedge m < -1$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{a (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^{n+1}}{2 f m (b c - a d)} + \frac{1}{2 a} \int (a + b \tan[e + f x])^{m+1} (c + d \tan[e + f x])^n dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a*(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(2*f*m*(b*c-a*d)) +
  1/(2*a)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*(c+d*Tan[e+f*x])^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && EqQ[m+n+1,0] && LtQ[m,-1]
```

$$2: \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m + n + 1 = 0 \wedge m \neq -1$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 3b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow -m - 1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m + n + 1 = 0 \wedge m \neq -1$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow -\frac{d (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^{n+1}}{f m (c^2 + d^2)} + \frac{a}{a c - b d} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^{n+1} dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -d*(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(f*m*(c^2+d^2)) +
  a/(a*c-b*d)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && EqQ[m+n+1,0] && Not[LtQ[m,-1]]
```

$$3. \int \frac{(c + d \tan[e + f x])^n}{a + b \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

$$1. \int \frac{(c + d \tan[e + f x])^n}{a + b \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge n > 0$$

$$1: \int \frac{(c + d \tan[e + f x])^n}{a + b \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge 0 < n < 1$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow -1$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2b with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $m \rightarrow -1$ ,  $n \rightarrow n - 1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge 0 < n < 1$ , then

$$\int \frac{(c + d \tan[e + f x])^n}{a + b \tan[e + f x]} dx \rightarrow$$

$$-\frac{(a c + b d) (c + d \tan[e + f x])^n}{2 (b c - a d) f (a + b \tan[e + f x])} +$$

$$\frac{1}{2 a (b c - a d)} \int (c + d \tan[e + f x])^{n-1} (a c d (n-1) + b c^2 + b d^2 n - d (b c - a d) \tan[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])^n_/(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  -(a*c+b*d)*(c+d*Tan[e+f*x])^n/(2*(b*c-a*d)*f*(a+b*Tan[e+f*x])) +
  1/(2*a*(b*c-a*d))*Int[(c+d*Tan[e+f*x])^(n-1)*Simp[a*c*d*(n-1)+b*c^2+b*d^2*n-d*(b*c-a*d)*(n-1)*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && LtQ[0,n,1]
```

$$\text{2: } \int \frac{(c + d \tan[e + f x])^n}{a + b \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge n > 1$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $m \rightarrow -1$ ,  $n \rightarrow n - 1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge n > 1$ , then

$$\int \frac{(c + d \tan[e + f x])^n}{a + b \tan[e + f x]} dx \rightarrow \frac{(b c - a d) (c + d \tan[e + f x])^{n-1}}{2 a f (a + b \tan[e + f x])} + \frac{1}{2 a^2} \int (c + d \tan[e + f x])^{n-2} (a c^2 + a d^2 (n-1) - b c d n - d (a c (n-2) + b d n) \tan[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_/(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  (b*c-a*d)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-1)/(2*a*f*(a+b*Tan[e+f*x])) +
  1/(2*a^2)*Int[(c+d*Tan[e+f*x])^(n-2)*Simp[a*c^2+a*d^2*(n-1)-b*c*d*n-d*(a*c*(n-2)+b*d*n)*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && GtQ[n,1]
```

**2:**  $\int \frac{1}{(a+b \tan[e+fx]) (c+d \tan[e+fx])} dx$  when  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $\frac{1}{(a+bz)(c+dz)} = \frac{b}{(bc-ad)(a+bz)} - \frac{d}{(bc-ad)(c+dz)}$

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{1}{(a+b \tan[e+fx]) (c+d \tan[e+fx])} dx \rightarrow \frac{b}{bc-ad} \int \frac{1}{a+b \tan[e+fx]} dx - \frac{d}{bc-ad} \int \frac{1}{c+d \tan[e+fx]} dx$$

Program code:

```
Int[1/((a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])),x_Symbol] :=
  b/(b*c-a*d)*Int[1/(a+b*Tan[e+f*x]),x] - d/(b*c-a*d)*Int[1/(c+d*Tan[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

$$\mathbf{3:} \int \frac{(c + d \tan[e + f x])^n}{a + b \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge n \neq 0$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow -1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge n \neq 0$ , then

$$\int \frac{(c + d \tan[e + f x])^n}{a + b \tan[e + f x]} dx \rightarrow$$

$$-\frac{a (c + d \tan[e + f x])^{n+1}}{2 f (b c - a d) (a + b \tan[e + f x])} + \frac{1}{2 a (b c - a d)} \int (c + d \tan[e + f x])^n (b c + a d (n - 1) - b d n \tan[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_/(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  -a*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(2*f*(b*c-a*d)*(a+b*Tan[e+f*x])) +
  1/(2*a*(b*c -a*d))*Int[(c+d*Tan[e+f*x])^n*Simp[b*c+a*d*(n-1)-b*d*n*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,n},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && Not[GtQ[n,0]]
```

$$\mathbf{4.} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 1$$

$$\mathbf{1:} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 1 \wedge n < -1$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 1a with  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $m \rightarrow m - 1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 1 \wedge n < -1$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow$$

$$-\frac{a^2 (b c - a d) (a + b \tan[e + f x])^{m-2} (c + d \tan[e + f x])^{n+1}}{d f (b c + a d) (n + 1)} +$$

$$\frac{a}{d (b c + a d) (n + 1)}$$

$$\int (a + b \tan[e + f x])^{m-2} (c + d \tan[e + f x])^{n+1} (b (b c (m-2) - a d (m-2n-4)) + (a b c (m-2) + b^2 d (n+1) - a^2 d (m+n-1)) \tan[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n,x_Symbol] :=
-a^2*(b*c-a*d)*(a+b*Tan[e+f*x])^(m-2)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(d*f*(b*c+a*d)*(n+1)) +
a/(d*(b*c+a*d)*(n+1))*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m-2)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)*
Simp[b*(b*c*(m-2)-a*d*(m-2*n-4))+(a*b*c*(m-2)+b^2*d*(n+1)-a^2*d*(m+n-1))*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && GtQ[m,1] && LtQ[n,-1] && (IntegerQ[m] || IntegerQ[2*m])
```

$$2. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 1 \wedge n \neq -1$$

$$1: \int \frac{(a + b \tan[e + f x])^{3/2}}{c + d \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: If } a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0, \text{ then } \frac{(a+bz)^{3/2}}{c+dz} = \frac{2a^2\sqrt{a+bz}}{a^2-b^2} - \frac{(2bcd+a(c^2-d^2))(a-bz)\sqrt{a+bz}}{a(c^2+d^2)(c+dz)}$$

Note: If  $a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then  $ac - bd \neq 0$ .

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{(a + b \tan[e + f x])^{3/2}}{c + d \tan[e + f x]} dx \rightarrow \frac{2a^2}{a^2 - b^2} \int \sqrt{a + b \tan[e + f x]} dx - \frac{2bcd + a(c^2 - d^2)}{a(c^2 + d^2)} \int \frac{(a - b \tan[e + f x]) \sqrt{a + b \tan[e + f x]}}{c + d \tan[e + f x]} dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^(3/2)/(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
2*a^2/(a*c-b*d)*Int[Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]],x] -
(2*b*c*d+a*(c^2-d^2))/(a*(c^2+d^2))*Int[(a-b*Tan[e+f*x])*Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]]/(c+d*Tan[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

$$\mathbf{2:} \int \frac{(a+b \tan[e+fx])^{3/2}}{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}} dx \text{ when } bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

Basis: If  $a^2 + b^2 = 0$ , then  $(a+bz)^{3/2} = 2a\sqrt{a+bz} + \frac{b}{a}(b+az)\sqrt{a+bz}$

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{(a+b \tan[e+fx])^{3/2}}{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}} dx \rightarrow 2a \int \frac{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}} dx + \frac{b}{a} \int \frac{(b+a \tan[e+fx]) \sqrt{a+b \tan[e+fx]}}{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^(3/2)/Sqrt[c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  2*a*Int[Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]]/Sqrt[c+d*Tan[e+f*x]],x] +
  b/a*Int[(b+a*Tan[e+f*x])*Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]]/Sqrt[c+d*Tan[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

$$\mathbf{3:} \int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx \text{ when } bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 1 \wedge m+n-1 \neq 0$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 1b with  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $m \rightarrow m-1$

Note: This rule is applied when  $m \in \mathbb{Z}$  even if  $n$  is symbolic since the antiderivative can be expressed in terms of hypergeometric functions instead of requiring Appell functions.

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 1 \wedge m+n-1 \neq 0$ , then

$$\int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx \rightarrow \frac{b^2 (a+b \tan[e+fx])^{m-2} (c+d \tan[e+fx])^{n+1}}{df(m+n-1)} +$$



$$\frac{a}{d(m+n-1)} \int (a+b \tan[e+fx])^{m-2} (c+d \tan[e+fx])^n (b c (m-2) + a d (m+2n) + (a c (m-2) + b d (3m+2n-4)) \tan[e+fx]) dx$$

### Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  b^2*(a+b*Tan[e+f*x])^(m-2)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(d*f*(m+n-1)) +
  a/(d*(m+n-1))*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m-2)*(c+d*Tan[e+f*x])^n*
    Simp[b*c*(m-2)+a*d*(m+2*n)+(a*c*(m-2)+b*d*(3*m+2*n-4))*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,n},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && IntegerQ[2*m] && GtQ[m,1] && NeQ[m+n-1,0] &&
(IntegerQ[m] || IntegerQ[2*m,2*n])
```

$$5. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m < 0$$

$$1. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m < 0 \wedge n > 0$$

$$1: \int (a + b \tan[e + f x])^m \sqrt{c + d \tan[e + f x]} dx \text{ when } bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m < 0$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow \frac{1}{2}$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2b with  $A \rightarrow 0$ ,  $B \rightarrow 1$ ,  $n \rightarrow -\frac{1}{2}$

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m < 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m \sqrt{c + d \tan[e + f x]} dx \rightarrow$$

$$- \frac{b (a + b \tan[e + f x])^m \sqrt{c + d \tan[e + f x]}}{2 a f m} + \frac{1}{4 a^2 m} \int \frac{(a + b \tan[e + f x])^{m+1} (2 a c m + b d + a d (2 m + 1) \tan[e + f x])}{\sqrt{c + d \tan[e + f x]}} dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_*Sqrt[c_+d_.*tan[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  -b*(a+b*Tan[e+f*x])^m*Sqrt[c+d*Tan[e+f*x]]/(2*a*f*m) +
  1/(4*a^2*m)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*Simp[2*a*c*m+b*d+a*d*(2*m+1)*Tan[e+f*x],x]/Sqrt[c+d*Tan[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && LtQ[m,0] && IntegersQ[2*m]
```

$$2: \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m < 0 \wedge n > 1$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $n \rightarrow n - 1$

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m < 0 \wedge n > 1$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow$$

$$-\frac{(bc-ad)(a+b \tan[ex+f])^m (c+d \tan[ex+f])^{n-1}}{2afm} + \frac{1}{2a^2m} \int (a+b \tan[ex+f])^{m+1} (c+d \tan[ex+f])^{n-2} (c(acm+bd(n-1)) - d(bcm+ad(n-1)) - d(bd(m-n+1) - ac(m+n-1)) \tan[ex+f]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -(b*c-a*d)*(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-1)/(2*a*f*m) +
  1/(2*a^2*m)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-2)*
    Simp[c*(a*c*m+b*d*(n-1))-d*(b*c*m+a*d*(n-1))-d*(b*d*(m-n+1)-a*c*(m+n-1))*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && LtQ[m,0] && GtQ[n,1] && (IntegerQ[m] || IntegersQ[2*m],
```

$$2: \int (a+b \tan[ex+f])^m (c+d \tan[ex+f])^n dx \text{ when } bc-ad \neq 0 \wedge a^2+b^2=0 \wedge c^2+d^2 \neq 0 \wedge m < 0 \wedge n \neq 0$$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 2b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$

Rule: If  $bc-ad \neq 0 \wedge a^2+b^2=0 \wedge c^2+d^2 \neq 0 \wedge m < 0 \wedge n \neq 0$ , then

$$\int (a+b \tan[ex+f])^m (c+d \tan[ex+f])^n dx \rightarrow \frac{a(a+b \tan[ex+f])^m (c+d \tan[ex+f])^{n+1}}{2fm(bc-ad)} + \frac{1}{2am(bc-ad)} \int (a+b \tan[ex+f])^{m+1} (c+d \tan[ex+f])^n (bcm-ad(2m+n+1) + bd(m+n+1) \tan[ex+f]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a*(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(2*f*m*(b*c-a*d)) +
  1/(2*a*m*(b*c-a*d))*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*(c+d*Tan[e+f*x])^n*
    Simp[b*c*m-a*d*(2*m+n+1)+b*d*(m+n+1)*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,n},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && LtQ[m,0] && (IntegerQ[m] || IntegersQ[2*m,2*n])
```

**6:**  $\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx$  when  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge n > 1 \wedge m + n - 1 \neq 0$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 3a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $n \rightarrow n - 1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge n > 1 \wedge m + n - 1 \neq 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{d (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^{n-1}}{f (m + n - 1)} - \frac{1}{a (m + n - 1)} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^{n-2} \cdot (d (b c m + a d (-1 + n)) - a c^2 (m + n - 1) + d (b d m - a c (m + 2 n - 2)) \tan[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  d*(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-1)/(f*(m+n-1)) -
  1/(a*(m+n-1))*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-2)*
    Simp[d*(b*c*m+a*d*(-1+n))-a*c^2*(m+n-1)+d*(b*d*m-a*c*(m+2*n-2))*Tan[e+f*x],x],x] /;
  FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && GtQ[n,1] && NeQ[m+n-1,0] && (IntegerQ[n] || Integers
```

**7:**  $\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx$  when  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge n < -1$

Derivation: Symmetric tangent recurrence 3b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge n < -1$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{d (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^{n+1}}{f (n + 1) (c^2 + d^2)}$$

$$\frac{1}{a(n+1)(c^2+d^2)} \int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^{n+1} (b d m - a c(n+1) + a d(m+n+1) \tan[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  d*(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(f*(n+1)*(c^2+d^2)) -
  1/(a*(c^2+d^2)*(n+1))*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)*
    Simp[b*d*m-a*c*(n+1)+a*d*(m+n+1)*Tan[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && LtQ[n,-1] && (IntegerQ[n] || IntegersQ[2*m,2*n])
```

8:  $\int \frac{(a+b \tan[e+fx])^m}{c+d \tan[e+fx]} dx$  when  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $\frac{(a+bz)^m}{c+dz} = \frac{a(a+bz)^m}{a^2-b^2} - \frac{d(a+bz)^m(b+az)}{(a^2-b^2)(c+dz)}$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{(a+b \tan[e+fx])^m}{c+d \tan[e+fx]} dx \rightarrow \frac{a}{a^2-b^2} \int (a+b \tan[e+fx])^m dx - \frac{d}{a^2-b^2} \int \frac{(a+b \tan[e+fx])^m (b+a \tan[e+fx])}{c+d \tan[e+fx]} dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_/(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  a/(a*c-b*d)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m,x] -
  d/(a*c-b*d)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m*(b+a*Tan[e+f*x])/(c+d*Tan[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

**9:**  $\int \sqrt{a+b \tan[e+fx]} \sqrt{c+d \tan[e+fx]} dx$  when  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $\sqrt{c+dz} = \frac{ac-bd}{a\sqrt{c+dz}} + \frac{d(b+az)}{a\sqrt{c+dz}}$

Note: If  $a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then  $ac - bd \neq 0$ .

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \sqrt{a+b \tan[e+fx]} \sqrt{c+d \tan[e+fx]} dx \rightarrow \frac{ac-bd}{a} \int \frac{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}} dx + \frac{d}{a} \int \frac{\sqrt{a+b \tan[e+fx]} (b+a \tan[e+fx])}{\sqrt{c+d \tan[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a_+b_.*tan[e_+f_.*x_]]*Sqrt[c_+d_.*tan[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  (a*c-b*d)/a*Int[Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]]/Sqrt[c+d*Tan[e+f*x]],x] +
  d/a*Int[Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]]*(b+a*Tan[e+f*x])/Sqrt[c+d*Tan[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

**10:**  $\int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx$  when  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If  $a^2 + b^2 = 0$ , then  $(a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n =$

$$\frac{ab}{f} \text{Subst} \left[ \frac{(a+x)^{m-1} \left(c+\frac{dx}{b}\right)^n}{b^2+ax}, x, b \tan[e+fx] \right] \partial_x (b \tan[e+fx])$$

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 = 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{a b}{f} \text{Subst} \left[ \int \frac{(a + x)^{m-1} \left(c + \frac{d x}{b}\right)^n}{b^2 + a x} dx, x, b \tan[e + f x] \right]$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])^m_*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a*b/f*Subst[Int[(a+x)^(m-1)*(c+d/b*x)^n/(b^2+a*x),x],x,b*Tan[e+f*x]] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && EqQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

$$5. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

$$1. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 2$$

$$\mathbf{1:} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 2 \wedge n < -1$$

Derivation: Tangent recurrence 1a with  $A \rightarrow a^2$ ,  $B \rightarrow 2 a b$ ,  $C \rightarrow b^2$ ,  $m \rightarrow m - 2$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 2 \wedge n < -1$ , then

$$\begin{aligned} & \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \\ & \frac{(b c - a d)^2 (a + b \tan[e + f x])^{m-2} (c + d \tan[e + f x])^{n+1}}{d f (n+1) (c^2 + d^2)} - \\ & \frac{1}{d (n+1) (c^2 + d^2)} \int (a + b \tan[e + f x])^{m-3} (c + d \tan[e + f x])^{n+1} \cdot \\ & (a^2 d (b d (m-2) - a c (n+1)) + b (b c - 2 a d) (b c (m-2) + a d (n+1)) - \\ & d (n+1) (3 a^2 b c - b^3 c - a^3 d + 3 a b^2 d) \tan[e + f x] - \\ & b (a d (2 b c - a d) (m+n-1) - b^2 (c^2 (m-2) - d^2 (n+1))) \tan[e + f x]^2) dx \end{aligned}$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  (b*c-a*d)^2*(a+b*Tan[e+f*x])^(m-2)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(d*f*(n+1)*(c^2+d^2)) -
  1/(d*(n+1)*(c^2+d^2))*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m-3)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)*
  Simp[a^2*d*(b*d*(m-2)-a*c*(n+1))+b*(b*c-2*a*d)*(b*c*(m-2)+a*d*(n+1)) -
  d*(n+1)*(3*a^2*b*c-b^3*c-a^3*d+3*a*b^2*d)*Tan[e+f*x] -
  b*(a*d*(2*b*c-a*d)*(m+n-1)-b^2*(c^2*(m-2)-d^2*(n+1)))*Tan[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && GtQ[m,2] && LtQ[n,-1] && IntegerQ[2*m]
```



$$\mathbf{2:} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 2 \wedge n \neq -1$$

Derivation: Tangent recurrence 2a with  $A \rightarrow a^2$ ,  $B \rightarrow 2 a b$ ,  $C \rightarrow b^2$ ,  $m \rightarrow m - 2$

Note: This rule is applied when  $m \in \mathbb{Z}$  even if  $n$  is symbolic since the antiderivative can be expressed in terms of hypergeometric functions instead of requiring Appell functions.

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 2 \wedge n \neq -1 \wedge (n \geq -1 \vee m \in \mathbb{Z})$ , then

$$\begin{aligned} & \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \\ & \frac{b^2 (a + b \tan[e + f x])^{m-2} (c + d \tan[e + f x])^{n+1}}{d f (m + n - 1)} + \\ & \frac{1}{d (m + n - 1)} \int (a + b \tan[e + f x])^{m-3} (c + d \tan[e + f x])^n \cdot \\ & (a^3 d (m + n - 1) - b^2 (b c (m - 2) + a d (1 + n)) + b d (m + n - 1) (3 a^2 - b^2) \tan[e + f x] - b^2 (b c (m - 2) - a d (3 m + 2 n - 4)) \tan[e + f x]^2) dx \end{aligned}$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  b^2*(a+b*Tan[e+f*x])^(m-2)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(d*f*(m+n-1)) +
  1/(d*(m+n-1))*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m-3)*(c+d*Tan[e+f*x])^n*
    Simp[a^3*d*(m+n-1)-b^2*(b*c*(m-2)+a*d*(1+n))+b*d*(m+n-1)*(3*a^2-b^2)*Tan[e+f*x]-
    b^2*(b*c*(m-2)-a*d*(3*m+2*n-4))*Tan[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,n},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && IntegerQ[2*m] && GtQ[m,2] && (GeQ[n,-1] || IntegerQ[
  Not[IGtQ[n,2] && (Not[IntegerQ[m]] || EqQ[c,0] && NeQ[a,0])])
```

$$2. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m < -1$$

$$1. \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge 0 < n < 2$$

$$1: \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge 1 < n < 2$$

Derivation: Tangent recurrence 1a with  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow m - 1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge 1 < n < 2$ , then

$$\begin{aligned} & \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \\ & \frac{(b c - a d) (a + b \tan[e + f x])^{m+1} (c + d \tan[e + f x])^{n-1}}{f (m+1) (a^2 + b^2)} + \\ & \frac{1}{(m+1) (a^2 + b^2)} \int (a + b \tan[e + f x])^{m+1} (c + d \tan[e + f x])^{n-2} \cdot \\ & (a c^2 (m+1) + a d^2 (n-1) + b c d (m-n+2) - (b c^2 - 2 a c d - b d^2) (m+1) \tan[e + f x] - d (b c - a d) (m+n) \tan[e + f x]^2) dx \end{aligned}$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  (b*c-a*d)*(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-1)/(f*(m+1)*(a^2+b^2)) +
  1/((m+1)*(a^2+b^2))*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-2)*
  Simp[a*c^2*(m+1)+a*d^2*(n-1)+b*c*d*(m-n+2)-(b*c^2-2*a*c*d-b*d^2)*(m+1)*Tan[e+f*x]-d*(b*c-a*d)*(m+n)*Tan[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && LtQ[m,-1] && LtQ[1,n,2] && IntegerQ[2*m]
```

$$\mathbf{2:} \int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx \text{ when } bc-ad \neq 0 \wedge a^2+b^2 \neq 0 \wedge c^2+d^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge n > 0$$

Derivation: Tangent recurrence 1a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$

Derivation: Tangent recurrence 3b with  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow m-1$

Rule: If  $bc-ad \neq 0 \wedge a^2+b^2 \neq 0 \wedge c^2+d^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge n > 0$ , then

$$\begin{aligned} & \int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx \rightarrow \\ & \frac{b (a+b \tan[e+fx])^{m+1} (c+d \tan[e+fx])^n}{f (m+1) (a^2+b^2)} + \\ & \frac{1}{(m+1) (a^2+b^2)} \int (a+b \tan[e+fx])^{m+1} (c+d \tan[e+fx])^{n-1} \cdot \\ & (ac(m+1) - bdn - (bc-ad)(m+1) \tan[e+fx] - bd(m+n+1) \tan[e+fx]^2) dx \end{aligned}$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n,x_Symbol] :=
  b*(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*(c+d*Tan[e+f*x])^n/(f*(m+1)*(a^2+b^2)) +
  1/((m+1)*(a^2+b^2))*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-1)*
    Simp[a*c*(m+1)-b*d*n-(b*c-a*d)*(m+1)*Tan[e+f*x]-b*d*(m+n+1)*Tan[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && LtQ[m,-1] && GtQ[n,0] && IntegerQ[2*m]
```

$$\mathbf{2:} \int (a+b \tan[e+fx])^m (c+d \tan[e+fx])^n dx \text{ when } bc-ad \neq 0 \wedge a^2+b^2 \neq 0 \wedge c^2+d^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge (n < 0 \vee m \in \mathbb{Z})$$

Derivation: Tangent recurrence 3a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$

Note: This rule is applied when  $m \in \mathbb{Z}$  even if  $n$  is symbolic since the antiderivative can be expressed in terms of hypergeometric functions instead of requiring Appell functions.

Rule: If  $bc-ad \neq 0 \wedge a^2+b^2 \neq 0 \wedge c^2+d^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge (n < 0 \vee m \in \mathbb{Z})$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow$$

$$\frac{b^2 (a + b \tan[e + f x])^{m+1} (c + d \tan[e + f x])^{n+1}}{f (m+1) (a^2 + b^2) (b c - a d)} +$$

$$\frac{1}{(m+1) (a^2 + b^2) (b c - a d)} \int (a + b \tan[e + f x])^{m+1} (c + d \tan[e + f x])^n \cdot$$

$$(a (b c - a d) (m+1) - b^2 d (m+n+2) - b (b c - a d) (m+1) \tan[e + f x] - b^2 d (m+n+2) \tan[e + f x]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  b^2*(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n+1)/(f*(m+1)*(a^2+b^2)*(b*c-a*d)) +
  1/((m+1)*(a^2+b^2)*(b*c-a*d))*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m+1)*(c+d*Tan[e+f*x])^n*
    Simp[a*(b*c-a*d)*(m+1)-b^2*d*(m+n+2)-b*(b*c-a*d)*(m+1)*Tan[e+f*x]-b^2*d*(m+n+2)*Tan[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,n},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && IntegerQ[2*m] && LtQ[m,-1] && (LtQ[n,0] || IntegerQ[
  Not[ILtQ[n,-1] && (Not[IntegerQ[m]] || EqQ[c,0] && NeQ[a,0])])
```

$$\mathbf{3:} \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 1 \wedge n > 0$$

Derivation: Tangent recurrence 2a with  $A \rightarrow a c$ ,  $B \rightarrow b c + a d$ ,  $C \rightarrow b d$ ,  $m \rightarrow m - 1$ ,  $n \rightarrow n - 1$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m > 1 \wedge n > 0$ , then

$$\begin{aligned} & \int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \\ & \frac{b (a + b \tan[e + f x])^{m-1} (c + d \tan[e + f x])^n}{f (m + n - 1)} + \\ & \frac{1}{m + n - 1} \int (a + b \tan[e + f x])^{m-2} (c + d \tan[e + f x])^{n-1} \cdot \\ & (a^2 c (m + n - 1) - b (b c (m - 1) + a d n) + (2 a b c + a^2 d - b^2 d) (m + n - 1) \tan[e + f x] + b (b c n + a d (2 m + n - 2)) \tan[e + f x]^2) dx \end{aligned}$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  b*(a+b*Tan[e+f*x])^(m-1)*(c+d*Tan[e+f*x])^n/(f*(m+n-1)) +
  1/(m+n-1)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^(m-2)*(c+d*Tan[e+f*x])^(n-1)*
    Simp[a^2*c*(m+n-1)-b*(b*c*(m-1)+a*d*n)+(2*a*b*c+a^2*d-b^2*d)*(m+n-1)*Tan[e+f*x]+b*(b*c*n+a*d*(2*m+n-2))*Tan[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && GtQ[m,1] && GtQ[n,0] && IntegerQ[2*n]
```

$$4. \int \frac{(a + b \tan[e + f x])^m}{c + d \tan[e + f x]} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

$$\mathbf{1:} \int \frac{1}{(a + b \tan[e + f x]) (c + d \tan[e + f x])} dx \text{ when } b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \frac{1}{(a+bz)(c+dz)} = \frac{a c - b d}{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} + \frac{b^2 (b - a z)}{(b c - a d)(a^2 + b^2)(a + b z)} - \frac{d^2 (d - c z)}{(b c - a d)(c^2 + d^2)(c + d z)}$$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{A + B \tan[e + f x]}{(a + b \tan[e + f x]) (c + d \tan[e + f x])} dx \rightarrow$$

$$\frac{(a c - b d) x}{(a^2 + b^2) (c^2 + d^2)} + \frac{b^2}{(b c - a d) (a^2 + b^2)} \int \frac{b - a \tan[e + f x]}{a + b \tan[e + f x]} dx - \frac{d^2}{(b c - a d) (c^2 + d^2)} \int \frac{d - c \tan[e + f x]}{c + d \tan[e + f x]} dx$$

Program code:

```
Int[1/((a_+b_.*tan[e_+f_.*x_])*(c_+d_.*tan[e_+f_.*x_])),x_Symbol] :=
(a*c-b*d)*x/((a^2+b^2)*(c^2+d^2)) +
b^2/((b*c-a*d)*(a^2+b^2))*Int[(b-a*Tan[e+f*x])/(a+b*Tan[e+f*x]),x] -
d^2/((b*c-a*d)*(c^2+d^2))*Int[(d-c*Tan[e+f*x])/(c+d*Tan[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

$$2: \int \frac{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}{c+d \tan[e+fx]} dx \text{ when } bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \frac{\sqrt{a+bz}}{c+dz} == \frac{ac+bd+(bc-ad)z}{(c^2+d^2)\sqrt{a+bz}} - \frac{d(bc-ad)(1+z^2)}{(c^2+d^2)\sqrt{a+bz}(c+dz)}$$

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}}{c+d \tan[e+fx]} dx \rightarrow \frac{1}{c^2+d^2} \int \frac{ac+bd+(bc-ad) \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}} dx - \frac{d(bc-ad)}{c^2+d^2} \int \frac{1+\tan[e+fx]^2}{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}(c+d \tan[e+fx])} dx$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_]]/(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  1/(c^2+d^2)*Int[Simp[a*c+b*d+(b*c-a*d)*Tan[e+f*x],x]/Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]],x] -
  d*(b*c-a*d)/(c^2+d^2)*Int[(1+Tan[e+f*x]^2)/(Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]]*(c+d*Tan[e+f*x])),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

$$3: \int \frac{(a+b \tan[e+fx])^{3/2}}{c+d \tan[e+fx]} dx \text{ when } bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \frac{(a+bz)^{3/2}}{c+dz} == \frac{a^2c-b^2c+2abd+(2abc-a^2d+b^2d)z}{(c^2+d^2)\sqrt{a+bz}} + \frac{(bca-d)^2(1+z^2)}{(c^2+d^2)\sqrt{a+bz}(c+dz)}$$

Rule: If  $bc - ad \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{(a+b \tan[e+fx])^{3/2}}{c+d \tan[e+fx]} dx \rightarrow \frac{1}{c^2+d^2} \int \frac{a^2 c - b^2 c + 2 a b d + (2 a b c - a^2 d + b^2 d) \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \tan[e+fx]}} dx + \frac{(b c - a d)^2}{c^2+d^2} \int \frac{1 + \tan[e+fx]^2}{\sqrt{a+b \tan[e+fx]} (c+d \tan[e+fx])} dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^(3/2)/(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  1/(c^2+d^2)*Int[Simp[a^2*c-b^2*c+2*a*b*d+(2*a*b*c-a^2*d+b^2*d)*Tan[e+f*x],x]/Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]],x] +
  (b*c-a*d)^2/(c^2+d^2)*Int[(1+Tan[e+f*x]^2)/(Sqrt[a+b*Tan[e+f*x]]*(c+d*Tan[e+f*x])),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

**4:**  $\int \frac{(a+b \tan[e+fx])^m}{c+d \tan[e+fx]} dx$  when  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m \notin \mathbb{Z}$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $\frac{1}{c+d z} = \frac{c-d z}{c^2+d^2} + \frac{d^2 (1+z^2)}{(c^2+d^2) (c+d z)}$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0 \wedge m \notin \mathbb{Z}$ , then

$$\int \frac{(a+b \tan[e+fx])^m}{c+d \tan[e+fx]} dx \rightarrow \frac{1}{c^2+d^2} \int (a+b \tan[e+fx])^m (c-d \tan[e+fx]) dx + \frac{d^2}{c^2+d^2} \int \frac{(a+b \tan[e+fx])^m (1 + \tan[e+fx]^2)}{c+d \tan[e+fx]} dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m/(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  1/(c^2+d^2)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m*(c-d*Tan[e+f*x]),x] +
  d^2/(c^2+d^2)*Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m*(1+Tan[e+f*x]^2)/(c+d*Tan[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0] && Not[IntegerQ[m]]
```



**5:**  $\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx$  when  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$

Derivation: Integration by substitution

Basis:  $F[\tan[e + f x]] = \frac{1}{f} \text{Subst}\left[\frac{F[x]}{1+x^2}, x, \tan[e + f x]\right] \partial_x \tan[e + f x]$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 + b^2 \neq 0 \wedge c^2 + d^2 \neq 0$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{1}{f} \text{Subst}\left[\int \frac{(a + b x)^m (c + d x)^n}{1 + x^2} dx, x, \tan[e + f x]\right]$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_*(c_.+d_.*tan[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  With[{ff=FreeFactors[Tan[e+f*x],x]},
    ff/f*Subst[Int[(a+b*ff*x)^m*(c+d*ff*x)^n/(1+ff^2*x^2),x],x,Tan[e+f*x]/ff]] /;
  FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n},x] && NeQ[b*c-a*d,0] && NeQ[a^2+b^2,0] && NeQ[c^2+d^2,0]
```

### Rules for integrands of the form $(a + b \tan[e + f x])^m (c + d \tan[e + f x])^n$

**1:**  $\int (a + b \tan[e + f x])^m (d \cot[e + f x])^n dx$  when  $n \notin \mathbb{Z} \wedge m \in \mathbb{Z}$

Derivation: Algebraic normalization

Basis: If  $m \in \mathbb{Z}$ , then  $(a + b \tan[z])^m = \frac{d^m (b + a \cot[z])^m}{(d \cot[z])^m}$

Rule: If  $n \notin \mathbb{Z} \wedge m \in \mathbb{Z}$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (d \cot[e + f x])^n dx \rightarrow d^m \int (b + a \cot[e + f x])^m (d \cot[e + f x])^{n-m} dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_.*(d_./tan[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  d^m*Int[(b+a*Cot[e+f*x])^m*(d*Cot[e+f*x])^(n-m),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x] && Not[IntegerQ[n]] && IntegerQ[m]
```

```
Int[(a_.+b_.*cot[e_.+f_.*x_])^m_.*(d_./cot[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  d^m*Int[(b+a*Tan[e+f*x])^m*(d*Tan[e+f*x])^(n-m),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x] && Not[IntegerQ[n]] && IntegerQ[m]
```

**2:**  $\int (a + b \tan[e + f x])^m (c (d \tan[e + f x])^p)^n dx$  when  $n \notin \mathbb{Z} \wedge m \notin \mathbb{Z}$

Derivation: Piecewise constant extraction

Basis:  $\partial_x \frac{(c (d \tan[e + f x])^p)^n}{(d \tan[e + f x])^{n p}} == 0$

Rule: If  $n \notin \mathbb{Z} \wedge m \notin \mathbb{Z}$ , then

$$\int (a + b \tan[e + f x])^m (c (d \tan[e + f x])^p)^n dx \rightarrow \frac{c^{\text{IntPart}[n]} (c (d \tan[e + f x])^p)^{\text{FracPart}[n]}}{(d \tan[e + f x])^{p \text{FracPart}[n]}} \int (a + b \tan[e + f x])^m (d \tan[e + f x])^{n p} dx$$

Program code:

```
Int[(a_.+b_.*tan[e_.+f_.*x_])^m_.*(c_.*(d_.*tan[e_.+f_.*x_])^p_)^n_,x_Symbol] :=
  c^IntPart[n]*(c*(d*Tan[e + f*x])^p)^FracPart[n]/(d*Tan[e + f*x])^(p*FracPart[n])*
  Int[(a+b*Tan[e+f*x])^m*(d*Tan[e+f*x])^(n*p),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n,p},x] && Not[IntegerQ[n]] && Not[IntegerQ[m]]
```

```
Int[(a_.+b_.*cot[e_.+f_.*x_])^m_.*(c_.*(d_.*cot[e_.+f_.*x_])^p_)^n_,x_Symbol] :=
  c^IntPart[n]*(c*(d*Cot[e + f*x])^p)^FracPart[n]/(d*Cot[e + f*x])^(p*FracPart[n])*
  Int[(a+b*Cot[e+f*x])^m*(d*Cot[e+f*x])^(n*p),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,f,m,n,p},x] && Not[IntegerQ[n]] && Not[IntegerQ[m]]
```