

## Rules for integrands of the form $(a + b \operatorname{Sec}[c + d x])^n$

$$1. \int (b \operatorname{Sec}[c + d x])^n dx$$

$$1. \int (b \operatorname{Sec}[c + d x])^n dx \text{ when } n > 1$$

$$\text{1: } \int \operatorname{Sec}[c + d x]^n dx \text{ when } \frac{n}{2} \in \mathbb{Z}^+$$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If  $\frac{n}{2} \in \mathbb{Z}$ , then  $\operatorname{Sec}[c + d x]^n = \frac{1}{d} (1 + \operatorname{Tan}[c + d x]^2)^{\frac{n}{2}-1} \partial_x \operatorname{Tan}[c + d x]$

Rule: If  $\frac{n}{2} \in \mathbb{Z}^+$ , then

$$\int \operatorname{Sec}[c + d x]^n dx \rightarrow \frac{1}{d} \operatorname{Subst}\left[\int (1 + x^2)^{\frac{n}{2}-1} dx, x, \operatorname{Tan}[c + d x]\right]$$

Program code:

```
Int[csc[c_.*d_.*x_]^n_,x_Symbol] :=
  -1/d*Subst[Int[ExpandIntegrand[(1+x^2)^(n/2-1),x],x],x,Cot[c+d*x]] /;
FreeQ[{c,d},x] && IGtQ[n/2,0]
```

**2:**  $\int (b \sec[c + d x])^n dx$  when  $n > 1$

Reference: CRC 313

Reference: CRC 309

Derivation: Secant recurrence 3a with  $A \rightarrow 0$ ,  $B \rightarrow a$ ,  $C \rightarrow d$ ,  $m \rightarrow m - 1$ ,  $n \rightarrow -1$

Rule: If  $n > 1$ , then

$$\int (b \sec[c + d x])^n dx \rightarrow \frac{b \sin[c + d x] (b \sec[c + d x])^{n-1}}{d (n-1)} + \frac{b^2 (n-2)}{n-1} \int (b \sec[c + d x])^{n-2} dx$$

Program code:

```
Int[(b_.*csc[c_.+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -b*Cos[c+d*x]*(b*Csc[c+d*x])^(n-1)/(d*(n-1)) +
  b^2*(n-2)/(n-1)*Int[(b*Csc[c+d*x])^(n-2),x] /;
FreeQ[{b,c,d},x] && GtQ[n,1] && IntegerQ[2*n]
```

**2:**  $\int (b \sec[c + d x])^n dx$  when  $n < -1$

Reference: CRC 305

Reference: CRC 299

Derivation: Secant recurrence 1a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow 0$

Rule: If  $n < -1$ , then

$$\int (b \sec[c + d x])^n dx \rightarrow -\frac{\sin[c + d x] (b \sec[c + d x])^{n+1}}{b d n} + \frac{(n+1)}{b^2 n} \int (b \sec[c + d x])^{n+2} dx$$

Program code:

```
Int[(b_.*csc[c_.+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  Cos[c+d*x]*(b*Csc[c+d*x])^(n+1)/(b*d*n) +
  (n+1)/(b^2*n)*Int[(b*Csc[c+d*x])^(n+2),x] /;
FreeQ[{b,c,d},x] && LtQ[n,-1] && IntegerQ[2*n]
```

**3:**  $\int \sec[c + d x] dx$

Reference: G&R 2.526.9, CRC 294, A&S 4.3.117

Reference: G&R 2.526.1, CRC 295, A&S 4.3.116

Derivation: Integration by substitution

Basis:  $\sec[c + d x] = \frac{1}{d} \operatorname{Subst}\left[\frac{1}{1-x^2}, x, \sin[c + d x]\right] \partial_x \sin[c + d x]$

Rule:

$$\int \sec[c + d x] dx \rightarrow \frac{\text{ArcTanh}[\text{Sin}[c + d x]]}{d}$$

Program code:

```
Int[csc[c_.+d_.*x_],x_Symbol] :=
(* -ArcCoth[Cos[c+d*x]]/d /; *)
  -ArcTanh[Cos[c+d*x]]/d /;
FreeQ[{c,d},x]
```

**x:**  $\int \frac{1}{\sec[c + d x]} dx$

Note: This rule not necessary since *Mathematica* automatically simplifies  $\frac{1}{\sec[z]}$  to  $\cos[z]$ .

Rule:

$$\int \frac{1}{\sec[c + d x]} dx \rightarrow \int \cos[c + d x] dx \rightarrow \frac{\text{Sin}[c + d x]}{d}$$

Program code:

```
(* Int[1/csc[c_.+d_.*x_],x_Symbol] :=
  -Cos[c+d*x]/d /;
FreeQ[{c,d},x] *)
```

**4:**  $\int (b \sec[c + d x])^n dx$  when  $n^2 = \frac{1}{4}$

Derivation: Piecewise constant extraction

Basis:  $\partial_x ((b \sec[c + d x])^n (\cos[c + d x])^n) = 0$

Rule: If  $n^2 = \frac{1}{4}$ , then

$$\int (b \sec[c + d x])^n dx \rightarrow (b \sec[c + d x])^n (\cos[c + d x])^n \int \frac{1}{\cos[c + d x]^n} dx$$

Program code:

```
Int[(b_.*csc[c_.+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  (b*Csc[c+d*x])^n*Sin[c+d*x]^n*Int[1/Sin[c+d*x]^n,x] /;
FreeQ[{b,c,d},x] && EqQ[n^2,1/4]
```

**5:**  $\int (b \operatorname{Sec}[c + d x])^n dx$  when  $n \notin \mathbb{Z}$

Derivation: Piecewise constant extraction

Basis:  $\partial_x ((b \operatorname{Sec}[c + d x])^n (\operatorname{Cos}[c + d x])^n) = 0$

Note: Decrementing the exponents in the piecewise constant factor results in canceling out the cosine factor introduced when integrating the power of the cosine.

Rule: If  $2n \notin \mathbb{Z}$ , then

$$\int (b \operatorname{Sec}[c + d x])^n dx \rightarrow (b \operatorname{Sec}[c + d x])^{n-1} \left( \frac{\operatorname{Cos}[c + d x]}{b} \right)^{n-1} \int \frac{1}{\left( \frac{\operatorname{Cos}[c + d x]}{b} \right)^n} dx$$

Program code:

```
Int[(b_.*csc[c_.+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  (b*Csc[c+d*x])^(n-1)*((Sin[c+d*x]/b)^(n-1)*Int[1/(Sin[c+d*x]/b)^n,x]) /;
FreeQ[{b,c,d,n},x] && Not[IntegerQ[n]]
```

$$2: \int (a + b \sec[c + dx])^2 dx$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } (a + bz)^2 = a^2 + 2abz + b^2z^2$$

Rule:

$$\int (a + b \sec[c + dx])^2 dx \rightarrow a^2 x + 2ab \int \sec[c + dx] dx + b^2 \int \sec[c + dx]^2 dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[c_+d_.*x_])^2,x_Symbol] :=
  a^2*x + 2*a*b*Int[Csc[c+d*x],x] + b^2*Int[Csc[c+d*x]^2,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x]
```

$$3. \int (a + b \sec[c + dx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

$$1. \int (a + b \sec[c + dx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge 2n \in \mathbb{Z}$$

$$1. \int (a + b \sec[c + dx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge 2n \in \mathbb{Z}^+$$

$$1: \int \sqrt{a + b \sec[c + dx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

Author: Martin Welz on 24 June 2011

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: If } a^2 - b^2 = 0, \text{ then } \sqrt{a + b \sec[c + dx]} = \frac{2b}{d} \text{Subst}\left[\frac{1}{a+x^2}, x, \frac{b \tan[c+dx]}{\sqrt{a+b \sec[c+dx]}}\right] \partial_x \frac{b \tan[c+dx]}{\sqrt{a+b \sec[c+dx]}}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then

$$\int \sqrt{a+b \sec[c+dx]} \, dx \rightarrow \frac{2b}{d} \text{Subst}\left[\int \frac{1}{a+x^2} \, dx, x, \frac{b \tan[c+dx]}{\sqrt{a+b \sec[c+dx]}}\right]$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a+b_.*csc[c_.+d_.*x_]],x_Symbol] :=
  -2*b/d*Subst[Int[1/(a+x^2),x],x,b*Cot[c+d*x]/Sqrt[a+b*Csc[c+d*x]]] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && EqQ[a^2-b^2,0]
```

**2:**  $\int (a+b \sec[c+dx])^n \, dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 1 \wedge 2n \in \mathbb{Z}$

Derivation: Symmetric secant recurrence 1b with  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $m \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow n-1$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 1 \wedge 2n \in \mathbb{Z}$ , then

$$\int (a+b \sec[c+dx])^n \, dx \rightarrow \frac{b^2 \tan[c+dx] (a+b \sec[c+dx])^{n-2}}{d(n-1)} + \frac{a}{n-1} \int (a+b \sec[c+dx])^{n-2} (a(n-1) + b(3n-4) \sec[c+dx]) \, dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*csc[c_.+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -b^2*Cot[c+d*x]*(a+b*Csc[c+d*x])^(n-2)/(d*(n-1)) +
  a/(n-1)*Int[(a+b*Csc[c+d*x])^(n-2)*(a*(n-1)+b*(3*n-4)*Csc[c+d*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && GtQ[n,1] && IntegerQ[2*n]
```



$$2. \int (a + b \sec[c + d x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge 2n \in \mathbb{Z}^-$$

$$1: \int \frac{1}{\sqrt{a + b \sec[c + d x]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

Author: Martin on sci.math.symbolic on 10 March 2011

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \frac{1}{\sqrt{a+bz}} = \frac{\sqrt{a+bz}}{a} - \frac{bz}{a\sqrt{a+bz}}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then

$$\int \frac{1}{\sqrt{a + b \sec[c + d x]}} dx \rightarrow \frac{1}{a} \int \sqrt{a + b \sec[c + d x]} dx - \frac{b}{a} \int \frac{\sec[c + d x]}{\sqrt{a + b \sec[c + d x]}} dx$$

Program code:

```
Int[1/Sqrt[a+_.*csc[c_+d_.*x_]],x_Symbol] :=
  1/a*Int[Sqrt[a+b*Csc[c+d*x]],x] -
  b/a*Int[Csc[c+d*x]/Sqrt[a+b*Csc[c+d*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && EqQ[a^2-b^2,0]
```

$$2: \int (a + b \sec[c + d x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge n \leq -1 \wedge 2n \in \mathbb{Z}$$

Derivation: Symmetric secant recurrence 2b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n \leq -1 \wedge 2n \in \mathbb{Z}$ , then

$$\int (a + b \sec[c + d x])^n dx \rightarrow$$

$$\frac{\tan[c+dx] (a+b \sec[c+dx])^n}{d(2n+1)} + \frac{1}{a^2(2n+1)} \int (a+b \sec[c+dx])^{n+1} (a(2n+1) - b(n+1) \sec[c+dx]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[c_+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -Cot[c+d*x]*(a+b*Csc[c+d*x])^n/(d*(2*n+1)) +
  1/(a^2*(2*n+1))*Int[(a+b*Csc[c+d*x])^(n+1)*(a*(2*n+1)-b*(n+1)*Csc[c+d*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && LeQ[n,-1] && IntegerQ[2*n]
```

2.  $\int (a+b \sec[c+dx])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge 2n \notin \mathbb{Z}$

**1:**  $\int (a+b \sec[c+dx])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge 2n \notin \mathbb{Z} \wedge a > 0$

Derivation: Piecewise constant extraction and integration by substitution

Basis: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then  $\partial_x \frac{\tan[c+dx]}{\sqrt{1+\sec[c+dx]} \sqrt{1-\sec[c+dx]}} = 0$

Basis: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge a > 0$ , then  $-\frac{\tan[c+dx]}{\sqrt{1+\sec[c+dx]} \sqrt{1-\sec[c+dx]}} \frac{\tan[c+dx]}{\sqrt{1+\frac{b}{a}\sec[c+dx]} \sqrt{1-\frac{b}{a}\sec[c+dx]}} = 1$

Basis:  $\tan[c+dx] F[\sec[c+dx]] = \frac{1}{d} \text{Subst}\left[\frac{F[x]}{x}, x, \sec[c+dx]\right] \partial_x \sec[c+dx]$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge 2n \notin \mathbb{Z} \wedge a > 0$ , then

$$\begin{aligned} \int (a+b \sec[c+dx])^n dx &\rightarrow a^n \int \left(1 + \frac{b}{a} \sec[c+dx]\right)^n dx \rightarrow \\ &-\frac{a^n \tan[c+dx]}{\sqrt{1+\sec[c+dx]} \sqrt{1-\sec[c+dx]}} \int \frac{\tan[c+dx] \left(1 + \frac{b}{a} \sec[c+dx]\right)^{n-\frac{1}{2}}}{\sqrt{1-\frac{b}{a}\sec[c+dx]}} dx \rightarrow \end{aligned}$$

$$- \frac{a^n \tan[c+dx]}{d \sqrt{1+\sec[c+dx]} \sqrt{1-\sec[c+dx]}} \text{Subst} \left[ \int \frac{\left(1 + \frac{bx}{a}\right)^{n-\frac{1}{2}}}{x \sqrt{1 - \frac{bx}{a}}} dx, x, \sec[c+dx] \right]$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[c_+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a^n*Cot[c+d*x]/(d*Sqrt[1+Csc[c+d*x]]*Sqrt[1-Csc[c+d*x]])*
  Subst[Int[(1+b*x/a)^(n-1/2)/(x*Sqrt[1-b*x/a]),x],x,Csc[c+d*x]] /;
FreeQ[{a,b,c,d,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && Not[IntegerQ[2*n]] && GtQ[a,0]
```

**2:**  $\int (a+b \sec[c+dx])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge 2n \notin \mathbb{Z} \wedge a \neq 0$

Derivation: Piecewise constant extraction

Basis: If  $\partial_x \frac{(a+b \sec[c+dx])^n}{\left(1+\frac{b}{a} \sec[c+dx]\right)^n} = 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge 2n \notin \mathbb{Z} \wedge a \neq 0$ , then

$$\int (a+b \sec[c+dx])^n dx \rightarrow \frac{a^{\text{IntPart}[n]} (a+b \sec[c+dx])^{\text{FracPart}[n]}}{\left(1+\frac{b}{a} \sec[c+dx]\right)^{\text{FracPart}[n]}} \int \left(1+\frac{b}{a} \sec[c+dx]\right)^n dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[c_+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a^IntPart[n]*(a+b*Csc[c+d*x])^FracPart[n]/(1+b/a*Csc[c+d*x])^FracPart[n]*Int[(1+b/a*Csc[c+d*x])^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && Not[IntegerQ[2*n]] && Not[GtQ[a,0]]
```

4.  $\int (a + b \sec[c + d x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge 2n \in \mathbb{Z}$

1.  $\int (a + b \sec[c + d x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge 2n \in \mathbb{Z}^+$

1:  $\int \sqrt{a + b \sec[c + d x]} dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \sqrt{a + b \sec[c + d x]} dx \rightarrow$$

$$-\frac{2(a + b \sec[c + d x])}{d \sqrt{a + b} \tan[c + d x]} \sqrt{\frac{b(1 + \sec[c + d x])}{a + b \sec[c + d x]}} \sqrt{-\frac{b(1 - \sec[c + d x])}{a + b \sec[c + d x]}} \operatorname{EllipticPi}\left[\frac{a}{a + b}, \operatorname{ArcSin}\left[\frac{\sqrt{a + b}}{\sqrt{a + b \sec[c + d x]}}\right], \frac{a - b}{a + b}\right]$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a_+b_.*csc[c_+d_.*x_]],x_Symbol] :=
  2*(a+b*Csc[c+d*x])/(d*Rt[a+b,2]*Cot[c+d*x])*Sqrt[b*(1+Csc[c+d*x])/(a+b*Csc[c+d*x])]*Sqrt[-b*(1-Csc[c+d*x])/(a+b*Csc[c+d*x])]*
  EllipticPi[a/(a+b),ArcSin[Rt[a+b,2]/Sqrt[a+b*Csc[c+d*x]]],(a-b)/(a+b)] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

2:  $\int (a + b \sec[c + d x])^{3/2} dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $(a + b z)^{3/2} = a^2 \frac{1+z}{\sqrt{a+b z}} - \frac{z(a^2 - 2ab - b^2 z)}{\sqrt{a+b z}}$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int (a + b \sec[c + d x])^{3/2} dx \rightarrow \int \frac{a^2 + b(2a - b) \sec[c + d x]}{\sqrt{a + b \sec[c + d x]}} dx + b^2 \int \frac{\sec[c + d x] (1 + \sec[c + d x])}{\sqrt{a + b \sec[c + d x]}} dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[c_+d_.*x_])^(3/2),x_Symbol] :=
  Int[(a^2+b*(2*a-b)*Csc[c+d*x])/Sqrt[a+b*Csc[c+d*x]],x] +
  b^2*Int[Csc[c+d*x]*(1+Csc[c+d*x])/Sqrt[a+b*Csc[c+d*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

**3:**  $\int (a + b \sec[c + d x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 2 \wedge 2n \in \mathbb{Z}$

Derivation: Secant recurrence 1b with  $A \rightarrow a^2$ ,  $B \rightarrow 2ab$ ,  $C \rightarrow b^2$ ,  $m \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow n - 2$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 2 \wedge 2n \in \mathbb{Z}$ , then

$$\int (a + b \sec[c + d x])^n dx \rightarrow \frac{b^2 \tan[c + d x] (a + b \sec[c + d x])^{n-2}}{d(n-1)} + \frac{1}{n-1} \int (a + b \sec[c + d x])^{n-3} (a^3(n-1) + b(b^2(n-2) + 3a^2(n-1)) \sec[c + d x] + ab^2(3n-4) \sec[c + d x]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[c_+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -b^2*Cot[c+d*x]*(a+b*Csc[c+d*x])^(n-2)/(d*(n-1)) +
  1/(n-1)*Int[(a+b*Csc[c+d*x])^(n-3)*
    Simp[a^3*(n-1)+(b*(b^2*(n-2)+3*a^2*(n-1)))*Csc[c+d*x]+(a*b^2*(3*n-4))*Csc[c+d*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && GtQ[n,2] && IntegerQ[2*n]
```

2.  $\int (a + b \sec[c + d x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge 2n \in \mathbb{Z}^-$

1:  $\int \frac{1}{a + b \sec[c + d x]} dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $\frac{1}{a+bz} = \frac{1}{a} - \frac{bz}{a(a+bz)}$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{1}{a + b \sec[c + d x]} dx \rightarrow \frac{x}{a} - \frac{b}{a} \int \frac{\sec[c + d x]}{a + b \sec[c + d x]} dx \rightarrow \frac{x}{a} - \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + \frac{a \cos[c + d x]}{b}} dx$$

Program code:

```
Int[1/(a+b_.*csc[c_.+d_.*x_]),x_Symbol] :=
  x/a - 1/a*Int[1/(1+a/b*Sin[c+d*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

**2:**  $\int \frac{1}{\sqrt{a+b \sec[c+dx]}} dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{1}{\sqrt{a+b \sec[c+dx]}} dx \rightarrow$$

$$-\frac{2\sqrt{a+b}}{ad \tan[c+dx]} \sqrt{\frac{b(1-\sec[c+dx])}{a+b}} \sqrt{-\frac{b(1+\sec[c+dx])}{a-b}} \operatorname{EllipticPi}\left[\frac{a+b}{a}, \operatorname{ArcSin}\left[\frac{\sqrt{a+b \sec[c+dx]}}{\sqrt{a+b}}\right], \frac{a+b}{a-b}\right]$$

Program code:

```
Int[1/Sqrt[a+b_*csc[c_+d_*x_]],x_Symbol] :=
  2*Rt[a+b,2]/(a*d*Cot[c+d*x])*Sqrt[b*(1-Csc[c+d*x])/(a+b)]*Sqrt[-b*(1+Csc[c+d*x])/(a-b)]*
  EllipticPi[(a+b)/a,ArcSin[Sqrt[a+b*Csc[c+d*x]]/Rt[a+b,2]],(a+b)/(a-b)] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

**3:**  $\int (a + b \sec[c + d x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n < -1 \wedge 2n \in \mathbb{Z}$

Derivation: Secant recurrence 2b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n < -1 \wedge 2n \in \mathbb{Z}$ , then

$$\int (a + b \sec[c + d x])^n dx \rightarrow -\frac{b^2 \tan[c + d x] (a + b \sec[c + d x])^{n+1}}{a d (n+1) (a^2 - b^2)} + \frac{1}{a (n+1) (a^2 - b^2)} \int (a + b \sec[c + d x])^{n+1} ((a^2 - b^2) (n+1) - a b (n+1) \sec[c + d x] + b^2 (n+2) \sec[c + d x]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[c_+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  b^2*Cot[c+d*x]*(a+b*Csc[c+d*x])^(n+1)/(a*d*(n+1)*(a^2-b^2)) +
  1/(a*(n+1)*(a^2-b^2))*Int[(a+b*Csc[c+d*x])^(n+1)*Simp[(a^2-b^2)*(n+1)-a*b*(n+1)*Csc[c+d*x]+b^2*(n+2)*Csc[c+d*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[n,-1] && IntegerQ[2*n]
```



**X:**  $\int (a + b \operatorname{Sec}[c + d x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge 2n \notin \mathbb{Z}$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge 2n \notin \mathbb{Z}$ , then

$$\int (a + b \operatorname{Sec}[c + d x])^n dx \rightarrow \int (a + b \operatorname{Sec}[c + d x])^n dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[c_+d_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  Unintegrable[(a+b*Csc[c+d*x])^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,n},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && Not[IntegerQ[2*n]]
```