

## Rules for integrands of the form $(d \operatorname{Sec}[e + f x])^n (a + b \operatorname{Sec}[e + f x])^m$

**1:**  $\int (a + b \operatorname{Sec}[e + f x]) (d \operatorname{Sec}[e + f x])^n dx$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $a + b z = a + \frac{b}{d} (d z)$

Rule:

$$\int (a + b \operatorname{Sec}[e + f x]) (d \operatorname{Sec}[e + f x])^n dx \rightarrow a \int (d \operatorname{Sec}[e + f x])^n dx + \frac{b}{d} \int (d \operatorname{Sec}[e + f x])^{n+1} dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a*Int[(d*Csc[e+f*x])^n,x] + b/d*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n+1),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x]
```

**2:**  $\int (a + b \operatorname{Sec}[e + f x])^2 (d \operatorname{Sec}[e + f x])^n dx$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $(a + b z)^2 = 2 a b z + a^2 + b^2 z^2$

Rule:

$$\int (a + b \operatorname{Sec}[e + f x])^2 (d \operatorname{Sec}[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{2 a b}{d} \int (d \operatorname{Sec}[e + f x])^{n+1} dx + \int (d \operatorname{Sec}[e + f x])^n (a^2 + b^2 \operatorname{Sec}[e + f x]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^2*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  2*a*b/d*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n+1),x] + Int[(d*Csc[e+f*x])^n*(a^2+b^2*Csc[e+f*x]^2),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x]
```

3: 
$$\int \frac{\sec[e+fx]^2}{a+b \sec[e+fx]} dx$$

Derivation: Algebraic expansion

Basis: 
$$\frac{z}{a+bz} = \frac{1}{b} - \frac{a}{b(a+bz)}$$

Rule:

$$\int \frac{\sec[e+fx]^2}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{1}{b} \int \sec[e+fx] dx - \frac{a}{b} \int \frac{\sec[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]} dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.*x_]^2/(a_.+b_.*csc[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  1/b*Int[Csc[e+f*x],x] - a/b*Int[Csc[e+f*x]/(a+b*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x]
```

4:  $\int \frac{\sec[e+fx]^3}{a+b \sec[e+fx]} dx$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $\frac{z}{a+bz} = \frac{1}{b} - \frac{a}{b(a+bz)}$

Rule:

$$\int \frac{\sec[e+fx]^3}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{\tan[e+fx]}{bf} - \frac{a}{b} \int \frac{\sec[e+fx]^2}{a+b \sec[e+fx]} dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.*x_]^3/(a_.+b_.*csc[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  -Cot[e+f*x]/(b*f) - a/b*Int[Csc[e+f*x]^2/(a+b*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x]
```

5.  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0$

1:  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \in \mathbb{Z}^+$

Derivation: Algebraic expansion

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \in \mathbb{Z}^+$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \int \text{ExpandTrig}[(a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n, x] dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  Int[ExpandTrig[(a+b*csc[e+f*x])^m*(d*csc[e+f*x])^n,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && IGtQ[m,0] && RationalQ[n]
```

$$2. \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

$$1. \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m > 0$$

$$1: \int \sec[e+fx] \sqrt{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1b with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $m \rightarrow \frac{1}{2}$ ,  $n \rightarrow -1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then

$$\int \sec[e+fx] \sqrt{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{2b \tan[e+fx]}{f \sqrt{a+b \sec[e+fx]}}$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_.*x_]*Sqrt[a_+b_.*csc[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  -2*b*Cot[e+f*x]/(f*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]) /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0]
```

**2:**  $\int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m > \frac{1}{2}$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1b with  $n \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m > \frac{1}{2}$ , then

$$\int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow \frac{b \tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m-1}}{f m} + \frac{a (2m-1)}{m} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m-1} dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.**x_]*(a_.+b_.*csc[e_.+f_.**x_])^m_,x_Symbol] :=
  -b*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-1)/(f*m) + a*(2*m-1)/m*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-1),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && GtQ[m,1/2] && IntegerQ[2*m]
```

$$2. \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m < 0$$

$$1: \int \frac{\sec[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow -1$ ,  $n \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then

$$\int \frac{\sec[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{\tan[e+fx]}{f (b+a \sec[e+fx])}$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.*x_]/(a_.+b_.*csc[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  -Cot[e+f*x]/(f*(b+a*Csc[e+f*x])) /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0]
```

$$2: \int \frac{\sec[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

Author: Martin on sci.math.symbolic on 10 March 2011

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: If } a^2 - b^2 = 0, \text{ then } \frac{\sec[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} = \frac{2}{f} \text{Subst} \left[ \frac{1}{2a+x^2}, x, \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} \right] \partial_x \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then

$$\int \frac{\sec[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow \frac{2}{f} \text{Subst} \left[ \int \frac{1}{2a+x^2} dx, x, \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} \right]$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.*x_]/Sqrt[a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  -2/f*Subst[Int[1/(2*a+x^2),x],x,b*Cot[e+f*x]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0]
```



**3:**  $\int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -\frac{1}{2}$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2b with  $n \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -\frac{1}{2}$ , then

$$\int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow -\frac{b \tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m}{a f (2m+1)} + \frac{m+1}{a (2m+1)} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1} dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_*x_]*(a_+b_*csc[e_+f_*x_])^m_,x_Symbol] :=
  b*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m/(a*f*(2*m+1)) + (m+1)/(a*(2*m+1))*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1/2] && IntegerQ[2*m]
```

3.  $\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 = 0$

1:  $\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -\frac{1}{2}$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $n \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -\frac{1}{2}$ , then

$$\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow \frac{\tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m}{f(2m+1)} + \frac{m}{b(2m+1)} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1} dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_*x_]^2*(a_+b_*csc[e_+f_*x_]^m_,x_Symbol] :=
  -Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m/(f*(2*m+1)) +
  m/(b*(2*m+1))*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1/2]
```

**2:**  $\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \neq -\frac{1}{2}$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2c with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $n \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \neq -\frac{1}{2}$ , then

$$\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow \frac{\tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m}{f(m+1)} + \frac{am}{b(m+1)} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_.*x_]^2*(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_,x_Symbol] :=
  -Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m/(f*(m+1)) +
  a*m/(b*(m+1))*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m,x] /;
FreeQ[{a,b,e,f,m},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && Not[LtQ[m,-1/2]]
```

4.  $\int \sec[e+fx]^3 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 = 0$

**1:**  $\int \sec[e+fx]^3 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -\frac{1}{2}$

Derivation: ???

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -\frac{1}{2}$ , then

$$\int \sec[e+fx]^3 (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow -\frac{b \tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m}{a f (2m+1)} - \frac{1}{a^2 (2m+1)} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1} (a m - b (2m+1) \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_*x_]^3*(a_+b_*csc[e_+f_*x_]^m_,x_Symbol] :=
  b*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m/(a*f*(2*m+1)) -
  1/(a^2*(2*m+1))*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(a*m-b*(2*m+1)*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1/2]
```

**2:**  $\int \sec[e+fx]^3 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \nless -\frac{1}{2}$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1b with  $A \rightarrow a^2$ ,  $B \rightarrow 2 a b$ ,  $C \rightarrow b^2$ ,  $m \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \nless -\frac{1}{2}$ , then

$$\int \sec[e+fx]^3 (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow$$

$$\frac{\tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1}}{b f (m+2)} + \frac{1}{b (m+2)} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m (b (m+1) - a \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_.*x_]^3*(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_] )^m_,x_Symbol] :=
  -Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)/(b*f*(m+2)) +
  1/(b*(m+2))*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m*(b*(m+1)-a*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f,m},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && Not[LtQ[m,-1/2]]
```

$$5. \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

$$1. \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 0$$

$$1. \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

$$1: \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge \frac{ad}{b} > 0$$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge \frac{ad}{b} > 0$ , then

$$\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} = \frac{2a}{bf} \sqrt{\frac{ad}{b}} \text{Subst}\left[\frac{1}{\sqrt{1+\frac{x^2}{a}}}, x, \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}\right] \partial_x \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge \frac{ad}{b} > 0$ , then

$$\int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{2a}{bf} \sqrt{\frac{ad}{b}} \text{Subst}\left[\int \frac{1}{\sqrt{1+\frac{x^2}{a}}} dx, x, \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}\right]$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a+b_*csc[e_+f_*x_]]*Sqrt[d_*csc[e_+f_*x_]],x_Symbol] :=
-2*a/(b*f)*Sqrt[a*d/b]*Subst[Int[1/Sqrt[1+x^2/a],x],x,b*Cot[e+f*x]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && GtQ[a*d/b,0]
```

$$\mathbf{2:} \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge \frac{ad}{b} \neq 0$$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then

$$\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} = \frac{2bd}{f} \text{Subst}\left[\frac{1}{b-dx^2}, x, \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]}}\right] \partial_x \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]}}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge \frac{ad}{b} \neq 0$ , then

$$\int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{2bd}{f} \text{Subst}\left[\int \frac{1}{b-dx^2} dx, x, \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]}}\right]$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a_+b_.*csc[e_+f_.*x_]]*Sqrt[d_.*csc[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  -2*b*d/f*Subst[Int[1/(b-d*x^2),x],x,b*Cot[e+f*x]/(Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Sqrt[d*Csc[e+f*x]])] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && Not[GtQ[a*d/b,0]]
```

$$2: \int \sqrt{a + b \sec[e + f x]} (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 1$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1b with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $m \rightarrow \frac{1}{2}$ ,  $n \rightarrow n - 1$ ,  $p \rightarrow 0$  and algebraic simplification

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 1$ , then

$$\int \sqrt{a + b \sec[e + f x]} (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{2 b d \tan[e + f x] (d \sec[e + f x])^{n-1}}{f (2 n - 1) \sqrt{a + b \sec[e + f x]}} + \frac{2 a d (n - 1)}{b (2 n - 1)} \int \sqrt{a + b \sec[e + f x]} (d \sec[e + f x])^{n-1} dx$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a+_.*csc[e_+_.*x_]]*(d_.*csc[e_+_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -2*b*d*Cot[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^(n-1)/(f*(2*n-1)*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]) +
  2*a*d*(n-1)/(b*(2*n-1))*Int[Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*(d*Csc[e+f*x])^(n-1),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && GtQ[n,1] && IntegerQ[2*n]
```

$$2. \int \sqrt{a + b \sec[e + f x]} (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge n < 0$$

$$1: \int \frac{\sqrt{a + b \sec[e + f x]}}{\sqrt{d \sec[e + f x]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow \frac{1}{2}$ ,  $n \rightarrow -\frac{3}{2}$ ,  $p \rightarrow 0$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1c with  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $m \rightarrow -\frac{1}{2}$ ,  $n \rightarrow -\frac{3}{2}$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $b c - a d \neq 0 \wedge a^2 - b^2 = 0 \wedge c^2 - d^2 \neq 0$ , then



$$\int \frac{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}{\sqrt{d \sec[e+fx]}} dx \rightarrow \frac{2 a \tan[e+fx]}{f \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]}}$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a+b_.*csc[e_.+f_.*x_]]/Sqrt[d_.*csc[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  -2*a*Cot[e+f*x]/(f*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Sqrt[d*Csc[e+f*x]]) /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0]
```

**2:**  $\int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n < -\frac{1}{2}$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1c with  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $m \rightarrow -\frac{1}{2}$ ,  $p \rightarrow 0$  and algebraic simplification

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n < -\frac{1}{2}$ , then

$$\int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \rightarrow$$

$$-\frac{a \tan[e+fx] (d \sec[e+fx])^n}{f n \sqrt{a+b \sec[e+fx]}} + \frac{a (2n+1)}{2 b d n} \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^{n+1} dx$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a+b_.*csc[e_.+f_.*x_]]*(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a*Cot[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*n*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]) +
  a*(2*n+1)/(2*b*d*n)*Int[Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*(d*Csc[e+f*x])^(n+1),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && LtQ[n,-1/2] && IntegerQ[2*n]
```

**3:**  $\int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0$

Derivation: Piecewise constant extraction and integration by substitution

Basis: If  $a^2 - b^2 == 0$ , then  $\partial_x \frac{\tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{a-b \sec[e+fx]}} == 0$

Basis: If  $a^2 - b^2 == 0$ , then  $-\frac{a^2 \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{a-b \sec[e+fx]}} \frac{\tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{a-b \sec[e+fx]}} == 1$

Basis:  $\tan[e+fx] F[\sec[e+fx]] == \frac{1}{f} \text{Subst}\left[\frac{F[x]}{x}, x, \sec[e+fx]\right] \partial_x \sec[e+fx]$

Rule: If  $a^2 - b^2 == 0$ , then

$$\int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \rightarrow -\frac{a^2 \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{a-b \sec[e+fx]}} \int \frac{\tan[e+fx] (d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a-b \sec[e+fx]}} dx$$

$$\rightarrow -\frac{a^2 d \tan[e+fx]}{f \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{a-b \sec[e+fx]}} \text{Subst}\left[\int \frac{(dx)^{n-1}}{\sqrt{a-bx}} dx, x, \sec[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a+_.*csc[e_+f_.*x_]]*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a^2*d*Cot[e+f*x]/(f*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Sqrt[a-b*Csc[e+f*x]])*Subst[Int[(d*x)^(n-1)/Sqrt[a-b*x],x],x,Csc[e+f*x]] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0]
```

6.  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m + n = 0 \wedge 2m \in \mathbb{Z}$

1.  $\int \frac{\sqrt{d \sec[e + f x]}}{\sqrt{a + b \sec[e + f x]}} dx$  when  $a^2 - b^2 = 0$

1:  $\int \frac{\sqrt{d \sec[e + f x]}}{\sqrt{a + b \sec[e + f x]}} dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge d = \frac{a}{b} \wedge a > 0$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge d = \frac{a}{b} \wedge a > 0$ , then  $\frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} = \frac{\sqrt{2} \sqrt{a}}{b f} \text{Subst}\left[\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, x, \frac{b \tan[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]}\right] \partial_x \frac{b \tan[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]}$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge d = \frac{a}{b} \wedge a > 0$ , then

$$\int \frac{\sqrt{d \sec[e + f x]}}{\sqrt{a + b \sec[e + f x]}} dx \rightarrow \frac{\sqrt{2} \sqrt{a}}{b f} \text{Subst}\left[\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx, x, \frac{b \tan[e + f x]}{a + b \sec[e + f x]}\right]$$

Program code:

```
Int[Sqrt[d_.*csc[e_+f_.*x_]]/Sqrt[a_+b_.*csc[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  -Sqrt[2]*Sqrt[a]/(b*f)*Subst[Int[1/Sqrt[1+x^2],x],x,b*Cot[e+f*x]/(a+b*Csc[e+f*x])] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && EqQ[d-a/b,0] && GtQ[a,0]
```

**2:**  $\int \frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx$  when  $a^2 - b^2 = 0$

Derivation: Integration by substitution

Basis: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then  $\frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} = \frac{2bd}{af} \text{Subst}\left[\frac{1}{2b-dx^2}, x, \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]}}\right] \partial_x \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]}}$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then

$$\int \frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow \frac{2bd}{af} \text{Subst}\left[\int \frac{1}{2b-dx^2} dx, x, \frac{b \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]}}\right]$$

Program code:

```
Int[Sqrt[d_.*csc[e_+f_.*x_]]/Sqrt[a_+b_.*csc[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  -2*b*d/(a*f)*Subst[Int[1/(2*b-d*x^2),x],x,b*Cot[e+f*x]/(Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Sqrt[d*Csc[e+f*x]])] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0]
```

**2:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m + n = 0 \wedge m > \frac{1}{2}$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow -n - 1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m + n = 0 \wedge m > \frac{1}{2}$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{a \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m-1} (d \sec[e + f x])^n}{f m} + \frac{b (2m-1)}{d m} \int (a + b \sec[e + f x])^{m-1} (d \sec[e + f x])^{n+1} dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_*csc[e_+f_*x_])^m_*(d_*csc[e_+f_*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -a*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-1)*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*m) +
  b*(2*m-1)/(d*m)*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m-1)*(d*Csc[e+f*x])^(n+1),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && EqQ[m+n,0] && GtQ[m,1/2] && IntegerQ[2*m]
```

**3:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m + n = 0 \wedge m < -\frac{1}{2}$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2b with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $n \rightarrow -m - 2$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m + n = 0 \wedge m < -\frac{1}{2}$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow -\frac{b d \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^{n-1}}{a f (2m+1)} + \frac{d (m+1)}{b (2m+1)} \int (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^{n-1} dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  b*d*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^(n-1)/(a*f*(2*m+1)) +
  d*(m+1)/(b*(2*m+1))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-1),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && EqQ[m+n,0] && LtQ[m,-1/2] && IntegerQ[2*m]
```

$$7. \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m + n + 1 = 0$$

$$1: \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m + n + 1 = 0 \wedge m < -\frac{1}{2}$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow -m - 2$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m + n + 1 = 0 \wedge m < -\frac{1}{2}$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{\tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n}{f (2m + 1)} + \frac{m}{a (2m + 1)} \int (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^n dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*(2*m+1)) +
  m/(a*(2*m+1))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^n,x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && EqQ[m+n+1,0] && LtQ[m,-1/2]
```

**2:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m + n + 1 = 0 \wedge m \neq -\frac{1}{2}$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1c with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow -n - 2$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m + n + 1 = 0 \wedge m \neq -\frac{1}{2}$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{\tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n}{f (m + 1)} + \frac{a m}{b d (m + 1)} \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^{n+1} dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*(m+1)) +
  a*m/(b*d*(m+1))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^(n+1),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && EqQ[m+n+1,0] && Not[LtQ[m,-1/2]]
```



$$8. \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m > 1$$

$$1: \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m > 1 \wedge n < -1$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $m \rightarrow m - 1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m > 1 \wedge n < -1$ , then

$$\begin{aligned} & \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \\ & - \frac{b^2 \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m-2} (d \sec[e + f x])^n}{f n} - \\ & \frac{a}{d n} \int (a + b \sec[e + f x])^{m-2} (d \sec[e + f x])^{n+1} (b (m - 2n - 2) - a (m + 2n - 1) \sec[e + f x]) dx \end{aligned}$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  b^2*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-2)*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*n) -
  a/(d*n)*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m-2)*(d*Csc[e+f*x])^(n+1)*(b*(m-2*n-2)-a*(m+2*n-1)*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && GtQ[m,1] && (LtQ[n,-1] || EqQ[m,3/2] && EqQ[n,-1/2]) && IntegerQ[2*m]
```

$$\mathbf{2:} \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m > 1 \wedge n \neq -1 \wedge m + n - 1 \neq 0$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1b with  $A \rightarrow a$ ,  $B \rightarrow b$ ,  $m \rightarrow m - 1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m > 1 \wedge n \neq -1 \wedge m + n - 1 \neq 0$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{b^2 \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m-2} (d \sec[e + f x])^n}{f (m + n - 1)} + \frac{b}{m + n - 1} \int (a + b \sec[e + f x])^{m-2} (d \sec[e + f x])^n (b (m + 2n - 1) + a (3m + 2n - 4) \sec[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -b^2*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-2)*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*(m+n-1)) +
  b/(m+n-1)*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m-2)*(d*Csc[e+f*x])^n*(b*(m+2*n-1)+a*(3*m+2*n-4)*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && GtQ[m,1] && NeQ[m+n-1,0] && IntegerQ[2*m]
```

$$9. \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -1$$

$$1. \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -1 \wedge n > 1$$

$$\mathbf{1:} \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -1 \wedge 1 < n < 2$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -1 \wedge 1 < n < 2$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow - \frac{b d \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^{n-1}}{a f (2m + 1)}$$

$$\frac{d}{a b (2 m + 1)} \int (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^{n-1} (a (n - 1) - b (m + n) \sec[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  b*d*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^(n-1)/(a*f*(2*m+1)) -
  d/(a*b*(2*m+1))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-1)*(a*(n-1)-b*(m+n)*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1] && LtQ[1,n,2] && (IntegersQ[2*m,2*n] || IntegerQ[m])
```

**2:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -1 \wedge n > 2$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $n \rightarrow n - 1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -1 \wedge n > 2$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{d^2 \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^{n-2}}{f (2 m + 1)} + \frac{d^2}{a b (2 m + 1)} \int (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^{n-2} (b (n - 2) + a (m - n + 2) \sec[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -d^2*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)/(f*(2*m+1)) +
  d^2/(a*b*(2*m+1))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)*(b*(n-2)+a*(m-n+2)*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1] && GtQ[n,2] && (IntegersQ[2*m,2*n] || IntegerQ[m])
```

**2:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -1 \wedge n \neq 0$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m < -1 \wedge n \neq 0$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{\tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n}{f (2m + 1)} + \frac{1}{a^2 (2m + 1)} \int (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^n (a (2m + n + 1) - b (m + n + 1) \sec[e + f x]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*(2*m+1)) +
  1/(a^2*(2*m+1))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^n*(a*(2*m+n+1)-b*(m+n+1)*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1] && (IntegersQ[2*m,2*n] || IntegerQ[m])
```

$$10. \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

$$1: \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 1$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $m \rightarrow -1$ ,  $n \rightarrow n-1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 1$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow -\frac{d^2 \tan[e+fx] (d \sec[e+fx])^{n-2}}{f (a+b \sec[e+fx])} - \frac{d^2}{ab} \int (d \sec[e+fx])^{n-2} (b(n-2) - a(n-1) \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n/(a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  d^2*Cot[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)/(f*(a+b*Csc[e+f*x])) -
  d^2/(a*b)*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n-2)*(b*(n-2)-a*(n-1)*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && GtQ[n,1]
```

2:  $\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n < 0$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow -1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n < 0$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow -\frac{\tan[e+fx] (d \sec[e+fx])^n}{f (a+b \sec[e+fx])} - \frac{1}{a^2} \int (d \sec[e+fx])^n (a(n-1) - b n \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n/(a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  Cot[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*(a+b*Csc[e+f*x])) -
  1/a^2*Int[(d*Csc[e+f*x])^n*(a*(n-1)-b*n*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && LtQ[n,0]
```

$$3: \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow -1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{b d \tan[e+fx] (d \sec[e+fx])^{n-1}}{a f (a+b \sec[e+fx])} + \frac{d (n-1)}{a b} \int (d \sec[e+fx])^{n-1} (a-b \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[(d_*csc[e_+f_*x_])^n/(a_+b_*csc[e_+f_*x_]),x_Symbol] :=
  -b*d*Cot[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^(n-1)/(a*f*(a+b*Csc[e+f*x])) +
  d*(n-1)/(a*b)*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n-1)*(a-b*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0]
```

$$11. \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

$$1. \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 1$$

$$1: \int \frac{(d \sec[e+fx])^{3/2}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \frac{dz}{\sqrt{a+bz}} = \frac{d\sqrt{a+bz}}{b} - \frac{a d}{b\sqrt{a+bz}}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^{3/2}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow \frac{d}{b} \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} dx - \frac{a d}{b} \int \frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^(3/2)/Sqrt[a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  d/b*Int[Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Sqrt[d*Csc[e+f*x]],x] -
  a*d/b*Int[Sqrt[d*Csc[e+f*x]]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0]
```

**2:**  $\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 2$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2c with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $m \rightarrow \frac{1}{2}$ ,  $n \rightarrow n-1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 2$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow \frac{2 d^2 \tan[e+fx] (d \sec[e+fx])^{n-2}}{f (2n-3) \sqrt{a+b \sec[e+fx]}} + \frac{d^2}{b (2n-3)} \int \frac{(d \sec[e+fx])^{n-2} (2b(n-2) - a \sec[e+fx])}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_/Sqrt[a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  -2*d^2*Cot[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)/(f*(2*n-3)*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]) +
  d^2/(b*(2*n-3))*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n-2)*(2*b*(n-2)-a*Csc[e+f*x])/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && GtQ[n,2] && IntegerQ[2*n]
```



$$2: \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge n < 0$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 1c with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n < 0$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow -\frac{\tan[e+fx] (d \sec[e+fx])^n}{f n \sqrt{a+b \sec[e+fx]}} + \frac{1}{2 b d n} \int \frac{(d \sec[e+fx])^{n+1} (a+b (2n+1) \sec[e+fx])}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_/Sqrt[a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  Cot[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*n*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]) +
  1/(2*b*d*n)*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n+1)*(a+b*(2*n+1)*Csc[e+f*x])/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && LtQ[n,0] && IntegerQ[2*n]
```

$$12: \int (a+b \sec[e+fx])^m (d \sec[e+fx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 2 \wedge m+n-1 \neq 0$$

Derivation: Singly degenerate secant recurrence 2c with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $n \rightarrow n-1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge n > 2 \wedge m+n-1 \neq 0$ , then

$$\int (a+b \sec[e+fx])^m (d \sec[e+fx])^n dx \rightarrow \frac{d^2 \tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m (d \sec[e+fx])^{n-2}}{f (m+n-1)} + \frac{d^2}{b (m+n-1)} \int (a+b \sec[e+fx])^m (d \sec[e+fx])^{n-2} (b (n-2) + a m \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -d^2*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)/(f*(m+n-1)) +
  d^2/(b*(m+n-1))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)*(b*(n-2)+a*m*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && GtQ[n,2] && NeQ[m+n-1,0] && IntegerQ[n]
```

13.  $\int (a + b \sin[e + f x])^m (d \sin[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \notin \mathbb{Z} \wedge a > 0$

1:  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \notin \mathbb{Z} \wedge a > 0 \wedge n \notin \mathbb{Z} \wedge \frac{ad}{b} > 0$

Derivation: Piecewise constant extraction and integration by substitution

Basis: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then  $\partial_x \frac{\tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} = 0$

Basis: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then  $-\frac{a^2 \tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} \frac{\tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} = 1$

Basis: If  $a > 0$ , then  $\frac{\tan[e + f x] (a+b \sec[e + f x])^{m-\frac{1}{2}} (\frac{b}{a} \sec[e + f x])^n}{\sqrt{a-b \sec[e + f x]}} =$   
 $-\frac{1}{a^n f} \text{Subst} \left[ \frac{(a-x)^{n-1} (2a-x)^{m-\frac{1}{2}}}{\sqrt{x}}, x, a - b \sec[e + f x] \right] \partial_x (a - b \sec[e + f x])$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \notin \mathbb{Z} \wedge a > 0 \wedge n \notin \mathbb{Z} \wedge \frac{ad}{b} > 0$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow$$

$$-\frac{a^2 \left(\frac{ad}{b}\right)^n \tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} \int \frac{\tan[e + f x] (a+b \sec[e + f x])^{m-\frac{1}{2}} \left(\frac{b}{a} \sec[e + f x]\right)^n}{\sqrt{a-b \sec[e + f x]}} dx \rightarrow$$

$$\frac{\left(\frac{ad}{b}\right)^n \tan[e + f x]}{a^{n-2} f \sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} \text{Subst} \left[ \int \frac{(a-x)^{n-1} (2a-x)^{m-\frac{1}{2}}}{\sqrt{x}} dx, x, a - b \sec[e + f x] \right]$$

Program code:

```

Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -(a*d/b)^n*Cot[e+f*x]/(a^(n-2)*f*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Sqrt[a-b*Csc[e+f*x]])*
    Subst[Int[(a-x)^(n-1)*(2*a-x)^(m-1/2)/Sqrt[x],x],x,a-b*Csc[e+f*x]] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && Not[IntegerQ[m]] && GtQ[a,0] && Not[IntegerQ[n]] && GtQ[a*d/b,0]

```

$$\mathbf{2:} \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 = 0 \wedge m \notin \mathbb{Z} \wedge a > 0 \wedge n \notin \mathbb{Z} \wedge \frac{ad}{b} < 0$$

Derivation: Piecewise constant extraction and integration by substitution

$$\text{Basis: If } a^2 - b^2 = 0, \text{ then } \partial_x \frac{\tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} = 0$$

$$\text{Basis: If } a^2 - b^2 = 0, \text{ then } - \frac{a^2 \tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} \frac{\tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{Basis: If } a > 0, \text{ then } & \frac{\tan[e + f x] (a+b \sec[e + f x])^{m-\frac{1}{2}} (-\frac{b}{a} \sec[e + f x])^n}{\sqrt{a-b \sec[e + f x]}} = \\ & - \frac{1}{a^n f} \text{Subst} \left[ \frac{x^{m-\frac{1}{2}} (a-x)^{n-1}}{\sqrt{2a-x}}, x, a + b \sec[e + f x] \right] \partial_x (a + b \sec[e + f x]) \end{aligned}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \notin \mathbb{Z} \wedge a > 0 \wedge n \notin \mathbb{Z} \wedge \frac{ad}{b} < 0$ , then

$$\begin{aligned} & \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \\ & - \frac{a^2 \left(-\frac{ad}{b}\right)^n \tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} \int \frac{\tan[e + f x] (a+b \sec[e + f x])^{m-\frac{1}{2}} (-\frac{b}{a} \sec[e + f x])^n}{\sqrt{a-b \sec[e + f x]}} dx \rightarrow \\ & \frac{\left(-\frac{ad}{b}\right)^n \tan[e + f x]}{a^{n-1} f \sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} \text{Subst} \left[ \int \frac{x^{m-\frac{1}{2}} (a-x)^{n-1}}{\sqrt{2a-x}} dx, x, a + b \sec[e + f x] \right] \end{aligned}$$

Program code:

```
Int[(a+b_*csc[e+_+f_*x_])^m*(d_*csc[e+_+f_*x_])^n,x_Symbol] :=
-(-a*d/b)^n*Cot[e+f*x]/(a^(n-1)*f*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Sqrt[a-b*Csc[e+f*x]])*
Subst[Int[x^(m-1/2)*(a-x)^(n-1)/Sqrt[2*a-x],x],x,a+b*Csc[e+f*x]] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && Not[IntegerQ[m]] && GtQ[a,0] && Not[IntegerQ[n]] && LtQ[a*d/b,0]
```

**3:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \notin \mathbb{Z} \wedge a > 0$

Derivation: Piecewise constant extraction and integration by substitution

Basis: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then  $\partial_x \frac{\tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} = 0$

Basis: If  $a^2 - b^2 = 0$ , then  $-\frac{a^2 \tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} \frac{\tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} = 1$

Basis:  $\tan[e + f x] F[\sec[e + f x]] = \frac{1}{f} \text{Subst}\left[\frac{F[x]}{x}, x, \sec[e + f x]\right] \partial_x \sec[e + f x]$

Note: If  $a > 0$ , then  $\frac{(dx)^{n-1} (a+bx)^{m-\frac{1}{2}}}{\sqrt{a-bx}}$  is integrable without the need for additional piecewise constant factors.

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \notin \mathbb{Z} \wedge a > 0$ , then

$$\begin{aligned} & \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \\ & -\frac{a^2 \tan[e + f x]}{\sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} \int \frac{\tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m-\frac{1}{2}} (d \sec[e + f x])^n}{\sqrt{a-b \sec[e + f x]}} dx \rightarrow \\ & -\frac{a^2 d \tan[e + f x]}{f \sqrt{a+b \sec[e + f x]} \sqrt{a-b \sec[e + f x]}} \text{Subst}\left[\int \frac{(dx)^{n-1} (a+bx)^{m-\frac{1}{2}}}{\sqrt{a-bx}} dx, x, \sec[e + f x]\right] \end{aligned}$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*csc[e_.+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a^2*d*Cot[e+f*x]/(f*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Sqrt[a-b*Csc[e+f*x]])*
  Subst[Int[(d*x)^(n-1)*(a+b*x)^(m-1/2)/Sqrt[a-b*x],x],x,Csc[e+f*x]] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && Not[IntegerQ[m]] && GtQ[a,0]
```

**14:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \notin \mathbb{Z} \wedge a \neq 0$

Derivation: Piecewise constant extraction

Basis: If  $\partial_x \frac{(a+b \sec[e+fx])^m}{(1+\frac{b}{a} \sec[e+fx])^m} = 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 = 0 \wedge m \notin \mathbb{Z} \wedge n \notin \mathbb{Z} \wedge \frac{ad}{b} > 0 \wedge a \neq 0$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{a^{\text{IntPart}[m]} (a + b \sec[e + f x])^{\text{FracPart}[m]}}{(1 + \frac{b}{a} \sec[e + f x])^{\text{FracPart}[m]}} \int \left(1 + \frac{b}{a} \sec[e + f x]\right)^m (d \sec[e + f x])^n dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_.,x_Symbol] :=
  a^IntPart[m]*(a+b*Csc[e+f*x])^FracPart[m]/(1+b/a*Csc[e+f*x])^FracPart[m]*Int[(1+b/a*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^n,x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m,n},x] && EqQ[a^2-b^2,0] && Not[IntegerQ[m]] && Not[GtQ[a,0]]
```

6.  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

1.  $\int \sec[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^m dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

1.  $\int \sec[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^m dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m > 0$

**1:**  $\int \sec[e + f x] \sqrt{a + b \sec[e + f x]} dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $\sqrt{a + b z} = \frac{a-b}{\sqrt{a+b z}} + \frac{b(1+z)}{\sqrt{a+b z}}$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \sec[e+fx] \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \, dx \rightarrow (a-b) \int \frac{\sec[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} \, dx + b \int \frac{\sec[e+fx] (1+\sec[e+fx])}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} \, dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.*x_]*Sqrt[a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  (a-b)*Int[Csc[e+f*x]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] + b*Int[Csc[e+f*x]*(1+Csc[e+f*x])/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

**2:**  $\int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m \, dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m > 1$

Derivation: Cosecant recurrence 1b with  $c \rightarrow a \, c$ ,  $d \rightarrow b \, c + a \, d$ ,  $C \rightarrow b \, d$ ,  $m \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow n - 1$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m > 1$ , then

$$\frac{\int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m \, dx}{f \, m} \rightarrow \frac{b \tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m-1}}{f \, m} + \frac{1}{m} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m-2} (b^2 (m-1) + a^2 m + a \, b (2m-1) \sec[e+fx]) \, dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.*x_]*(a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_])^m_,x_Symbol] :=
  -b*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-1)/(f*m) +
  1/m*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-2)*(b^2*(m-1)+a^2*m+a*b*(2*m-1)*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && GtQ[m,1] && IntegerQ[2*m]
```

**2.**  $\int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m \, dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < 0$

**1.**  $\int \frac{\sec[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]} \, dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

$$\text{Rule: } \int \frac{\sec[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Integration by substitution

$$\text{Basis: } \frac{\sec[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]} \Rightarrow \frac{2}{f} \text{Subst} \left[ \frac{1}{a+b-(a-b)x^2}, x, \frac{\tan[e+fx]}{1+\sec[e+fx]} \right] \partial_x \frac{\tan[e+fx]}{1+\sec[e+fx]}$$

Rule: This rule may be preferable to the following one, but will require numerous changes to the test suite.

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{\sec[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{2}{f} \text{Subst} \left[ \int \frac{1}{a+b-(a-b)x^2} dx, x, \frac{\tan[e+fx]}{1+\sec[e+fx]} \right]$$

Program code:

```
(* Int[csc[e_.+f_.**x_]/(a+b_.*csc[e_.+f_.**x_]),x_Symbol] :=
  -2/f*Subst[Int[1/(a+b-(a-b)**x^2),x],x,Cot[e+f*x]/(1+Csc[e+f*x])] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] *)
```



$$\text{1: } \int \frac{\sec[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic simplification

$$\text{Basis: } \frac{z}{a+bz} = \frac{1}{b \left(1 + \frac{a}{b} z^{-1}\right)}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{\sec[e+fx]}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{1}{b} \int \frac{1}{1 + \frac{a}{b} \cos[e+fx]} dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.*x_]/(a_.+b_.*csc[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  1/b*Int[1/(1+a/b*Sin[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

$$\text{2: } \int \frac{\sec[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Piecewise constant extraction and integration by substitution

$$\text{Basis: } \partial_x \left( \frac{1}{\tan[e+fx]} \sqrt{\frac{b(1-\sec[e+fx])}{a+b}} \sqrt{-\frac{b(1+\sec[e+fx])}{a-b}} \right) = 0$$

$$\text{Basis: } \sec[e+fx] \tan[e+fx] F[\sec[e+fx]] = \frac{1}{f} \text{Subst}[F[x], x, \sec[e+fx]] \partial_x \sec[e+fx]$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sec[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx &\rightarrow \frac{1}{\tan[e+fx]} \sqrt{\frac{b(1-\sec[e+fx])}{a+b}} \sqrt{-\frac{b(1+\sec[e+fx])}{a-b}} \int \frac{\sec[e+fx] \tan[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{\frac{b}{a+b} - \frac{b \sec[e+fx]}{a+b}} \sqrt{-\frac{b}{a-b} - \frac{b \sec[e+fx]}{a-b}}} dx \\
&\rightarrow \frac{1}{f \tan[e+fx]} \sqrt{\frac{b(1-\sec[e+fx])}{a+b}} \sqrt{-\frac{b(1+\sec[e+fx])}{a-b}} \text{Subst}\left[\int \frac{1}{\sqrt{a+bx} \sqrt{\frac{b}{a+b} - \frac{bx}{a+b}} \sqrt{-\frac{b}{a-b} - \frac{bx}{a-b}}} dx, x, \sec[e+fx]\right] \\
&\rightarrow \frac{2\sqrt{a+b}}{b f \tan[e+fx]} \sqrt{\frac{b(1-\sec[e+fx])}{a+b}} \sqrt{-\frac{b(1+\sec[e+fx])}{a-b}} \text{EllipticF}\left[\text{ArcSin}\left[\frac{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}{\sqrt{a+b}}\right], \frac{a+b}{a-b}\right]
\end{aligned}$$

Program code:

```

Int[csc[e_+f_.*x_]/Sqrt[a_+b_.*csc[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
-2*Rt[a+b,2]/(b*f*Cot[e+f*x])*Sqrt[(b*(1-Csc[e+f*x]))/(a+b)]*Sqrt[-b*(1+Csc[e+f*x])/(a-b)]*
EllipticF[ArcSin[Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]/Rt[a+b,2]],(a+b)/(a-b)] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]

```

$$\mathbf{3:} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1$$

Derivation: Cosecant recurrence 2b with  $C \rightarrow 0$ ,  $m \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1$ , then

$$\frac{\int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx}{f(m+1)(a^2-b^2)} + \frac{1}{(m+1)(a^2-b^2)} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1} (a(m+1) - b(m+2) \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.**x_]*(a_.+b_.*csc[e_.+f_.**x_])^m_,x_Symbol] :=
  -b*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)/(f*(m+1)*(a^2-b^2)) +
  1/((m+1)*(a^2-b^2))*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(a*(m+1)-b*(m+2)*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1] && IntegerQ[2*m]
```

$$\mathbf{3:} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge 2m \notin \mathbb{Z}$$

Derivation: Piecewise constant extraction and integration by substitution

$$\text{Basis: } \partial_x \frac{\tan[e+fx]}{\sqrt{1+\sec[e+fx]} \sqrt{1-\sec[e+fx]}} = 0$$

$$\text{Basis: } -\frac{\tan[e+fx]}{\sqrt{1+\sec[e+fx]} \sqrt{1-\sec[e+fx]}} \frac{\tan[e+fx]}{\sqrt{1+\sec[e+fx]} \sqrt{1-\sec[e+fx]}} = 1$$

$$\text{Basis: } \tan[e+fx] F[\sec[e+fx]] = \frac{1}{f} \text{Subst}\left[\frac{F[x]}{x}, x, \sec[e+fx]\right] \partial_x \sec[e+fx]$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge 2m \notin \mathbb{Z}$ , then

$$\int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow -\frac{\tan[e+fx]}{\sqrt{1+\sec[e+fx]} \sqrt{1-\sec[e+fx]}} \int \frac{\tan[e+fx] \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m}{\sqrt{1+\sec[e+fx]} \sqrt{1-\sec[e+fx]}} dx$$

$$\rightarrow -\frac{\tan[e+fx]}{f \sqrt{1+\sec[e+fx]} \sqrt{1-\sec[e+fx]}} \text{Subst}\left[\int \frac{(a+bx)^m}{\sqrt{1+x} \sqrt{1-x}} dx, x, \sec[e+fx]\right]$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.*x_] *(a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_])^m_, x_Symbol] :=
  Cot[e+f*x]/(f*Sqrt[1+Csc[e+f*x]]*Sqrt[1-Csc[e+f*x]])*Subst[Int[(a+b*x)^m/(Sqrt[1+x]*Sqrt[1-x]), x], x, Csc[e+f*x]] /;
FreeQ[{a,b,e,f,m}, x] && NeQ[a^2-b^2, 0] && Not[IntegerQ[2*m]]
```

2.  $\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

1:  $\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m > 0$

Reference: G&R 2.551.1 inverted

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1b with  $A \rightarrow a c$ ,  $B \rightarrow b c + a d$ ,  $C \rightarrow b d$ ,  $m \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow n - 1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m > 0$ , then

$$\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow \frac{\tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m}{f (m+1)} + \frac{m}{m+1} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m-1} (b+a \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_.+f_.*x_]^2*(a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_])^m_, x_Symbol] :=
  -Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m/(f*(m+1)) +
  m/(m+1)*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-1)*(b+a*Csc[e+f*x]), x] /;
FreeQ[{a,b,e,f}, x] && NeQ[a^2-b^2, 0] && GtQ[m, 0]
```

**2:**  $\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1$

Reference: G&R 2.551.1

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1$ , then

$$\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow$$

$$-\frac{a \tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1}}{f (m+1) (a^2 - b^2)} - \frac{1}{(m+1) (a^2 - b^2)} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1} (b (m+1) - a (m+2) \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_*x_]^2*(a_+b_*csc[e_+f_*x_])^m_,x_Symbol] :=
  a*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)/(f*(m+1)*(a^2-b^2)) -
  1/((m+1)*(a^2-b^2))*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(b*(m+1)-a*(m+2)*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1]
```

**3:** 
$$\int \frac{\sec[e+fx]^2}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{\sec[e+fx]^2}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow - \int \frac{\sec[e+fx]}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx + \int \frac{\sec[e+fx] (1 + \sec[e+fx])}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_*x_]^2/Sqrt[a_+b_*csc[e_+f_*x_]],x_Symbol] :=
  -Int[Csc[e+f*x]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] +
  Int[Csc[e+f*x]*(1+Csc[e+f*x])/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

**4:**  $\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $z^2 == -\frac{az}{b} + \frac{1}{b} z (a+bz)$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \sec[e+fx]^2 (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow -\frac{a}{b} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m dx + \frac{1}{b} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1} dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_.*x_]^2*(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_,x_Symbol] :=
  -a/b*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m,x] + 1/b*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f,m},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

$$3. \int \sec[e+fx]^3 (a+b \sec[e+fx])^m dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

$$1: \int \sec[e+fx]^3 (a+b \sec[e+fx])^m dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1$$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow c^2$ ,  $B \rightarrow 2cd$ ,  $C \rightarrow d^2$ ,  $n \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1$ , then

$$\int \sec[e+fx]^3 (a+b \sec[e+fx])^m dx \rightarrow \frac{a^2 \tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1}}{b f (m+1) (a^2 - b^2)} + \frac{1}{b (m+1) (a^2 - b^2)} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1} (a b (m+1) - (a^2 + b^2 (m+1)) \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_.*x_]^3*(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_]^m,x_Symbol] :=
  -a^2*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)/(b*f*(m+1)*(a^2-b^2)) +
  1/(b*(m+1)*(a^2-b^2))*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*Simp[a*b*(m+1)-(a^2+b^2*(m+1))*Csc[e+f*x],x],x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1]
```



**2:**  $\int \sec[e+fx]^3 (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m \neq -1$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1b with  $A \rightarrow a^2$ ,  $B \rightarrow 2ab$ ,  $C \rightarrow b^2$ ,  $m \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m \neq -1$ , then

$$\frac{\int \sec[e+fx]^3 (a+b \sec[e+fx])^m dx}{b f (m+2)} + \frac{1}{b (m+2)} \int \sec[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^m (b (m+1) - a \sec[e+fx]) dx$$

Program code:

```
Int[csc[e_+f_*x_]^3*(a_+b_*csc[e_+f_*x_]^m,x_Symbol] :=
  -Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)/(b*f*(m+2)) +
  1/(b*(m+2))*Int[Csc[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m*(b*(m+1)-a*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,e,f,m},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && Not[LtQ[m,-1]]
```

4.  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m > 2$

1:  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m > 2 \wedge n < -1$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow c^2$ ,  $B \rightarrow 2 c d$ ,  $C \rightarrow d^2$ ,  $n \rightarrow n - 2$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m > 2 \wedge n < -1$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow$$

$$- \frac{a^2 \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m-2} (d \sec[e + f x])^n}{f n} -$$

$$\frac{1}{d n} \int (a + b \sec[e + f x])^{m-3} (d \sec[e + f x])^{n+1} (a^2 b (m-2n-2) - a (3b^2 n + a^2 (n+1)) \sec[e + f x] - b (b^2 n + a^2 (m+n-1)) \sec[e + f x]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*csc[e_.+f_.*x_])^m*(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n,x_Symbol] :=
  a^2*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-2)*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*n) -
  1/(d*n)*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m-3)*(d*Csc[e+f*x])^(n+1)*
    Simp[a^2*b*(m-2*n-2)-a*(3*b^2*n+a^2*(n+1))*Csc[e+f*x]-b*(b^2*n+a^2*(m+n-1))*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && GtQ[m,2] && (IntegerQ[m] && LtQ[n,-1] || IntegersQ[m+1/2,2*n] && LeQ[n,-1])
```

2:  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m > 2 \wedge n \nless -1$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1b with  $A \rightarrow a^2$ ,  $B \rightarrow 2 a b$ ,  $C \rightarrow b^2$ ,  $m \rightarrow m - 2$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m > 2 \wedge n \nless -1$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow$$

$$\frac{b^2 \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m-2} (d \sec[e + f x])^n}{f (m+n-1)} +$$

$$\frac{1}{m+n-1} \int (a+b \sec[e+fx])^{m-3} (d \sec[e+fx])^n \cdot \\ (a^3 (m+n-1) + a b^2 n + b (b^2 (m+n-2) + 3 a^2 (m+n-1)) \sec[e+fx] + a b^2 (3m+2n-4) \sec[e+fx]^2) dx$$

### Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -b^2*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-2)*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*(m+n-1)) +
  1/(d*(m+n-1))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m-3)*(d*Csc[e+f*x])^n*
    Simp[a^3*d*(m+n-1)+a*b^2*d*n+b*(b^2*d*(m+n-2)+3*a^2*d*(m+n-1))*Csc[e+f*x]+a*b^2*d*(3*m+2*n-4)*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && GtQ[m,2] && (IntegerQ[m] || IntegersQ[2*m,2*n]) && Not[IGtQ[n,2] && Not[IntegerQ[m]]]
```

5.  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1$

1.  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge n > 0$

**1:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge 0 < n < 1$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1c with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow n - 1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge 0 < n < 1$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{b d \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^{n-1}}{f (m+1) (a^2 - b^2)} + \frac{1}{(m+1) (a^2 - b^2)} \int (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^{n-1} (b d (n-1) + a d (m+1) \sec[e + f x] - b d (m+n+1) \sec[e + f x]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -b*d*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-1)/(f*(m+1)*(a^2-b^2)) +
  1/(f*(m+1)*(a^2-b^2))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-1)*
    Simp[b*d*(n-1)+a*d*(m+1)*Csc[e+f*x]-b*d*(m+n+1)*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1] && LtQ[0,n,1] && IntegersQ[2*m,2*n]
```

**2:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge 1 < n < 2$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow n - 1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge 1 < n < 2$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow$$

$$-\frac{a d^2 \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^{n-2}}{f (m+1) (a^2 - b^2)} -$$

$$\frac{d^2}{(m+1) (a^2 - b^2)} \int (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^{n-2} (a (n-2) + b (m+1) \sec[e + f x] - a (m+n) \sec[e + f x]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  a*d^2*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)/(f*(m+1)*(a^2-b^2)) -
  d^2/((m+1)*(a^2-b^2))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)*(a*(n-2)+b*(m+1)*Csc[e+f*x]-a*(m+n)*Csc[e+f*x]^2),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1] && LtQ[1,n,2] && IntegersQ[2*m,2*n]
```

**3:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge n > 3$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow c^2$ ,  $B \rightarrow 2 c d$ ,  $C \rightarrow d^2$ ,  $n \rightarrow n - 2$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge n > 3$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow$$

$$\frac{a^2 d^3 \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^{n-3}}{b f (m+1) (a^2 - b^2)} +$$

$$\frac{d^3}{b (m+1) (a^2 - b^2)} \int (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^{n-3} (a^2 (n-3) + a b (m+1) \sec[e + f x] - (a^2 (n-2) + b^2 (m+1)) \sec[e + f x]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -a^2*d^3*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-3)/(b*f*(m+1)*(a^2-b^2)) +
  d^3/(b*(m+1)*(a^2-b^2))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-3)*
  Simp[a^2*(n-3)+a*b*(m+1)*Csc[e+f*x]-(a^2*(n-2)+b^2*(m+1))*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1] && (IGtQ[n,3] || IntegersQ[n+1/2,2*m] && GtQ[n,2])
```

$$2. \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge n \neq 0$$

$$1: \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m + \frac{1}{2} \in \mathbb{Z}^- \wedge n \in \mathbb{Z}^-$$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1c with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m + \frac{1}{2} \in \mathbb{Z}^- \wedge n \in \mathbb{Z}^-$ , then

$$\begin{aligned} & \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \\ & - \frac{\tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^n}{a f n} - \\ & \frac{1}{a d n} \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^{n+1} (b(m+n+1) - a(n+1) \sec[e + f x] - b(m+n+2) \sec[e + f x]^2) dx \end{aligned}$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*csc[e_.+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^n/(a*f*n) -
  1/(a*d*n)*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^(n+1)*
    Simp[b*(m+n+1)-a*(n+1)*Csc[e+f*x]-b*(m+n+2)*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && ILtQ[m+1/2,0] && ILtQ[n,0]
```

$$2: \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge n \neq 0$$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1c with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m < -1 \wedge n \neq 0$ , then

$$\begin{aligned} & \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \\ & - \frac{b^2 \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m+1} (d \sec[e + f x])^n}{a f (m+1) (a^2 - b^2)} + \end{aligned}$$

$$\frac{1}{a(m+1)(a^2-b^2)} \int (a+b \sec[e+fx])^{m+1} (d \sec[e+fx])^n \cdot \\ (a^2(m+1) - b^2(m+n+1) - ab(m+1) \sec[e+fx] + b^2(m+n+2) \sec[e+fx]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.*csc[e_.+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  b^2*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^n/(a*f*(m+1)*(a^2-b^2)) +
  1/(a*(m+1)*(a^2-b^2))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^n*
    (a^2*(m+1)-b^2*(m+n+1)-a*b*(m+1)*Csc[e+f*x]+b^2*(m+n+2)*Csc[e+f*x]^2),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[m,-1] && IntegersQ[2*m,2*n]
```

$$6. \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

$$1. \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 0$$

$$1: \int \frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Piecewise constant extraction

$$\text{Basis: } \partial_x \left( \sqrt{d \cos[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} \right) = 0$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{\sqrt{d \cos[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]}}{d} \int \frac{\sqrt{d \cos[e+fx]}}{b+a \cos[e+fx]} dx$$

Program code:

```
Int[Sqrt[d_.*csc[e_.+f_.*x_]]/(a_.+b_.*csc[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  Sqrt[d*Sin[e+f*x]]*Sqrt[d*Csc[e+f*x]]/d*Int[Sqrt[d*Sin[e+f*x]]/(b+a*Sin[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

$$2: \int \frac{(d \sec[e+fx])^{3/2}}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Piecewise constant extraction

$$\text{Basis: } \partial_x \left( \sqrt{d \cos[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} \right) = 0$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then



$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^{3/2}}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow d \sqrt{d \cos[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} \int \frac{1}{\sqrt{d \cos[e+fx]} (b+a \cos[e+fx])} dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^(3/2)/(a+b_.*csc[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  d*Sqrt[d*Sin[e+f*x]]*Sqrt[d*Csc[e+f*x]]*Int[1/(Sqrt[d*Sin[e+f*x]]*(b+a*Sin[e+f*x])),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

**3:**  $\int \frac{(d \sec[e+fx])^{5/2}}{a+b \sec[e+fx]} dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $\frac{dz}{a+bz} = \frac{d}{b} - \frac{a}{b(a+bz)}$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^{5/2}}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{d}{b} \int (d \sec[e+fx])^{3/2} dx - \frac{a}{b} \int \frac{(d \sec[e+fx])^{3/2}}{a+b \sec[e+fx]} dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^(5/2)/(a+b_.*csc[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  d/b*Int[(d*Csc[e+f*x])^(3/2),x] - a*d/b*Int[(d*Csc[e+f*x])^(3/2)/(a+b*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

$$4: \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 3$$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1b with  $A \rightarrow a^2$ ,  $B \rightarrow 2ab$ ,  $C \rightarrow b^2$ ,  $m \rightarrow -3$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 3$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow \frac{d^3 \tan[e+fx] (d \sec[e+fx])^{n-3}}{b f (n-2)} + \frac{d^3}{b (n-2)} \int \frac{1}{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^{n-3} (a(n-3) + b(n-3) \sec[e+fx] - a(n-2) \sec[e+fx]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n/(a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]),x_Symbol] :=
  -d^3*Cot[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^(n-3)/(b*f*(n-2)) +
  d^3/(b*(n-2))*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n-3)*Simp[a*(n-3)+b*(n-3)*Csc[e+f*x]-a*(n-2)*Csc[e+f*x]^2,x]/(a+b*Csc[e+f*x]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && GtQ[n,3]
```

$$2. \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n < 0$$

$$1: \int \frac{1}{\sqrt{d \sec[e+fx]} (a+b \sec[e+fx])} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \frac{1}{\sqrt{dz} (a+bz)} = \frac{b^2 (dz)^{3/2}}{a^2 d^2 (a+bz)} + \frac{a-bz}{a^2 \sqrt{dz}}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{1}{\sqrt{d \sec[e+fx]} (a+b \sec[e+fx])} dx \rightarrow \frac{b^2}{a^2 d^2} \int \frac{(d \sec[e+fx])^{3/2}}{a+b \sec[e+fx]} dx + \frac{1}{a^2} \int \frac{a-b \sec[e+fx]}{\sqrt{d \sec[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[1/(Sqrt[d_*csc[e_+f_*x_])*(a_+b_*csc[e_+f_*x_])],x_Symbol] :=
  b^2/(a^2*d^2)*Int[(d*Csc[e+f*x])^(3/2)/(a+b*Csc[e+f*x]),x] +
  1/a^2*Int[(a-b*Csc[e+f*x])/Sqrt[d*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

**2:**  $\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n \leq -1$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1c with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n \leq -1$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{a+b \sec[e+fx]} dx \rightarrow$$

$$-\frac{\tan[e+fx] (d \sec[e+fx])^n}{a f n} - \frac{1}{a d n} \int \frac{1}{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^{n+1} (b n - a(n+1) \sec[e+fx] - b(n+1) \sec[e+fx]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(d_*csc[e_+f_*x_])^n/(a_+b_*csc[e_+f_*x_]),x_Symbol] :=
  Cot[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^n/(a*f*n) -
  1/(a*d*n)*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n+1)/(a+b*Csc[e+f*x])*
    Simp[b*n-a*(n+1)*Csc[e+f*x]-b*(n+1)*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LeQ[n,-1] && IntegerQ[2*n]
```

$$7. \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

$$1. \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 0$$

$$1: \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \sqrt{a+bz} = \frac{a}{\sqrt{a+bz}} + \frac{bz}{\sqrt{a+bz}}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} dx \rightarrow a \int \frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx + \frac{b}{d} \int \frac{(d \sec[e+fx])^{3/2}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a_+b_.*csc[e_+f_.*x_]]*Sqrt[d_.*csc[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  a*Int[Sqrt[d*Csc[e+f*x]]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] +
  b/d*Int[(d*Csc[e+f*x])^(3/2)/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

$$2: \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 1$$

Derivation: Secant recurrence 1b with  $A \rightarrow 0$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 1$ ,  $m \rightarrow m-2$ ,  $n \rightarrow \frac{1}{2}$

Derivation: Secant recurrence 3a with  $A \rightarrow 0$ ,  $B \rightarrow a$ ,  $C \rightarrow b$ ,  $m \rightarrow m-1$ ,  $n \rightarrow -\frac{1}{2}$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 1$ , then

$$\int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \rightarrow$$

$$\frac{2 d \sin[e+fx] \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^{n-1}}{f (2n-1)} +$$

$$\frac{d^2}{2n-1} \int \left( ((d \sec[e+fx])^{n-2} (2a(n-2) + b(2n-3) \sec[e+fx] + a \sec[e+fx]^2)) / \left( \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \right) \right) dx$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a+b_.*csc[e_.+f_.*x_]]*(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -2*d*Cos[e+f*x]*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*(d*Csc[e+f*x])^(n-1)/(f*(2*n-1)) +
  d^2/(2*n-1)*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n-2)*Simp[2*a*(n-2)+b*(2*n-3)*Csc[e+f*x]+a*Csc[e+f*x]^2,x]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && GtQ[n,1] && IntegerQ[2*n]
```

$$2. \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n < 0$$

$$1: \int \frac{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}{\sqrt{d \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Piecewise constant extraction

$$\text{Basis: If } \partial_x \frac{\sqrt{a+b f[x]}}{\sqrt{d f[x]} \sqrt{b+a/f[x]}} = 0$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}{\sqrt{d \sec[e+fx]}} dx \rightarrow \frac{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}{\sqrt{d \sec[e+fx]} \sqrt{b+a \cos[e+fx]}} \int \sqrt{b+a \cos[e+fx]} dx$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a+_.*csc[e_+f_.*x_]]/Sqrt[d_.*csc[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]/(Sqrt[d*Csc[e+f*x]]*Sqrt[b+a*Sin[e+f*x]])*Int[Sqrt[b+a*Sin[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

$$2: \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n \leq -1$$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1c with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow n-1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n \leq -1$ , then

$$\int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n dx \rightarrow$$

$$-\frac{\tan[e+fx] \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n}{f n} - \frac{1}{2 d n} \int \left( ((d \sec[e+fx])^{n+1} (b - 2 a (n+1) \sec[e+fx] - b (2 n+3) \sec[e+fx]^2)) / \left( \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \right) \right) dx$$

Program code:

```
Int[Sqrt[a+_.*csc[e+_+f_.*x_]]*(d_.*csc[e+_+f_.*x_])^n,x_Symbol] :=
  Cot[e+f*x]*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*n) -
  1/(2*d*n)*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n+1)*Simp[b-2*a*(n+1)*Csc[e+f*x]-b*(2*n+3)*Csc[e+f*x]^2,x]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LeQ[n,-1] && IntegerQ[2*n]
```

$$8. \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

$$1. \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 0$$

$$1: \int \frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Piecewise constant extraction

$$\text{Basis: If } \partial_x \frac{\sqrt{d f[x]} \sqrt{b+a f[x]}^{-1}}{\sqrt{a+b f[x]}} == 0$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow \frac{\sqrt{d \sec[e+fx]} \sqrt{b+a \cos[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} \int \frac{1}{\sqrt{b+a \cos[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[Sqrt[d_*csc[e_+f_*x_]]/Sqrt[a_+b_*csc[e_+f_*x_]],x_Symbol] :=
  Sqrt[d*Csc[e+f*x]]*Sqrt[b+a*Sin[e+f*x]]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Int[1/Sqrt[b+a*Sin[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```



$$2. \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 1$$

$$1: \int \frac{(d \sec[e+fx])^{3/2}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Piecewise constant extraction

$$\text{Basis: If } \partial_x \frac{\sqrt{d f[x]} \sqrt{b+a/f[x]}}{\sqrt{a+b f[x]}} == 0$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^{3/2}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow \frac{d \sqrt{d \sec[e+fx]} \sqrt{b+a \cos[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} \int \frac{1}{\cos[e+fx] \sqrt{b+a \cos[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^(3/2)/Sqrt[a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  d*Sqrt[d*Csc[e+f*x]]*Sqrt[b+a*Sin[e+f*x]]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Int[1/(Sin[e+f*x]*Sqrt[b+a*Sin[e+f*x]]),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

$$2: \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 2$$

Derivation: Secant recurrence 3a with  $A \rightarrow 0$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 1$ ,  $m \rightarrow m-2$ ,  $n \rightarrow -\frac{1}{2}$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 2$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow$$

$$\frac{2 d^2 \sin[e+fx] (d \sec[e+fx])^{n-2} \sqrt{a+b \sec[e+fx]}}{b f (2n-3)} + \frac{d^3}{b (2n-3)} \int \left( ((d \sec[e+fx])^{n-3} (2a(n-3) + b(2n-5) \sec[e+fx] - 2a(n-2) \sec[e+fx]^2)) / (\sqrt{a+b \sec[e+fx]}) \right) dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_/Sqrt[a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
-2*d^2*Cos[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]/(b*f*(2*n-3)) +
d^3/(b*(2*n-3))*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n-3)/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*
Simp[2*a*(n-3)+b*(2*n-5)*Csc[e+f*x]-2*a*(n-2)*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && GtQ[n,2] && IntegerQ[2*n]
```

$$2. \int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n < 0$$

$$1: \int \frac{1}{\sec[e+fx] \sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1c with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{1}{\sec[e+fx] \sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow \frac{\sin[e+fx] \sqrt{a+b \sec[e+fx]}}{a f} - \frac{b}{2a} \int \frac{1 + \sec[e+fx]^2}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[1/(csc[e_.+f_.*x_]*Sqrt[a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]]),x_Symbol] :=
-Cos[e+f*x]*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]/(a*f) - b/(2*a)*Int[(1+Csc[e+f*x]^2)/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

$$2: \int \frac{1}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]}} dx \text{ when } a^2 - b^2 \neq 0$$

Derivation: Algebraic expansion

$$\text{Basis: } \frac{1}{\sqrt{z} \sqrt{a+bz}} = \frac{\sqrt{a+bz}}{a \sqrt{z}} - \frac{b \sqrt{z}}{a \sqrt{a+bz}}$$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{1}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]}} dx \rightarrow \frac{1}{a} \int \frac{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}{\sqrt{d \sec[e+fx]}} dx - \frac{b}{a d} \int \frac{\sqrt{d \sec[e+fx]}}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx$$

Program code:

```
Int[1/(Sqrt[a+b_*csc[e_+f_*x_]]*Sqrt[d_*csc[e_+f_*x_]]),x_Symbol] :=
  1/a*Int[Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]/Sqrt[d*Csc[e+f*x]],x] -
  b/(a*d)*Int[Sqrt[d*Csc[e+f*x]]/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

**3:**  $\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n < -1$

Derivation: Secant recurrence 3b with  $A \rightarrow 1$ ,  $B \rightarrow 0$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow -\frac{1}{2}$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n < -1$ , then

$$\int \frac{(d \sec[e+fx])^n}{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}} dx \rightarrow$$

$$- \frac{\sin[e+fx] (d \sec[e+fx])^{n+1} \sqrt{a+b \sec[e+fx]}}{a d f n} +$$

$$\frac{1}{2 a d n} \int \left( ((d \sec[e+fx])^{n+1} (-b(2n+1) + 2a(n+1) \sec[e+fx] + b(2n+3) \sec[e+fx]^2)) / (\sqrt{a+b \sec[e+fx]}) \right) dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_/Sqrt[a_+b_.*csc[e_.+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  Cos[e+f*x]*(d*Csc[e+f*x])^(n+1)*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]/(a*d*f*n) +
  1/(2*a*d*n)*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n+1)/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*
    Simp[-b*(2*n+1)+2*a*(n+1)*Csc[e+f*x]+b*(2*n+3)*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[n,-1] && IntegerQ[2*n]
```

**9:**  $\int (a+b \sec[e+fx])^{3/2} (d \sec[e+fx])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n \leq -1$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1a with  $A \rightarrow c$ ,  $B \rightarrow d$ ,  $C \rightarrow 0$ ,  $n \rightarrow n-1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n \leq -1$ , then

$$\int (a+b \sec[e+fx])^{3/2} (d \sec[e+fx])^n dx \rightarrow$$

$$- \frac{a \tan[e+fx] \sqrt{a+b \sec[e+fx]} (d \sec[e+fx])^n}{f n} + \frac{1}{2 d n} \int \left( (d \sec[e+fx])^{n+1} (a b (2n-1) + 2 (b^2 n + a^2 (n+1)) \sec[e+fx] + a b (2n+3) \sec[e+fx]^2) \right) / \left( \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \right) dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.csc[e_.+f_.x_])^(3/2)*(d_.csc[e_.+f_.x_])^n_,x_Symbol] :=
  a*Cot[e+f*x]*Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*(d*Csc[e+f*x])^n/(f*n) +
  1/(2*d*n)*Int[(d*Csc[e+f*x])^(n+1)/Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*
    Simp[a*b*(2*n-1)+2*(b^2*n+a^2*(n+1))*Csc[e+f*x]+a*b*(2*n+3)*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LeQ[n,-1] && IntegerQ[2*n]
```

**10:**  $\int (a+b \sec[e+fx])^m (d \sec[e+fx])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 3$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1b with  $A \rightarrow a^2$ ,  $B \rightarrow 2 a b$ ,  $C \rightarrow b^2$ ,  $m \rightarrow m-2$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge n > 3$ , then

$$\int (a+b \sec[e+fx])^m (d \sec[e+fx])^n dx \rightarrow \frac{d^3 \tan[e+fx] (a+b \sec[e+fx])^{m+1} (d \sec[e+fx])^{n-3}}{b f (m+n-1)} + \frac{d^3}{b (m+n-1)} \int (a+b \sec[e+fx])^m (d \sec[e+fx])^{n-3} (a (n-3) + b (m+n-2) \sec[e+fx] - a (n-2) \sec[e+fx]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a+b_.csc[e_.+f_.x_])^m_*(d_.csc[e_.+f_.x_])^n_,x_Symbol] :=
  -d^3*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m+1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-3)/(b*f*(m+n-1)) +
  d^3/(b*(m+n-1))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^(n-3)*
    Simp[a*(n-3)+b*(m+n-2)*Csc[e+f*x]-a*(n-2)*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && GtQ[n,3] && (IntegerQ[n] || IntegerQ[2*m,2*n]) && Not[IGtQ[m,2]]
```

**11:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge 0 < m < 2 \wedge 0 < n < 3 \wedge m + n - 1 \neq 0$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1b with

$A \rightarrow a c$ ,  $B \rightarrow b c + a d$ ,  $C \rightarrow b d$ ,  $m \rightarrow m - 1$ ,  $n \rightarrow n - 1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge 0 < m < 2 \wedge 0 < n < 3 \wedge m + n - 1 \neq 0$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{b d \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^{m-1} (d \sec[e + f x])^{n-1}}{f (m + n - 1)} + \frac{d}{m + n - 1} \int (a + b \sec[e + f x])^{m-2} (d \sec[e + f x])^{n-1} (a b (n - 1) + (b^2 (m + n - 2) + a^2 (m + n - 1)) \sec[e + f x] + a b (2 m + n - 2) \sec[e + f x]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -b*d*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^(m-1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-1)/(f*(m+n-1)) +
  d/(m+n-1)*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m-2)*(d*Csc[e+f*x])^(n-1)*
    Simp[a*b*(n-1)+(b^2*(m+n-2)+a^2*(m+n-1))*Csc[e+f*x]+a*b*(2*m+n-2)*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[0,m,2] && LtQ[0,n,3] && NeQ[m+n-1,0] && (IntegerQ[m] || IntegerQ[2*m,2*n])
```

**12:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge -1 < m < 2 \wedge 1 < n < 3 \wedge m + n - 1 \neq 0$

Derivation: Nondegenerate secant recurrence 1b with

$A \rightarrow a c$ ,  $B \rightarrow b c + a d$ ,  $C \rightarrow b d$ ,  $m \rightarrow m - 1$ ,  $n \rightarrow n - 1$ ,  $p \rightarrow 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge -1 < m < 2 \wedge 1 < n < 3 \wedge m + n - 1 \neq 0$ , then

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \frac{d^2 \tan[e + f x] (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^{n-2}}{f (m + n - 1)} +$$

$$\frac{d^2}{b(m+n-1)} \int (a+b \sec[e+fx])^{m-1} (d \sec[e+fx])^{n-2} (a b (n-2) + b^2 (m+n-2) \sec[e+fx] + a b m \sec[e+fx]^2) dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  -d^2*Cot[e+f*x]*(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)/(f*(m+n-1)) +
  d^2/(b*(m+n-1))*Int[(a+b*Csc[e+f*x])^(m-1)*(d*Csc[e+f*x])^(n-2)*
    Simp[a*b*(n-2)+b^2*(m+n-2)*Csc[e+f*x]+a*b*m*Csc[e+f*x]^2,x],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && LtQ[-1,m,2] && LtQ[1,n,3] && NeQ[m+n-1,0] && (IntegerQ[n] || IntegerQ[2*m,2*n])
```

13:  $\int \frac{(a+b \sec[e+fx])^{3/2}}{\sqrt{d \sec[e+fx]}} dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0$

Derivation: Algebraic expansion

Basis:  $\frac{a+bz}{\sqrt{dz}} == \frac{a}{\sqrt{dz}} + \frac{b}{d} \sqrt{dz}$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0$ , then

$$\int \frac{(a+b \sec[e+fx])^{3/2}}{\sqrt{d \sec[e+fx]}} dx \rightarrow a \int \frac{\sqrt{a+b \sec[e+fx]}}{\sqrt{d \sec[e+fx]}} dx + \frac{b}{d} \int \sqrt{a+b \sec[e+fx]} \sqrt{d \sec[e+fx]} dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^(3/2)/Sqrt[d_.*csc[e_+f_.*x_]],x_Symbol] :=
  a*Int[Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]/Sqrt[d*Csc[e+f*x]],x] +
  b/d*Int[Sqrt[a+b*Csc[e+f*x]]*Sqrt[d*Csc[e+f*x]],x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f},x] && NeQ[a^2-b^2,0]
```

**14:**  $\int (d \sec[e+fx])^n (a+b \sec[e+fx])^m dx$  when  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m \in \mathbb{Z}$

Derivation: Piecewise constant extraction and algebraic simplification

Basis:  $\partial_x (\cos[e+fx]^n (d \sec[e+fx])^n) = 0$

Rule: If  $a^2 - b^2 \neq 0 \wedge m \in \mathbb{Z}$ , then

$$\begin{aligned} \int (d \sec[e+fx])^n (a+b \sec[e+fx])^m dx &\rightarrow \cos[e+fx]^n (d \sec[e+fx])^n \int \frac{(a+b \sec[e+fx])^m}{\cos[e+fx]^n} dx \\ &\rightarrow \cos[e+fx]^n (d \sec[e+fx])^n \int \frac{(b+a \cos[e+fx])^m}{\cos[e+fx]^{m+n}} dx \end{aligned}$$

Program code:

```
Int[(d_.*csc[e_.+f_.*x_])^n_.*(a+b_.*csc[e_.+f_.*x_])^m_.,x_Symbol] :=
  Sin[e+f*x]^n*(d*Csc[e+f*x])^n*Int[(b+a*Sin[e+f*x])^m/Sin[e+f*x]^(m+n),x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,n},x] && NeQ[a^2-b^2,0] && IntegerQ[m]
```



**U:**  $\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$

Rule:

$$\int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx \rightarrow \int (a + b \sec[e + f x])^m (d \sec[e + f x])^n dx$$

Program code:

```
Int[(a_+b_.*csc[e_+f_.*x_])^m_.*(d_.*csc[e_+f_.*x_])^n_,x_Symbol] :=
  Unintegrable[(a+b*Csc[e+f*x])^m*(d*Csc[e+f*x])^n,x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m,n},x]
```

### Rules for integrands of the form $(d \cos[e + f x])^m (a + b \sec[e + f x])^p$

**1:**  $\int (d \cos[e + f x])^m (a + b \sec[e + f x])^p dx$  when  $m \notin \mathbb{Z} \wedge p \notin \mathbb{Z}$

Derivation: Piecewise constant extraction

$$\text{Basis: } \partial_x \left( (d \cos[e + f x])^m \left( \frac{\sec[e+fx]}{d} \right)^m \right) == 0$$

Rule: If  $m \notin \mathbb{Z} \wedge p \notin \mathbb{Z}$ , then

$$\int (d \cos[e + f x])^m (a + b \sec[e + f x])^p dx \rightarrow (d \cos[e + f x])^{\text{FracPart}[m]} \left( \frac{\sec[e + f x]}{d} \right)^{\text{FracPart}[m]} \int \left( \frac{\sec[e + f x]}{d} \right)^{-m} (a + b \sec[e + f x])^p dx$$

Program code:

```
Int[(d_.*cos[e_.+f_.*x_])^m_*(a_.+b_.*sec[e_.+f_.*x_])^p_,x_Symbol] :=
  (d*cos[e+f*x])^FracPart[m]*(Sec[e+f*x]/d)^FracPart[m]*Int[(Sec[e+f*x]/d)^(-m)*(a+b*Sec[e+f*x])^p,x] /;
FreeQ[{a,b,d,e,f,m,p},x] && Not[IntegerQ[m]] && Not[IntegerQ[p]]
```