

## Rules for integrands of the form $\text{Tan}[a + b x + c x^2]^n$

**X:**  $\int \text{Tan}[a + b x + c x^2]^n dx$

▪ **Rule:**

$$\int \text{Tan}[a + b x + c x^2]^n dx \rightarrow \int \text{Tan}[a + b x + c x^2]^n dx$$

▪ **Program code:**

```
Int[Tan[a_+b_.*x_+c_.*x_^2]^n_,x_Symbol] :=
  Unintegrable[Tan[a+b*x+c*x^2]^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,n},x]
```

```
Int[Cot[a_+b_.*x_+c_.*x_^2]^n_,x_Symbol] :=
  Unintegrable[Cot[a+b*x+c*x^2]^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,n},x]
```

## Rules for integrands of the form $(d + e x)^m \text{Tan}[a + b x + c x^2]^n$

1.  $\int (d + e x) \text{Tan}[a + b x + c x^2] dx$

**1:**  $\int (d + e x) \text{Tan}[a + b x + c x^2] dx$  when  $2 c d - b e == 0$

▪ **Rule:** If  $2 c d - b e == 0$ , then

$$\int (d + e x) \text{Tan}[a + b x + c x^2] dx \rightarrow -\frac{e \text{Log}[\text{Cos}[a + b x + c x^2]]}{2 c}$$

▪ **Program code:**

```
Int[(d_+e_.*x_)*Tan[a_+b_.*x_+c_.*x_^2],x_Symbol] :=
  -e*Log[Cos[a+b*x+c*x^2]]/(2*c) /;
FreeQ[{a,b,c,d,e},x] && EqQ[2*c*d-b*e,0]
```

```
Int[(d_+e_.*x_)*Cot[a_+b_.*x_+c_.*x_^2],x_Symbol] :=
  e*Log[Sin[a+b*x+c*x^2]]/(2*c) /;
FreeQ[{a,b,c,d,e},x] && EqQ[2*c*d-b*e,0]
```

**2:**  $\int (d+ex) \tan[ax+bx^2+cx^3] dx$  when  $2cd - be \neq 0$

**Rule:** If  $2cd - be \neq 0$ , then

$$\int (d+ex) \tan[ax+bx^2+cx^3] dx \rightarrow -\frac{e \operatorname{Log}[\cos[ax+bx^2+cx^3]]}{2c} + \frac{2cd-be}{2c} \int \tan[ax+bx^2+cx^3] dx$$

**Program code:**

```
Int[(d_.+e_.*x_)*Tan[a_.+b_.*x_+c_.*x_^2],x_Symbol] :=
  -e*Log[Cos[a+b*x+c*x^2]]/(2*c) +
  (2*c*d-b*e)/(2*c)*Int[Tan[a+b*x+c*x^2],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e},x] && NeQ[2*c*d-b*e,0]
```

```
Int[(d_.+e_.*x_)*Cot[a_.+b_.*x_+c_.*x_^2],x_Symbol] :=
  e*Log[Sin[a+b*x+c*x^2]]/(2*c) +
  (2*c*d-b*e)/(2*c)*Int[Cot[a+b*x+c*x^2],x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e},x] && NeQ[2*c*d-b*e,0]
```

**x:**  $\int (d+ex)^m \tan[ax+bx^2+cx^3] dx$  when  $m > 1$

**Note:** This rule is valid, but to be useful need a rule for reducing integrands of the form  $x^m \operatorname{Log}[\cos[ax+bx^2+cx^3]]$ .

**Rule:** If  $m > 1$ , then

$$\int x^m \tan[ax+bx^2+cx^3] dx \rightarrow -\frac{x^{m-1} \operatorname{Log}[\cos[ax+bx^2+cx^3]]}{2c} - \frac{b}{2c} \int x^{m-1} \tan[ax+bx^2+cx^3] dx + \frac{m-1}{2c} \int x^{m-2} \operatorname{Log}[\cos[ax+bx^2+cx^3]] dx$$

**Program code:**

```
(* Int[x_^m*Tan[a_.+b_.*x_+c_.*x_^2],x_Symbol] :=
  -x^(m-1)*Log[Cos[a+b*x+c*x^2]]/(2*c) -
  b/(2*c)*Int[x^(m-1)*Tan[a+b*x+c*x^2],x] +
  (m-1)/(2*c)*Int[x^(m-2)*Log[Cos[a+b*x+c*x^2]],x] /;
FreeQ[{a,b,c},x] && GtQ[m,1] *)
```

```
(* Int[x_^m*Cot[a_.+b_.*x_+c_.*x_^2],x_Symbol] :=
  x^(m-1)*Log[Sin[a+b*x+c*x^2]]/(2*c) -
  b/(2*c)*Int[x^(m-1)*Cot[a+b*x+c*x^2],x] -
  (m-1)/(2*c)*Int[x^(m-2)*Log[Sin[a+b*x+c*x^2]],x] /;
FreeQ[{a,b,c},x] && GtQ[m,1]*)
```

**X:**  $\int (d+e x)^m \tan[a+b x+c x^2]^n dx$

▪ **Rule:**

$$\int (d+e x)^m \tan[a+b x+c x^2]^n dx \rightarrow \int (d+e x)^m \tan[a+b x+c x^2]^n dx$$

▪ **Program code:**

```
Int[(d_.+e_.*x_)^m_.*Tan[a_.+b_.*x_+c_.*x_^2]^n_,x_Symbol] :=
  Unintegrable[(d+e*x)^m*Tan[a+b*x+c*x^2]^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,m,n},x]
```

```
Int[(d_.+e_.*x_)^m_.*Cot[a_.+b_.*x_+c_.*x_^2]^n_,x_Symbol] :=
  Unintegrable[(d+e*x)^m*Cot[a+b*x+c*x^2]^n,x] /;
FreeQ[{a,b,c,d,e,m,n},x]
```